giá, đáp ứng miễn dịch đối với một số týp huyết thanh phế cầu là thấp hơn khi hai vắc xin được tiêm đồng thời.

Chưa có đánh giá về việc sử dụng đồng thời với các loại vắc xin khác.

Các loại vắc xin tiêm khác nhau nên được tiêm tại các vị trí tiêm khác nhau.

Việc sử dụng đồng thời vắc xin Prevenar 13 và vắc xin polysaccharid 23 dòng phế cầu khuẩn vẫn chưa được nghiên cứu. Trong các nghiên cứu lâm sàng khi Prevenar 13 được chủng ngừa 1 năm sau khi tiêm vắc xin polysaccharid 23 dòng phế cầu khuẩn, đáp ứng miễn dịch thấp hơn đối với tất cả các týp so với khi Prevenar 13 được tiêm cho những đối tượng chưa chủng ngừa với vắc xin polysaccharide 23 dòng phế cầu khuẩn. Ý nghĩa lâm sàng của phát hiện này là chưa rõ.

4.6 Ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, phụ nữ có thai và cho con bú

Phụ nữ có thai

Không có dữ liệu từ việc dùng vắc xin cộng hợp 13 dòng phế cầu khuẩn ở phụ nữ mang thai. Do đó nên tránh dùng Prevenar 13 trong thai kỳ.

Thời kỳ cho con bú

Chưa biết liệu vắc xin cộng hợp 13 dòng phế cầu khuẩn có tiết vào sữa người không.

Khả năng sinh sản

Nghiên cứu trên động vật không cho thấy tác dụng có hại trực tiếp hay gián tiếp liên quan đến độc tính sinh sản (xem mục 5.3).

4.7 Ảnh hưởng lên khả năng lái xe và vận hành máy móc

Prevenar 13 không ảnh hưởng hoặc ảnh hưởng không đáng kể lên khả năng lái xe và vận hành máy móc. Tuy nhiên một số tác dụng đề cập trong mục 4.8 có thể gây ảnh hưởng tạm thời lên khả năng lái xe hoặc vận hành máy móc.

4.8 Các tác dụng không mong muốn

Phân tích tỷ lệ báo cáo sau khi lưu hành thuốc cho thấy có khả năng tăng nguy cơ co giật, kèm sốt hoặc không kèm sốt, và cơn giảm phản ứng - giảm trương lực (HHE) khi so sánh giữa các nhóm được báo cáo dùng Prevenar 13 cùng Infanrix hexa với các nhóm được báo cáo dùng riêng Prevenar 13.

Các phản ứng bất lợi được báo cáo trong nghiên cứu lâm sàng hoặc từ kinh nghiệm sau khi thuốc lưu hành cho mọi nhóm tuổi được liệt kê trong mục này theo phân loại theo hệ cơ quan, theo trình tự tần suất và mức độ nghiêm trọng giảm dần. Tần suất được định nghĩa như sau: rất thường gặp (≥1/10), thường gặp (≥1/100 đến <1/10), ít gặp (≥1/1.000 đến <1/100), hiếm gặp (≥1/10.000 đến <1/1.000), rất hiếm gặp (<1/10.000), chưa biết (không thể ước lượng từ dữ liệu sẵn có).

Trẻ sơ sinh và trẻ em từ 6 tuần đến 5 tuổi