Tính an toàn của vắc xin đã được đánh giá qua các nghiên cứu lâm sàng có kiểm soát với 14.267 liều được dùng trên 4.429 trẻ sơ sinh khỏe mạnh từ 6 tuần tuổi lúc chủng ngừa lần đầu và 11-16 tháng tuổi lúc được tiêm liều nhắc lại. Trong mọi nghiên cứu trên trẻ sơ sinh, Prevenar 13 được cho dùng đồng thời với các vắc xin cho trẻ em thường quy (xem mục 4.5).

Tính an toàn trên 354 trẻ em (7 tháng đến 5 tuổi) trước đó chưa được chủng ngừa cũng đã được đánh giá.

Các phản ứng bất lợi thường gặp nhất ở trẻ từ 6 tuần đến 5 tuổi là phản ứng tại chỗ tiêm, sốt, khó chịu, giảm cảm giác tham ăn, và tăng và / hoặc giảm ngủ.

Trong một thử nghiệm lâm sàng dùng vắc xin cộng hợp 7 dòng phế cầu khuẩn ở trẻ sơ sinh được tiêm chủng ở lứa tuổi 2, 3 và 4 tháng, phản ứng sốt ≥ 38°C được báo cáo với tỷ lệ cao hơn ở trẻ sơ sinh đã dùng vắc xin cộng hợp 7 dòng phế cầu khuẩn đồng thời với Infanrix hexa (28,3% đến 42,3%) so với trẻ sơ sinh chỉ dùng Infanrix hexa (15,6% to 23,1%). Sau liều nhắc lại ở 12-15 tháng tuổi, tỷ lệ sốt ≥ 38°C là 50,0% ở trẻ sơ sinh đã dùng vắc xin cộng hợp 7 dòng phế cầu khuẩn đồng thời với Infanrix hexa, so với 33,6% ở trẻ sơ sinh chỉ dùng Infanrix hexa. Những phản ứng này đa số ở mức độ vừa phải (dưới hoặc bằng 39°C) và thoáng qua.

Tăng tỷ lệ phản ứng tại chỗ tiêm được báo cáo ở trẻ em trên 12 tháng tuổi so với tỷ lệ quan sát được ở trẻ sơ sinh trong liệu trình cơ bản với Prevenar 13.

Phản ứng bất lợi ghi nhận từ các nghiên cứu lâm sàng

Trong các nghiên cứu lâm sàng, tính an toàn của Prevenar 13 là tương tự với vắc xin cộng hợp 7 dòng phế cầu khuẩn. Các tần suất dưới đây dựa trên các phản ứng bất lợi thu được từ các nghiên cứu lâm sàng của Prevenar 13:

Rối loạn hệ miễn dịch:
Hiếm gặp: Phản ứng quá mẫn bao gồm phù mặt, khó thở, co thắt phế quản

Rối loạn hệ thần kinh:
Ít gặp: Co giật (bao gồm co giật do sốt)
Hiếm gặp: Cơn giảm phản ứng - giảm trương lực (HHE)

Rối loạn tiêu hóa:
Rất thường gặp: Giảm cảm giác thèm ăn
Thường gặp: Nôn mửa; tiêu chảy

Rối loạn da và mô dưới da:
Thường gặp: Phát ban
Ít gặp: Mày đay hoặc ban giống mày đay

Rối loạn chung và tại chỗ tiêm: