Rất thường gặp:	Sốt; khó chịu; bất kỳ loại ban đỏ nào tại chỗ tiêm, chai cứng/sưng hay đau nhức/tăng nhạy cảm; buồn ngủ; giảm chất lượng giấc ngủ Ban đỏ tại chỗ tiêm hay chai cứng/sưng 2,5 cm – 7,0 cm (sau liều nhắc lại và ở trẻ lớn hơn (2 đến 5 tuổi)
Thường gặp:	Sốt > 39°C; giảm khả năng vận động tại chỗ tiêm vắc xin (do đau); Ban đỏ tại chỗ tiêm hay chai cứng/sưng 2,5 cm – 7,0 cm (sau liệu trình tiêm chủng cho trẻ sơ sinh)
Ít gặp:	Ban đỏ tại chỗ tiêm, chai cứng/sưng > 7,0 cm; khóc

Phản ứng bất lợi ghi nhận sau khi thuốc lưu hành

Mặc dù những tác dụng không mong muốn sau đây không được quan sát thấy trong các thử nghiệm lâm sàng của Prevenar 13 trên trẻ sơ sinh và trẻ em, chúng vẫn được xem là tác dụng không mong muốn của Prevenar 13 dựa trên báo cáo trong trải nghiệm sau khi lưu hành thuốc.

Vì những phản ứng này được ghi nhận từ các báo cáo tự nguyện, nên không thể xác định được tần suất và do đó được xem là không xác định.

Rối loạn máu và hệ hạch bạch huyết:
Bệnh hạch bạch huyết (tại chỗ ở vùng tiêm chủng)

Rối loạn hệ miễn dịch:
Phản ứng phản vệ/dạng phản vệ bao gồm sốc; phù mạch

Rối loạn da và mô dưới da:
Hồng ban đa dạng

Rối loạn chung và tại chỗ tiêm:
Mày đay tại chỗ tiêm; viêm da tại chỗ tiêm; ngứa tại chỗ tiêm; đỏ da

Thông tin bổ sung ở các nhóm đối tượng đặc biệt:
Ngừng thở ở trẻ sơ sinh rất thiếu tháng (thai kỳ ≤28 tuần) (xem mục 4.4)

Trẻ em và thanh thiếu niên từ 6 đến 17 tuổi

Tính an toàn đã được đánh giá trên 592 trẻ em (294 trẻ từ 5 đến 10 tuổi trước đây đã được tiêm chủng với ít nhất một liều Prevenar và 298 trẻ trong độ tuổi từ 10 đến 17 chưa được chủng ngừa phế cầu).

Các tác dụng phụ thường gặp nhất ở trẻ em và thanh thiếu niên từ 6 đến 17 tuổi là:

Rối loạn hệ thần kinh:
Thường gặp: Đau đầu