Rối loạn tiêu hóa:
Rất thường gặp: Giảm cảm giác thèm ăn
Thường gặp: Nôn mửa; bệnh tiêu chảy

Rối loạn da và mô dưới da:
Thường gặp: Phát ban; nổi mày đay hoặc ban giống mày đay

Rối loạn chung và tại chỗ tiêm:
Rất thường gặp: Khó chịu; Bất kỳ loại ban đỏ nào tại chỗ tiêm; chai cứng/sưng hay đau nhức/tăng nhạy cảm; buồn ngủ; giảm chất lượng giấc ngủ; tăng nhạy cảm tại chỗ tiêm (bao gồm giảm khả năng vận động)
Thường gặp: Sốt

Các phản ứng bất lợi khác xảy ra ở trẻ sơ sinh và trẻ em từ 6 tuần đến 5 tuổi cũng có thể áp dụng cho nhóm tuổi này nhưng không thấy trong nghiên cứu này, có thể do cỡ mẫu nhỏ.

Thông tin bổ sung ở các nhóm đối tượng đặc biệt:

Trẻ em và thiếu niên bị bệnh tế bào hình lưỡi liềm, nhiễm HIV hoặc cấy ghép tế bào gốc tạo máu có tần suất phản ứng bất lợi tương tự, ngoại trừ đau đầu, nôn mửa, tiêu chảy, sốt, mệt mỏi, đau khớp và đau cơ là rất thường gặp.

Người lớn từ 18 tuổi trở lên

Tính an toàn đã được đánh giá trong 7 nghiên cứu lâm sàng bao gồm 91.593 người lớn từ 18 đến 101 tuổi. Prevenar 13 được cho dùng ở 48.806 người lớn; 2.616 (5,4%) từ 50 đến 64 tuổi, và 45.291 (92,8%) từ 65 tuổi trở lên. Một trong 7 nghiên cứu có một nhóm người lớn (n=899) từ 18 đến 49 tuổi đã được tiêm Prevenar 13 và trước đó chưa được chủng ngừa vắc xin polysaccharid 23 dòng phế cầu khuẩn. Trong số những người được tiêm Prevenar 13, 1.916 người lớn trước đó đã được chủng ngừa vắc xin polysaccharid 23 dòng phế cầu khuẩn ít nhất 3 năm trước đợt chủng ngừa nghiên cứu, và 46.890 người lớn chưa được chủng ngừa vắc xin polysaccharid phế cầu khuẩn 23 dòng.

Có xu hướng gặp tần suất phản ứng bất lợi thấp hơn ở lứa tuổi cao hơn; người lớn >65 tuổi (bất kể tình trạng chủng ngừa phế cầu khuẩn trước đó như thế nào) báo cáo ít phản ứng bất lợi hơn so với người lớn trẻ tuổi hơn, phản ứng bất lợi thường gặp nhất là ở những người trẻ, từ 18 đến 29 tuổi.

Nhìn chung, các tần suất là tương tự cho mọi nhóm tuổi, ngoại trừ nôn mửa là rất thường gặp (≥1/10) ở người lớn từ 18 đến 49 tuổi và thường gặp (≥1/100 đến <1/10) ở các nhóm tuổi khác, và sốt là rất thường gặp ở người lớn từ 18 đến 29 tuổi và thường gặp ở các nhóm tuổi khác. Đau nhức/tăng nhạy cảm nghiêm trọng tại chỗ tiêm và hạn chế vận động cánh tay nghiêm trọng là rất thường gặp ở người lớn từ 18 đến 39 tuổi và thường gặp ở các nhóm tuổi khác.

Phản ứng bất lợi ghi nhận từ các nghiên cứu lâm sàng

Phản ứng tại chỗ tiêm và tác dụng toàn thân được ghi nhận hàng ngày sau mỗi lần chủng ngừa trong 14 ngày trong 6 nghiên cứu và 7 ngày trong nghiên cứu còn lại. Các tần suất sau đây dựa trên các phản ứng bất lợi được đánh giá trong các nghiên cứu lâm sàng của Prevenar 13 ở người lớn: