Rối loạn chuyển hóa và dinh dưỡng:
Rất thường gặp: Giảm cảm giác thèm ăn

Rối loạn hệ thần kinh:
Rất thường gặp: Đau đầu

Rối loại tiêu hóa:
Rất thường gặp: Tiêu chảy; nôn (ở người lớn từ 18 đến 49 tuổi)
Thường gặp: Nôn (ở người lớn từ 50 tuổi trở lên)
Ít gặp: Buồn nôn

Rối loạn hệ miễn dịch:
Ít gặp: Phản ứng quá mẫn bao gồm phù mặt, khó thở, co thắt phế quản

Rối loạn da và mô dưới da:
Rất thường gặp: Phát ban

Rối loạn chung và tại chỗ tiêm:
Rất thường gặp: Ớn lạnh; mệt mỏi; ban đỏ tại chỗ tiêm, chai cứng/sưng tại chỗ tiêm; đau nhức/tăng nhạy cảm tại chỗ tiêm (đau nhức/tăng nhạy cảm nghiêm trọng rất thường gặp ở người lớn từ 18 – 39 tuổi); khả năng di chuyển cánh tay hạn chế (hạn chế khả năng di chuyển cánh tay nghiêm trọng rất thường gặp ở người lớn từ 18-39 tuổi)
Thường gặp: Sốt (rất thường gặp ở người lớn từ 18 – 29 tuổi)
Ít gặp: Bệnh hạch bạch huyết tại chỗ ở vùng tiêm chủng

Rối loạn cơ xương và mô liên kết:
Rất thường gặp: Đau khớp; đau cơ

Nhìn chung, không quan sát thấy khác biệt rõ rệt trong tần suất phản ứng bất lợi khi Prevenar 13 được dùng ở người lớn trước đó đã được chủng ngừa vắc xin polysaccharid phế cầu khuẩn.

Thông tin bổ sung ở các nhóm đối tượng đặc biệt

Người lớn nhiễm HIV có tần suất phản ứng bất lợi tương tự, ngoại trừ sốt và nôn là rất thường gặp và buồn nôn là thường gặp.

Người lớn được cấy ghép tế bào gốc tạo máu có tần suất phản ứng bất lợi tương tự, ngoại trừ sốt và nôn là rất thường gặp.

Quan sát thấy tần suất cao hơn ở một số phản ứng toàn thân khi Prevenar 13 được cho dùng đồng thời với TIV so với khi TIV được cho dùng riêng (đau đầu, ớn lạnh, phát ban, giảm cảm giác thèm ăn, đau khớp và đau cơ) hoặc khi Prevenar 13 được cho dùng riêng (đau đầu, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm cảm giác thèm ăn, và đau khớp).