Đáp ứng của liều nhắc lại sau lịch trình cơ bản gồm 2 liều và 3 liều

Nồng độ kháng thể sau liều nhắc lại đối với 12 týp huyết thanh cao hơn nồng độ đạt được sau đợt tiêm chủng chính cho trẻ sơ sinh, điều này phù hợp với lý thuyết về sự mồi miễn dịch thích hợp (sự kích thích trí nhớ miễn dịch). Đối với huyết thanh týp 3, nồng độ kháng thể sau đợt tiêm chủng chính cho trẻ sơ sinh và sau liều nhắc lại là tương tự nhau. Đáp ứng kháng thể đối với liều nhắc lại sau đợt tiêm chủng chính gồm 2 liều hay 3 liều cho trẻ sơ sinh là như nhau cho tất cả 13 týp huyết thanh trong vắc xin.

Đối với trẻ em từ 7 tháng đến 5 tuổi, lịch trình tiêm chủng điều chỉnh thích hợp theo tuổi (xem mục 4.2) tạo ra mức độ đáp ứng kháng thể IgG kháng polysaccharid vỏ bao đối với mỗi loại trong 13 týp huyết thanh ít nhất tương đương với đáp ứng của đợt tiêm chủng cơ bản gồm 3 liều ở trẻ sơ sinh.

Đáp ứng của liều nhắc lại Prevenar 13 sau đợt tiêm chủng cơ bản gồm 3 liều cho trẻ sơ sinh với vắc xin cộng hợp 7 dòng phế cầu khuẩn hay Prevenar 13

Trong một nghiên cứu ngẫu nhiên, mù đôi, đối chứng với thuốc khác tại Pháp (6096A1-008), trẻ sơ sinh được phân bố ngẫu nhiên thành 3 nhóm theo tỉ lệ 2:1:1: (1) Prevenar 13 ở 2, 3, 4 và 12 tháng hay (2) vắc xin cộng hợp 7 dòng phế cầu khuẩn ở 2, 3, và 4 tháng, tiếp theo là Prevenar 13 ở 12 tháng hay (3) vắc xin cộng hợp 7 dòng phế cầu khuẩn ở 2, 3, 4 và 12 tháng. Các nồng độ trung bình nhân của đáp ứng kháng thể IgG kháng polysaccharid vỏ bao đối với mỗi týp trong 13 týp huyết thanh trong 3 nhóm được trình bày trong Bảng 3. Nồng độ trung bình nhân của các týp huyết thanh trong vắc xin cộng hợp 7 dòng phế cầu khuẩn không khác biệt giữa 3 nhóm. Mặc dù các nồng độ trung bình nhân đối với 6 týp huyết thanh bổ sung ở trẻ được tiêm vắc xin cộng hợp 7 dòng phế cầu khuẩn/Prevenar 13 thấp hơn nồng độ được quan sát bằng chế độ 4 liều Prevenar 13 (ngoại trừ týp huyết thanh 3), các nồng độ này đều ít nhất tương đương với đợt tiêm chủng chính gồm 3 liều cho trẻ sơ sinh trong nghiên cứu (6096A1-004) và (6096A1-3005). Sự so sánh với đáp ứng đợt tiêm chủng cho trẻ sơ sinh như thế này tương tự như đã thực hiện với vắc xin cộng hợp 7 dòng phế cầu khuẩn để thiết lập lịch trình tiêm chủng ở trẻ em và trẻ sơ sinh lớn hơn.