Bảng 3. Nồng độ trung bình nhân của kháng thể IgG kháng polysaccharid vỏ phế cầu khuẩn (µg/ml) 1 tháng sau khi tiêm chủng

Týp huyết thanh	13v/13v Sau lứa tuổi mới biết đi (6096A1-008) N=233-236	7v/13v Sau lứa tuổi mới biết đi (6096A1-008) N=108-113	7v/7v Sau lứa tuổi mới biết đi (6096A1-008) N=111-127	13v Sau lứa tuổi sơ sinh (6096A1-004) N=249-252	13v Sau lứa tuổi sơ sinh (6096A1-3005) N=1172-1213
1	4,08	1,83	0,04	2,03	1,78
3	0,99	1,32	0,10	0,49	0,56
4	4,20	4,04	4,85	1,31	1,46
5	3,30	1,14	0,53	1,33	1,24
6A	6,14	2,60	1,54	2,19	2,21
6B	8,99	10,33	9,63	2,10	2,51
7F	4,52	3,71	0,05	2,57	2,57
9V	2,59	2,29	3,24	0,98	1,09
14	9,52	7,81	10,83	4,74	5,09
18C	2,30	2,43	2,81	1,37	1,37
19A	9,50	5,33	3,98	2,07	1,91
19F	5,18	3,73	4,11	1,85	2,15
23F	3,01	3,12	3,69	1,33	1,18

Trẻ sơ sinh thiếu tháng (B1851037 [6096A1-4001])

Sự an toàn và tính sinh miễn dịch của Prevenar 13 dùng ở 2, 3, 4 và 12 tháng được đánh giá ở 100 trẻ sơ sinh thiếu tháng (tuổi thai kỳ trung bình ước lượng (estimated gestational age [EGA]) là 31 tuần; phạm vi từ 26 đến 36 tuần) và so với 100 trẻ sơ sinh đủ tháng (EGA trung bình là 39 tuần; phạm vi từ 37 đến 42 tuần). Hơn 85% các đối tượng trong nhóm sinh thiếu tháng trong quần thể có tính sinh miễn dịch đánh giá được đã đạt nồng độ kháng thể IgG liên kết polysaccharid phế cầu khuẩn ≥ 0,35 µg/ml 1 tháng sau đợt tiêm chủng dành cho trẻ sơ sinh đối với tất cả các týp huyết thanh, ngoại trừ týp huyết thanh 5 (71,7%), 6A (82,7%), và 6B (72,7%) trong nhóm sinh thiếu tháng. Đối với 3 týp huyết thanh này, tỉ lệ đáp ứng ở trẻ sơ sinh thiếu tháng thấp hơn đáng kể so với trẻ sơ sinh đủ tháng. Một (1) tháng sau liều ở tuổi mới biết đi, bằng chứng cho sự mồi miễn dịch được quan sát thấy là tỉ lệ các đối tượng trong mỗi nhóm có tính sinh miễn dịch được đánh giá đạt cùng ngưỡng nồng độ kháng thể là >97%, ngoại trừ týp huyết thanh 3 (70,6% ở trẻ sơ sinh thiếu tháng và 79,3% ở trẻ sinh đủ tháng). Nói chung, các mức nồng độ IgG trung bình nhân đặc hiệu cho mỗi týp huyết thanh cho trẻ sơ sinh thiếu tháng thấp hơn so với trẻ sơ sinh đủ tháng.

Trẻ sơ sinh lớn hơn và trẻ em chưa được tiêm chủng

Trong một nghiên cứu nhãn mở về Prevenar 13 tại Ba Lan (6096A1-3002), trẻ em ở lứa tuổi 7-11 tháng, 12-23 tháng và ≥ 24 tháng đến 5 tuổi (trước sinh nhật thứ 6) chưa được tiêm vắc xin cộng hợp phế cầu khuẩn, được tiêm 3, 2 hay 1 liều Prevenar 13 theo lịch trình thích hợp với tuổi (xem **Mục 4.2-Liều dùng và cách dùng**). Nồng độ IgG trong huyết thanh được đo 1 tháng sau liều sau cùng trong mỗi nhóm tuổi và dữ liệu được trình bày trong Bảng 4.