Bảng 5. Đối tượng đạt mức độ kháng thể định trước đối với kháng nguyên vắc xin dùng đồng thời (trong Nghiên cứu 6096A1-004, Nghiên cứu 6096A1-3005 và Nghiên cứu 6096A1-3008)		
Tên vắc xin/kháng nguyên trong vắc xin (Mức độ kháng thể định trước)	**% người đáp ứng trong nhóm Prevenar 13 (n^a/N^b)**	**% người đáp ứng trong nhóm vắc xin cộng hợp 7 dòng phế cầu khuẩn (n^a/N^b)**
Đáp ứng Pediarix (DTaP-IPV-HepB) sau đợt tiêm chủng 3 liều dành cho trẻ sơ sinh		
Bạch hầu (≥ 0,1 đơn vị quốc tế [IU]/ml)	95,7 (223/233)	96,1 (221/230)
Uốn ván (≥ 0,1 đơn vị quốc tế [IU]/ml)	98,4 (181/184)	98,5 (193/196)
Ho gà (≥ 16,5 đơn vị nội độc tố [EU]/ml)	94,1 (225/239)	95,0 (228/240)
FHA (≥ 40,5 đơn vị nội độc tố [EU]/ml)	96,7 (231/239)	95,0 (228/240)
PRN (≥ 26 đơn vị nội độc tố [EU]/ml)	93,7 (224/239)	95,8 (230/240)
Bại liệt loại 1 (độ chuẩn ≥ 1:8)	100,0 (183/183)	100,0 (187/187)
Bại liệt loại 2 (độ chuẩn ≥ 1:8)	98,9 (181/183)	99,5 (186/187)
Bại liệt loại 3 (độ chuẩn ≥ 1:8)	100,0 (182/182)	99,5 (186/187)
Vi rút viêm gan B (≥ 10,0 mIU/ml)	100,0 (153/153)	100,0 (173/173)
Đáp ứng ActHIB (PRP) sau đợt tiêm chủng dành cho trẻ sơ sinh		
Hib (PRP) (≥ 0,15 µg/ml)	97,9 (232/237)	97,8 (225/230)
Hib (PRP) (≥ 1,0 µg/ml)	77,6 (184/237)	78,3 (180/230)
Đáp ứng Pentacel (DTaP-IPV-Hib) sau đợt tiêm chủng dành cho trẻ sơ sinh		
Hib (PRP) (≥ 0,15 µg/ml)	97,8 (266/272)	99,6 (265/266)
Hib (PRP) (≥ 1,0 µg/ml)	81,6 (222/272)	84,6 (225/266)
Ho gà (≥ 12,0 đơn vị nội độc tố [EU]/ml)	98,6 (278/282)	96,0 (266/277)
FHA (≥ 20,0 đơn vị nội độc tố [EU]/ml)	99,3 (281/283)	95,7 (266/278)
PRN (≥ 7,0 đơn vị nội độc tố [EU]/ml)	96,8 (274/283)	96,0 (266/277)
FIM (≥ 4,0 đơn vị nội độc tố [EU]/ml)	93,6 (264/282)	95,3 (262/275)