Bảng 6 **So sánh nồng độ trung bình nhân (GMC) của IgG phế cầu khuẩn (µg/ml) cho 7 týp huyết thanh thường gặp sau một liều đơn Prevenar 13 (Nghiên cứu 6096A1-3011) với vắc xin cộng hợp 7 dòng phế cầu khuẩn sau liều thứ tư (Nghiên cứu 6096A1-3005)[a]**

	Nhóm Vắc xin (theo Ghi danh/Chọn ngẫu nhiên)							
	Prevenar 13 5 đến <10 tuổi (Nghiên cứu 6096A1-3011)			Vắc xin cộng hợp 7 dòng phế cầu khuẩn 12-15 tháng tuổi (Nghiên cứu 6096A1-3005)				
Týp huyết thanh	n[b]	GMC[c]	(CI 95%[d])	n[b]	GMC[c]	(CI 95%[d])	Tỷ lệ[e]	(CI 95%[f])
Thường gặp								
4	169	8,45	(7,24, 9,87)	173	2,79	(2,45, 3,18)	3,03	(2,48, 3,71)
6B	171	53,56	(45,48, 63,07)	173	9,47	(8,26, 10,86)	5,66	(4,57, 6,99)
9V	171	9,51	(8,38, 10,78)	172	1,97	(1,77, 2,19)	4,83	(4,10, 5,70)
14	169	29,36	(24,78, 34,78)	173	8,19	(7,31, 9,18)	3,58	(2,93, 4,39)
18C	171	8,23	(7,13, 9,51)	173	2,33	(2,05, 2,65)	3,53	(2,91, 4,29)
19F	171	17,58	(14,95, 20,67)	173	3,31	(2,87, 3,81)	5,31	(4,29, 6,58)
23F	169	11,26	(9,79, 12,95)	173	4,49	(3,86, 5,23)	2,51	(2,04, 3,08)

[a] Quần thể sinh miễn dịch có thể đánh giá.
[b] n = Số đối tượng có nồng độ kháng thể xác định cho týp huyết thanh quy định.
[c] Nồng độ trung bình nhân (GMC) được tính toán bằng tất cả các đối tượng có sẵn dữ liệu cho đợt lấy máu quy định. GMC sau liều thứ tư đối với vắc xin cộng hợp 7 dòng phế cầu khuẩn (Nghiên cứu 6096A1-3005).
[d] Khoảng tin cậy (CI) là phép biến đổi hồi quy của khoảng tin cậy dựa trên phân phối t Student với lô ga rít trung bình của nồng độ.
[e] Tỷ lệ GMC: Prevenar 13 (Nghiên cứu 6096A1-3011) so với vắc xin cộng hợp 7 dòng phế cầu khuẩn (Nghiên cứu 6096A1-3005).
[f] CI đối với tỷ lệ là phép biến đổi hồi quy của khoảng tin cậy dựa trên phân phối t Student đối với chênh lệch trung bình của lô ga rít số đo (Prevenar 13 [Nghiên cứu 6096A1-3011] – vắc xin cộng hợp 7 dòng phế cầu khuẩn [Nghiên cứu 6096A1-3005]).
Lưu ý – Các số NCT trên ClinicalTrials.gov là như sau: (Nghiên cứu 6096A1-3011) NCT00761631, (Nghiên cứu 6096A1-3005) NCT00444457.