Bảng 7 **So sánh nồng độ trung bình nhân (GMC) của IgG phế cầu khuẩn (µg/ml) cho 6 týp huyết thanh bổ sung sau một liều đơn Prevenar 13 (Nghiên cứu 6096A1-3011) với Prevenar 13 trong Nghiên cứu 6096A1-3005 sau liều thứ tư (trong Nghiên cứu 6096A1-3005)[a]**

	Nhóm Vắc xin (theo Ghi danh/Chọn ngẫu nhiên)							
	Prevenar 13 (5 đến <10 tuổi) (Nghiên cứu 6096A1-3011)			Prevenar 13 (12-15 tháng) (Nghiên cứu 6096A1-3005)				
Týp huyết thanh	n[b]	GMC[c]	(CI 95%[d])	n[b]	GMC[c]	(CI 95%[d])	Tỷ lệ[e]	(CI 95%[f])
Bổ sung								
1	171	3,57	(3.05, 4.18)	1068	2.90	(2,75, 3,05)	1,23	(1,07, 1,42)
3	171	2,38	(2,07, 2,74)	1065	0,75	(0,72, 0,79)	3,17	(2,78, 3,62)
5	171	5,52	(4,82, 6,32)	1068	2,85	(2,72, 2,98)	1,94	(1,71, 2,20)
6A	169	21,51	(18,15, 25,51)	1063	7,11	(6,78, 7,46)	3,03	(2,64, 3,47)
7F	170	6,24	(5,49, 7,08)	1067	4,39	(4,18, 4,61)	1,42	(1,24, 1,62)
19A	170	17,18	(15,01, 19,67)	1056	8,44	(8,05, 8,86)	2,03	(1,78, 2,32)

[a] Quần thể sinh miễn dịch có thể đánh giá.
[b] n = Số đối tượng có nồng độ kháng thể xác định cho týp huyết thanh quy định.
[c] Nồng độ trung bình nhân (GMC) được tính toán bằng tất cả các đối tượng có sẵn dữ liệu cho đợt lấy máu quy định. GMC sau liều thứ tư đối với Prevenar 13 (Nghiên cứu 6096A1-3005).
[d] Khoảng tin cậy (CI) là phép biến đổi hồi quy của khoảng tin cậy dựa trên phân phối t Student với lô ga rít trung bình của nồng độ.
[e] Tỷ lệ GMC: Prevenar 13 (Nghiên cứu 6096A1-3011) so với Prevenar 13 (Nghiên cứu 6096A1-3005).
[f] CI đối với tỷ lệ là phép biến đổi hồi quy của khoảng tin cậy dựa trên phân phối t Student đối với chênh lệch trung bình của lô ga rít số đo (Prevenar 13 [Nghiên cứu 6096A1-3011] – Prevenar 13 [Nghiên cứu 6096A1-3005]).
Lưu ý – Các số NCT trên ClinicalTrials.gov là như sau: (Nghiên cứu 6096A1-3011) NCT00761631, (Nghiên cứu 6096A1-3005) NCT00444457.

Ở trẻ em và thiếu niên từ 10 đến 17 tuổi, hiệu giá trung bình nhân (GMT) của hoạt tính opsonin hóa (OPA) 1 tháng sau khi tiêm chủng không kém hơn (ví dụ, giới hạn dưới cho khoảng tin cậy 95% 2 bên cho nồng độ trung bình nhân là >0,5) so với GMT của OPA ở nhóm từ 5 đến <10 tuổi cho 12 trên 13 týp huyết thanh (trừ huyết thanh týp 3), như thể hiện trong Bảng 8.