Bảng 8 **So sánh hiệu giá trung bình nhân (GMT) của OPA phế cầu khuẩn sau khi tiêm chủng, Prevenar 13 (10-17 tuổi) với Prevenar 13 (5 đến <10 tuổi) trong Nghiên cứu 6096A1-3011[a]**

	Nhóm Vắc xin							
	Prevenar 13 (10-17 tuổi)			Prevenar 13 (5 đến <10 tuổi)				
Týp huyết thanh	n[b]	GMT[c]	(CI 95%[d])	n[b]	GMT[c]	(CI 95%[d])	Tỷ lệ[e]	(CI 95%[f])
Thường gặp								
4	188	6912	(6101,2, 7831,4)	181	4629	(4017,2, 5334,3)	1,5	(1,24, 1,80)
6B	183	14224	(12316,4, 16427,3)	178	14996	(13164,1, 17083,1)	0,9	(0,78, 1,15)
9V	186	4485	(4001,1, 5027,5)	180	4733	(4203,3, 5328,4)	0,9	(0,80, 1,12)
14	187	6894	(6028,3, 7884,0)	176	4759	(4120,4, 5497,0)	1,4	(1,19, 1,76)
18C	182	6263	(5436,4, 7215,1)	175	8815	(7738,2, 10041,0)	0,7	(0,59, 0,86)
19F	184	2280	(1949,4, 2667,6)	178	1559	(1293,3, 1878,9)	1,5	(1,15, 1,86)
23F	187	3808	(3354,7, 4322,6)	176	3245	(2818,8, 3735,5)	1,2	(0,97, 1,42)
Bổ sung								
1	189	319	(271,2, 376,0)	179	187	(160,4, 218,6)	1,7	(1,36, 2,13)
3	181	114	(100,4, 129,4)	178	202	(180,9, 226,3)	0,6	(0,48, 0,67)
5	183	336	(270,3, 417,6)	178	491	(426,3, 565,3)	0,7	(0,53, 0,89)
6A	182	9928	(8457,0, 11654,8)	178	7514	(6350,8, 8890,7)	1,3	(1,05, 1,67)
7F	185	6584	(5829,4, 7435,5)	178	10334	(9099,0, 11736,8)	0,6	(0,53, 0,76)
19A	187	1276	(1131,7, 1439,0)	180	1180	(1047,5, 1329,4)	1,1	(0,91, 1,28)

[a] Quần thể sinh miễn dịch có thể đánh giá
[b] n = Số đối tượng với nồng độ kháng thể xác định cho týp huyết thanh quy định.
[c] Hiệu giá trung bình nhân (GMT) được tính toán bằng tất cả các đối tượng có sẵn dữ liệu cho đợt lấy máu quy định.
[d] Khoảng tin cậy (CI) là phép biến đổi hồi quy của khoảng tin cậy dựa trên phân phối t Student với lô ga rít trung bình của hiệu giá.
[e] Tỷ lệ GMT: Prevenar 13 (10-17 tuổi) so với Prevenar 13 (5 đến <10 tuổi).
[f] CI đối với tỷ lệ là phép biến đổi hồi quy của khoảng tin cậy dựa trên phân phối t Student đối với chênh lệch trung bình của lô ga rít số đo [Prevenar 13 (10-17 tuổi) – Prevenar 13 (5 đến <10 tuổi)].

Công hiệu của Prevenar 13

Bệnh phế cầu khuẩn xâm lấn

Bốn năm sau khi đưa vắc xin cộng hợp 7 dòng phế cầu khuẩn vào sử dụng trong đợt tiêm chủng cơ bản hai liều và liều nhắc lại trong năm tuổi thứ hai, tại Anh và xứ Wales, với 94% tỷ lệ sử dụng vắc xin đã giúp giảm 98% (CI 95% 95; 99) bệnh gây ra bởi 7 týp huyết thanh trong vắc xin được báo cáo. Sau đó, bốn năm sau khi chuyển sang Prevenar 13, việc giảm thêm về tỷ lệ mắc IPD do 7 týp huyết thanh trong vắc xin cộng hợp 7 dòng phế cầu khuẩn dao động từ 76% ở trẻ em dưới 2 tuổi đến 91% ở trẻ em từ 5 đến 14 tuổi. Mức giảm bệnh đặc hiệu cho mỗi týp huyết thanh trong 5 týp huyết thanh bổ sung trong Prevenar 13 (không quan sát thấy ca IPD týp huyết thanh 5 nào) theo nhóm tuổi được thể