hiện trong Bảng 9 và dao động từ 68% (týp huyết thanh 3) đến 100% (týp huyết thanh 6A) cho trẻ em dưới 5 tuổi. Cũng quan sát thấy giảm tỷ lệ đáng kể ở nhóm tuổi cao hơn không được tiêm chủng bằng Prevenar 13 (ảnh hưởng gián tiếp).

**Bảng 9: Mức giảm số ca và tỷ lệ mắc IPD theo từng týp huyết thanh trong 2013/14 so với 2008/09-2009/10 (2008/10) theo tuổi ở Anh và xứ Wales**

| | <5 tuổi | | | 5 đến 64 tuổi | | | ≥65 tuổi | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2008-10§ | 2013/14§ | % giảm tỷ lệ (CI 95%*) | 2008-10§ | 2013/14§ | % giảm tỷ lệ (CI 95%*) | 2008-10§ | 2013/14§ | % giảm tỷ lệ (CI 95%*) |
| **Các týp huyết thanh bổ sung có trong Prevenar 13** | | | | | | | | | |
| 1 | 59 (54) | 5 (5) | 91% (98%; 68%)** | 458 (382) | 77 (71) | 83% (88%; 74%)** | 102 (89) | 13 (13) | 87% (94%; 72%)** |
| 3 | 26 (24) | 8 (8) | 68% (89%; 6%) | 178 (148) | 73 (68) | 59% (72%; 38%)** | 256 (224) | 143 (146) | 44% (57%; 27%)** |
| 6A | 10 (9) | 0 (0) | 100% (100%; 62%)** | 53 (44) | 5 (5) | 90% (97%; 56%)** | 94 (82) | 5 (5) | 95% (99%; 81%)** |
| 7F | 90 (82) | 8 (8) | 91% (97%; 74%)** | 430 (361) | 160 (148) | 63% (71%; 50%)** | 173 (152) | 75 (77) | 56% (70%; 37%)** |
| 19A | 85 (77) | 7 (7) | 91% (97%; 75%)** | 225 (191) | 104 (97) | 54% (65%; 32%)** | 279 (246) | 97 (99) | 65% (75%; 53%)** |

§ Hiệu chỉnh theo tỷ lệ mẫu lấy theo týp huyết thanh, độ tuổi bỏ qua, mẫu số so với 2009/10, và theo xu hướng trong toàn bộ bệnh phế cầu khuẩn xâm lấn tính đến 2009/10 (sau đó không có xu hướng nào được hiệu chỉnh nữa).

* CI 95% cao lên do khoảng Poisson được tính theo độ phân tán quá mức 2·1 quan sát được từ mô hình của tất cả dữ liệu IPD trước khi dùng vắc xin cộng hợp 7 dòng phế cầu khuẩn 2000-06.

** p<0,005 để gộp cả 6A trong trường hợp p=0,002