Bảng 10. Hiệu giá trung bình nhân (GMT) của OPA ở người lớn chưa tiêm PPSV23 từ 50 đến 59 tuổi được tiêm Prevenar 13; và ở người lớn từ 60 đến 64 tuổi được tiêm Prevenar 13 hoặc PPSV23 (trong Nghiên cứu 6115A1-004)[a,b]

	Prevenar 13 50-59 tuổi N=350-384	Prevenar 13 60-64 tuổi N=359-404	PPSV23 60-64 tuổi N=367-402	Prevenar 13, 50-59 so với 60-64 tuổi		Prevenar 13 so với PPSV23, 60-64 tuổi	
Týp huyết thanh	GMT	GMT	GMT	GMR	(CI 95%)	GMR	(CI 95%)
1	200	146	104	1.4	(1,08, 1,73)	1,4	(1,10, 1,78)
3	91	93	85	1.0	(0,81, 1,19)	1,1	(0,90, 1,32)
4	2833	2062	1295	1.4	(1,07, 1,77)	1,6	(1,19, 2,13)
5	269	199	162	1.4	(1,01, 1,80)	1,2	(0,93, 1,62)
6A[†]	4328	2593	213	1.7	(1,30, 2,15)	12,1	(8,63, 17,08)
6B	3212	1984	788	1.6	(1,24, 2,12)	2,5	(1,82, 3,48)
7F	1520	1120	405	1.4	(1,03, 1,79)	2,8	(1,98, 3,87)
9V	1726	1164	407	1.5	(1,11, 1,98)	2,9	(2,00, 4,08)
14	957	612	692	1.6	(1,16, 2,12)	0,9	(0,64, 1,21)
18C	1939	1726	925	1.1	(0,86, 1,47)	1,9	(1,39, 2,51)
19A	956	682	352	1.4	(1,16, 1,69)	1,9	(1,56, 2,41)
19F	599	517	539	1.2	(0,87, 1,54)	1,0	(0,72, 1,28)
23F	494	375	72	1.3	(0,94, 1,84)	5,2	(3,67, 7,33)

GMT, hiệu giá trung bình nhân.
GMR, tỷ lệ trung bình nhân.
[†] 6A là týp huyết thanh chỉ có trong Prevenar 13 nhưng không có trong PPSV23.
[a] Không kém hơn được định nghĩa là giới hạn dưới của CI 95% 2 bên với GMR lớn hơn 0.5. Đáp ứng mạnh hơn đáng kể về thống kê được định nghĩa là giới hạn dưới của CI 95% 2 bên với GMR lớn hơn 1.
[b] Với týp huyết thanh 6A, chỉ có trong Prevenar 13, đáp ứng mạnh hơn đáng kể về thống kê được định nghĩa là giới hạn dưới của CI 95% 2 bên với GMR lớn hơn 2.

Bảng 11 hiển thị các giá trị GMT của OPA 1 tháng sau khi tiêm chủng cho các đối tượng từ 18 đến 29 tuổi, từ 30 đến 39 tuổi, và từ 40 đến 49 tuổi với một liều đơn Prevenar 13. Bảng này cũng cho thấy sự so sánh GMT của OPA ở các đối tượng từ 18 đến 49 tuổi và từ 60 đến 64 tuổi.