Bảng 11. GMT của OPA ở người lớn từ 18 đến 49 tuổi và người lớn từ 60 đến 64 tuổi (trong Nghiên cứu 6115A1-004) với Prevenar 13[a,b]

	18-29 tuổi N=276-290	30-39 tuổi N=276-288	40-49 tuổi N=279-290	18-49 tuổi N=836-866	60-64 tuổi N=359-404	18-49 tuổi so với 60-64 tuổi	
Týp huyết thanh	GMT[b]	GMT[b]	GMT[b]	GMT[b]	GMT[b]	GMR	(CI 95%[c])
1	409	353	305	353	146	2.4	(2,03, 2,87)
3	112	93	72	91	93	1.0	(0,84, 1,13)
4	7152	4589	3229	4747	2062	2.3	(1,92, 2,76)
5	567	375	271	386	199	1.9	(1,55, 2,42)
6A	8476	6131	3626	5746	2593	2.2	(1,84, 2,67)
6B	14134	10180	6571	9813	1984	4.9	(4,13, 5,93)
7F	3741	3276	2792	3249	1120	2.9	(2,41, 3,49)
9V	5086	3208	2292	3339	1164	2.9	(2,34, 3,52)
14	4452	2919	2049	2983	612	4.9	(4,01, 5,93)
18C	5240	3841	3171	3989	1726	2.3	(1,91, 2,79)
19A	2162	1504	1209	1580	682	2.3	(2,02, 2,66)
19F	2251	1507	1076	1533	517	3.0	(2,44, 3,60)
23F	2954	1606	814	1570	375	4.2	(3,31, 5,31)

[a] Không kém hơn được định nghĩa là giới hạn dưới của khoảng tin cậy 95% 2 bên với độ trung bình nhân lớn hơn 0.5.
[b] Đáp ứng mạnh hơn đáng kể về thống kê được định nghĩa là giới hạn dưới của khoảng tin cậy 95% 2 bên với tỷ lệ trung bình nhân lớn hơn 1.
[c] Khoảng tin cậy (CI) với tỷ lệ là phép biến đổi hồi quy của khoảng tin cậy dựa trên phân bố t của Student với lô ga rít trung bình của số đo.

Ở người lớn từ 18 đến 29 tuổi, GMT của OPA với 13 týp huyết thanh trong Prevenar 13 không kém hơn so với đáp ứng Prevenar 13 ở người lớn từ 60 đến 64 tuổi. Với 12 týp huyết thanh, đáp ứng miễn dịch có liên quan đến tuổi tác, với người lớn từ 18 đến 49 tuổi thể hiện đáp ứng mạnh hơn đáng kể về thống kê so với người lớn từ 60 đến 64 tuổi. Tương tự như vậy, đáp ứng mạnh hơn đáng kể về thống kê với 12 týp huyết thanh đã được quan sát thấy với người lớn trong các phân nhóm từ 18 đến 29 tuổi, từ 30 đến 39 tuổi và từ 40 đến 49 tuổi so với người lớn từ 60 đến 64 tuổi. GMT của OPA cao nhất ở người lớn từ 18 đến 29 tuổi và thấp nhất ở người lớn từ 60 đến 64 tuổi.

Một (1) năm sau khi tiêm chủng Prevenar 13, hiệu giá OPA đã giảm so với hiệu giá đo được 1 tháng sau khi tiêm chủng dao động từ 23 đến 2948; tuy nhiên hiệu giá OPA đối với tất cả các týp huyết thanh vẫn cao hơn nồng độ đo được ở mức cơ bản dao động từ 5 đến 186.

Đáp ứng miễn dịch ở các quần thể đặc biệt

Những người bị những tình trạng y tế mô tả dưới đây bị tăng nguy cơ mắc bệnh do phế cầu khuẩn gây ra.