Cấy ghép tế bào gốc tạo máu (HSCT)

Trong nghiên cứu 6115A1-3003 (B1851022), trẻ em và người lớn với HSCT dị ghép lúc ≥2 tuổi nhận 3 liều Prevenar 13, các liều cách nhau ít nhất là 1 tháng. Liều đầu tiên được tiêm từ 3 đến 6 tháng sau HSCT. Liều Prevenar 13 thứ tư (nhắc lại) được tiêm 6 tháng sau liều thứ ba. Theo khuyến cáo chung, một liều đơn PPSV23 được tiêm 1 tháng sau liều Prevenar 13 thứ tư. Đáp ứng miễn dịch đo bằng GMC của IgG được thẩm định ở 168-211 đối tượng có thể đánh giá được khoảng 1 tháng sau khi tiêm. Prevenar 13 kích thích nồng độ kháng thể gia tăng sau mỗi liều Prevenar 13. Đáp ứng miễn dịch sau khi tiêm liều Prevenar 13 thứ tư đã gia tăng đáng kể cho tất cả các týp huyết thanh so với sau liều thứ ba.

Nghiên cứu này chứng minh rằng 4 liều Prevenar 13 sinh ra nồng độ IgG trong huyết thanh tương tự như nồng độ sinh ra bởi một liều đơn ở người khỏe mạnh trong cùng nhóm tuổi.

Thử nghiệm lâm sàng thực hiện ở người lớn trước đó đã tiêm PPSV23

Trong một thử nghiệm lâm sàng mù đôi điều chỉnh[2] đối chứng với thuốc khác Pha 3 (6115A1-3005) của Prevenar 13 ở Mỹ và Thụy Điển, người ≥70 tuổi đã nhận 1 liều PPSV23 ≥5 năm trước đó được chia ngẫu nhiên (1:1) để nhận Prevenar 13 hoặc PPSV23.

Đáp ứng kháng thể OPA sinh ra bởi Prevenar 13 không kém hơn với 12 týp huyết thanh chung so với đáp ứng sinh ra bởi PPSV23 khi vắc xin được tiêm tối thiểu 5 năm sau khi dùng PPSV23. Ngoài ra, 10 trong các týp huyết thanh chung thể hiện đáp ứng miễn dịch mạnh hơn đáng kể về thống kê sau khi dùng Prevenar 13 so với sau khi dùng PPSV23.

Với týp huyết thanh 6A, chỉ có trong Prevenar 13, tỷ lệ người lớn với mức tăng đáp ứng 4 lần sau khi tiêm Prevenar 13 (71,1%) cao hơn đáng kể so với sau khi tiêm PPSV23 (27,3%) ở người lớn đã được tiêm PPSV23 ≥70 tuổi. GMT của OPA với týp huyết thanh 6A cao hơn đáng kể về thống kê sau khi dùng Prevenar 13 so với sau khi dùng PPSV23.

Thử nghiệm lâm sàng này chứng minh rằng ở người lớn ≥70 tuổi và đã được tiêm PPSV23 ≥5 năm trước đó, tiêm chủng Prevenar 13 cho đáp ứng miễn dịch tốt hơn so với tái tiêm chủng bằng PPSV23.

[2] Mù đôi điều chỉnh nghĩa là nhân viên tại cơ sở phát và tiêm vắc xin không bị ẩn thông tin, nhưng tất cả các nhân viên nghiên cứu khác bao gồm nghiên cứu viên chính và đối tượng đều bị ẩn thông tin.