Bảng 12. Hiệu giá trung bình nhân (GMT) của OPA ở người lớn trước đó đã tiêm PPSV23 ≥70 tuổi (trong Nghiên cứu 6115A1-3005) được cho dùng Prevenar 13 hoặc PPSV23[a,b]

Týp huyết thanh	Prevenar 13 N=400-426	PPSV23 N=395-445	Prevenar 13 so với PPSV23	
	GMT	GMT	Tỷ lệ	(CI 95%)
1	81	55	1,5	(1,17 , 1,88)
3	55	49	1,1	(0,91 , 1,35)
4	545	203	2,7	(1,93 , 3,74)
5	72	36	2,0	(1,55 , 2,63)
6A[†]	903	94	9,6	(7,00 , 13,26)
6B	1261	417	3,0	(2,21 , 4,13)
7F	245	160	1,5	(1,07 , 2,18)
9V	181	90	2,0	(1,36 , 2,97)
14	280	285	1,0	(0,73 , 1,33)
18C	907	481	1,9	(1,42 , 2,50)
19A	354	200	1,8	(1,43 , 2,20)
19F	333	214	1,6	(1,17 , 2,06)
23F	158	43	3,7	(2,69 , 5,09)

GMT, hiệu giá trung bình nhân.
[†] 6A là một týp huyết thanh chỉ có trong Prevenar 13 nhưng không có trong PPSV23.
[a] Không kém hơn được định nghĩa là giới hạn dưới của khoảng tin cậy 95% 2 bên với tỷ lệ trung bình nhân (GMR) lớn hơn 0,5. Đáp ứng mạnh hơn đáng kể về thống kê được định nghĩa là giới hạn dưới của khoảng tin cậy 95% 2 bên với GMR lớn hơn 1.
[b] Với týp huyết thanh 6A, chỉ có trong Prevenar 13, đáp ứng mạnh hơn đáng kể về thống kê được định nghĩa là giới hạn dưới của khoảng tin cậy 95% 2 bên với GMR lớn hơn 2.

Thử nghiệm lâm sàng để đánh giá Prevenar 13 dùng cùng với TIV theo mùa ở người lớn

Hai (2) thử nghiệm lâm sàng mù đôi, ngẫu nhiên (6115A1-3001 và 6115A1-3008) đánh giá tính sinh miễn dịch của Prevenar 13 dùng cùng với TIV (chủng A/H1N1, A/H3N2, và B) ở người lớn chưa được tiêm chủng PPSV23 từ 50 đến 59 tuổi và ở người lớn ≥65 tuổi.

Mỗi thử nghiệm lâm sàng so sánh việc cho dùng đồng thời Prevenar 13 và TIV (tiêm vào cánh tay còn lại) với [1] TIV cho dùng với giả dược và [2] với Prevenar 13 cho dùng một mình. Nhóm 1 nhận Prevenar 13 cùng với TIV, và nhận giả dược 1 tháng sau đó; Nhóm 2 nhận TIV cùng với giả dược, và nhận Prevenar 13 1 tháng sau đó.

Một thử nghiệm lâm sàng mù đôi, ngẫu nhiên Pha 3 (6115A1-3001) của Prevenar 13 cho dùng cùng với TIV ở người lớn từ 50 đến 59 tuổi chưa được tiêm chủng PPSV23 ở Mỹ đánh giá đáp ứng miễn dịch của TIV khi cho dùng TIV với Prevenar 13 so với khi cho dùng TIV với giả dược (sau đây gọi là chỉ TIV).

Một thử nghiệm lâm sàng mù đôi, ngẫu nhiên (6115A1-3008) của Prevenar 13 dùng cùng với TIV ở người lớn ≥65 tuổi chưa được tiêm chủng PPSV23 ở Châu Âu đánh giá đáp ứng miễn dịch của TIV khi cho dùng TIV với Prevenar 13 so với khi cho dùng TIV với giả dược.