Đáp ứng miễn dịch sinh ra bởi TIV được đo bằng xét nghiệm ức chế ngưng kết hồng cầu (HAI) 1 tháng sau khi tiêm chủng TIV. Đáp ứng miễn dịch được đo dưới dạng tỷ lệ người lớn có mức tăng ≥4 lần ở hiệu giá HAI (người có đáp ứng) với mỗi chủng TIV 1 tháng sau khi tiêm chủng. Các tiêu chí của sự không kém hơn đạt được với mỗi kháng nguyên của vắc xin nếu giới hạn dưới của CI 95% cho sự chênh lệch về tỷ lệ người có đáp ứng >-10%.

Các nghiên cứu cũng đánh giá đáp ứng miễn dịch của Prevenar 13 khi Prevenar 13 được cho dùng cùng với TIV so với khi cho dùng chỉ Prevenar 13. Đáp ứng miễn dịch sinh ra bởi Prevenar 13 được đo bằng GMC của IgG trong xét nghiệm ELISA 1 tháng sau khi tiêm Prevenar 13. Các tiêu chí của sự không kém hơn đạt được nếu giới hạn dưới của CI 95% 2 bên cho tỷ lệ GMC của IgG (Prevenar 13 và TIV so với chỉ Prevenar 1) >0,5 (tiêu chí gấp 2 lần).

Đáp ứng miễn dịch TIV ở người từ 50 đến 59 tuổi: Đáp ứng miễn dịch tương tự sau khi Prevenar 13 được cho dùng đồng thời với TIV so với chỉ TIV. Đạt được sự không kém hơn cho tất cả 3 chủng TIV sau khi Prevenar 13 được cho dùng đồng thời với TIV so với chỉ TIV (Bảng 13).

Đáp ứng miễn dịch TIV ở người ≥65 tuổi: Đáp ứng miễn dịch tương tự sau khi Prevenar 13 được cho dùng đồng thời với TIV so với chỉ TIV. Đạt được sự không kém hơn cho chủng A/H1N1, và B nhưng không cho A/H3N2 với giới hạn dưới của khoảng tin cậy (CI) 95% là -10,4% (Bảng 14).

Bảng 13. Tỷ lệ người tham gia từ 50 đến 59 tuổi có mức tăng ≥4 lần trong hiệu giá HAI sau TIV với Prevenar 13 và TIV với giả dược (trong Nghiên cứu 6115A1-3001)

TIV HAI	TIV + Prevenar 13		TIV + Giả dược		Chênh lệch
	n/N	% (CI 95%)	n/N	% (CI 95%)	% (CI 95%)
A/H1N1	445/530	84,0 (80,6, 87,0)	431/531	81,2 (77,6, 84,4)	2,8 (-1,8, 7,4)
A/H3N2	377/530	71,1 (67,1, 75,0)	369/531	69,5 (65,4, 73,4)	1,6 (-3,9, 7,2)
B	321/530	60,6 (56,3, 64,8)	320/531	60,3 (56,0, 64,5)	0,3 (-5,6, 6,2)

Bảng 14. Tỷ lệ người tham gia ≥65 tuổi có mức tăng ≥4 lần trong hiệu giá HAI sau TIV với Prevenar 13 và TIV với giả dược (trong Nghiên cứu 6115A1-3008)

TIV HAI	TIV + Prevenar 13		TIV + Giả dược		Chênh lệch
	n/N	% (CI 95%)	n/N	% (CI 95%)	% (CI 95%)
A/H1N1	440/548	80,3 (76,7, 83,5)	429/546	78,6 (74,9, 81,9)	1,7 (-3,1, 6,5)
A/H3N2	316/545	58,0 (53,7, 62,2)	341/545	62,6 (58,4, 66,6)	-4,6 (-10,4, 1,3)
B	286/548	52,2 (47,9, 56,4)	295/546	54,0 (49,7, 58,3)	-1,8 (-7,8, 4,1)

Đáp ứng miễn dịch Prevenar 13 ở người từ 50 đến 59 tuổi: Đạt được sự không kém hơn cho tất cả các týp huyết thanh (Bảng 15).