Đáp ứng miễn dịch Prevenar 13 ở người ≥65 tuổi: Đạt được sự không kém hơn cho tất cả các týp huyết thanh trừ týp huyết thanh 19F. Giới hạn dưới của khoảng tin cậy 95% cho tỷ lệ trung bình nhân đối với 19F là 0,49 [tiêu chí 0,5] (Bảng 16).

Bảng 15. Nồng độ trung bình nhân (GMC) của IgG phế cầu khuẩn 1 tháng sau Prevenar 13 và TIV; và 1 tháng sau Prevenar 13 (Cho dùng 1 tháng sau giả dược và TIV) cho người tham gia từ 50 đến 59 tuổi (trong Nghiên cứu 6115A1-3001)[a,b]

	Sau liều 1	Sau liều 2	So sánh vắc xin
	Prevenar 13 + TIV (N=247-294)	Prevenar 13* (N=247-289)	
Týp huyết thanh	GMC, µg/ml	GMC, µg/ml	Tỷ lệ (khoảng tin cậy 95%)
1	4,05	5,45	0,74 (0,58, 0,95)
3	1,15	1,46	0,79 (0,66, 0,93)
4	2,35	3,41	0,69 (0,55, 0,87)
5	6,03	7,18	0,84 (0,67, 1,05)
6A	5,78	6,70	0,86 (0,70, 1,06)
6B	7,58	10,09	0,75 (0,60, 0,93)
7F	8,14	10,57	0,77 (0,63, 0,95)
9V	4,96	6,97	0,71 (0,59, 0,86)
14	10,77	14,05	0,77 (0,60, 0,98)
18C	9,65	13,49	0,72 (0,58, 0,88)
19A	16,80	18,84	0,89 (0,74, 1,08)
19F	6,13	7,13	0,86 (0,67, 1,10)
23F	7,17	8,54	0,84 (0,66, 1,08)

GMC, Nồng độ trung bình nhân.
* Cho dùng 4 tuần sau giả dược và TIV.
[a] Kháng thể đo bằng ELISA chuẩn hóa.
[b] Đạt được tiêu chí không kém hơn nếu giới hạn dưới của khoảng tin cậy 95% 2 bên cho nồng độ trung bình nhân GMC của IgG (Prevenar 13 và TIV so với chỉ Prevenar 13) >0,5 (tiêu chí gấp 2 lần).