Bảng 16. Nồng độ trung bình nhân (GMC) của IgG phế cầu khuẩn 1 tháng sau Prevenar 13 và TIV; và 1 tháng sau Prevenar 13 (Cho dùng 1 tháng sau giả dược và TIV) cho người tham gia ≥65 tuổi (trong Nghiên cứu 6115A1-3008)[a,b]

	Sau liều 1	Sau liều 2	
	Prevenar 13 + TIV (N=247-294)	Prevenar 13* (N=247-289)	So sánh vắc xin
Týp huyết thanh	GMC, µg/ml	GMC, µg/ml	Tỷ lệ (khoảng tin cậy 95%)
1	2,52	3,20	0,79 (0,60, 1,04)
3	1,08	1,15	0,94 (0,78, 1,13)
4	2,15	3,24	0,66 (0,51, 0,87)
5	4,74	6,90	0,69 (0,55, 0,86)
6A	4,61	6,10	0,76 (0,61, 0,94)
6B	6,24	6,43	0,97 (0,75, 1,25)
7F	7,63	9,04	0,84 (0,67, 1,07)
9V	4,97	6,21	0,80 (0,63, 1,02)
14	8,95	12,44	0,72 (0,53, 0,97)
18C	8,88	11,07	0,80 (0,64, 1,01)
19A	11,93	17,10	0,70 (0,56, 0,87)
19F	4,78	7,39	0,65 (0,49, 0,85)
23F	5,82	6,11	0,95 (0,71, 1,27)

GMC, Nồng độ trung bình nhân.
* Cho dùng 4 tuần sau giả dược và TIV.
[a] Kháng thể đo bằng ELISA chuẩn hóa.
[b] Đạt được tiêu chí không kém hơn nếu giới hạn dưới của khoảng tin cậy 95% 2 bên cho nồng độ trung bình nhân của IgG (Prevenar 13 và TIV so với chỉ Prevenar 13) >0,5 (tiêu chí gấp 2 lần).

Prevenar 13 có thể được cho dùng đồng thời với TIV theo mùa.

Khi Prevenar 13 được cho dùng đồng thời với TIV, đáp ứng miễn dịch với TIV tương tự như đáp ứng khi chỉ cho dùng TIV.

Khi Prevenar 13 được cho dùng đồng thời với TIV, đáp ứng miễn dịch với Prevenar 13 thấp hơn so với khi chỉ cho dùng Prevenar 13. Tầm quan trọng về mặt lâm sàng của điều này là chưa biết.

Thử nghiệm lâm sàng để đánh giá Prevenar 13 dùng cùng với QIV theo mùa ở người lớn

Một nghiên cứu ngẫu nhiên, mù đôi sau khi lưu hành tại Mỹ đã đánh giá tính miễn dịch của Prevenar 13 khi dùng cùng với QIV bất hoạt (Fall 2014 / Spring 2015 Flucone, A / H1N1, A / H3N2, B / Brisbane và B / Massachusetts) ở người trưởng thành ≥ 50 tuổi đã tiêm chủng với PPSV23 trước đó. Một nhóm được nhận Prevenar 13 và QIV đồng thời, sau đó khoảng 1 tháng nhận giả dược. Nhóm khác được nhận QIV và giả dược đồng thời, sau đó khoảng 1 tháng là Prevenar 13.

Các đáp ứng kháng thể gây ra bởi Prevenar 13 được đo bằng OPA GMT 1 tháng sau khi tiêm Prevenar 13. tính không kém hơn được chứng minh nếu giới hạn dưới của khoảng tin cậy 95% 2 bên