đối với tỷ lệ OPA GMT (Prevenar 13 + QIV so với Prevenar 13) là> 0,5. Đáp ứng kháng thể Prevenar 13 mcOPA thỏa tiêu chí không kém hơn đối với tất cả 13 týp huyết thanh sau khi Prevenar 13 được dùng đồng thời với QIV so với Prevenar dùng cho đơn độc (Bảng 17).

Bảng 17. Hiệu giá trung bình nhân (GMT) của OPA 1 tháng sau khi tiêm Prevenar 13 và QIV và 1 tháng sau khi dùng Prevenar 13 (tiêm 1 tháng sau khi tiêm QIV + giả dược)

	Prevenar 13 + QIV (n^a=412-425)	**Prevenar 13** (n^a=405-419)	**So sánh vắc xin**
Týp huyết thanh	GMT[b]	GMT[b]	Tỷ lệ[c] (khoảng tin cậy 95%[d])
1	75	83	0,9 (0,74, 1,12)
3	41	49	0,8 (0,70, 0,98)
4	587	824	0,7 (0,55, 0,91)
5	97	101	1,0 (0,78, 1,18)
6A	953	1413	0,7 (0,53, 0,85)
6B	867	1041	0,8 (0,64, 1,08)
7F	651	670	1,0 (0,83, 1,14)
9V	699	838	0,8 (0,69, 1,00)
14	574	760	0,8 (0,62, 0,92)
18C	713	865	0,8 (0,64, 1,06)
19A	337	390	0,9 (0,72, 1,04)
19F	324	360	0,9 (0,71, 1,14)
23F	278	364	0,8 (0,56, 1,03)

Viết tắt: GMT = hiệu giá trung bình nhân; OPA = hoạt tính thực bào opsonin hóa.
a. n = Số đối tượng có hiệu giá OPA xác định đối với týp huyết thanh tương ứng.
b. GMT được tính toán dựa trên tất cả các đối tượng với số liệu sẵn có được lấy máu theo chỉ định.
c. Tỷ lệ GMT (Prevenar 13 + QIV / giả dược so với giả dược + QIV / Prevenar 13) được tính bằng cách chuyển dạng trở lại khác biệt trung bình giữa các trình tự vắc xin theo thang lô ga rít.
d. Các khoảng tin cậy đối với tỷ lệ này là giá trị chuyển dạng trở lại của khoảng tin cậy dựa trên phân phối t Student cho sự khác biệt trung bình của lô ga rít của các giá trị này (Prevenar 13 + QIV / giả dược – giả dược + QIV / Prevenar 13).

Các đáp ứng kháng thể bởi QIV được đo bằng HAI 1 tháng sau khi tiêm QIV. Đáp ứng miễn dịch được đo bằng HAI GMT cho mỗi týp QIV 1 tháng sau khi chủng ngừa. Tính không kém hơn đã được chứng minh đối với mỗi loại kháng nguyên vắc xin nếu giới hạn dưới của khoảng tin cậy 95% 2 bên đối với tỷ lệ GMT của hiệu giá HAI là> 0,5. Tính không kém hơn cũng đã được chứng minh cho mỗi týp trong 4 týp QIV sau khi Prevenar 13 được dùng đồng thời với QIV so với QIV dùng riêng biệt (Bảng 18).