Bảng 18. Hiệu giá trung bình nhân (GMT) HAI 1 tháng sau khi tiêm Prevenar 13 với PIV và Giả dược với QIV

	Prevenar 13+QIV n[a]=427	Placebo+QIV n[a]=430	Vaccine Comparison
Týp huyết thanh	**GMT[b]**	**GMT[b]**	**Ratio[c](95% CI[d])**
A/H1N1	115	113	1,0 (0,88, 1,18)
A/H3N2	226	196	1,2 (1,01, 1,32)
B/Brisbane	28	26	1,1 (0,95, 1,24)
B/Massachusetts	45	43	1,0 (0,90, 1,21)

Viết tắt: GMT = Hiệu giá trung bình nhân; HAI = định lượng ức chế ngưng kết hồng cầu
a. n = Số lượng đối tượng có hiệu giá HAI xác định đối với týp huyết thanh tương ứng.
b. GMT được tính toán dựa trên tất cả các đối tượng với số liệu sẵn có được lấy máu theo chỉ định.
c. Tỷ lệ GMT (Prevenar 13 + QIV / giả dược so với giả dược + QIV / Prevenar 13) được tính bằng cách chuyển dạng trở lại khác biệt trung bình giữa các trình tự vắc xin theo thang lô ga rít.
d. Các khoảng tin cậy đối với tỷ lệ này là giá trị chuyển dạng trở lại của khoảng tin cậy dựa trên phân phối t Student cho sự khác biệt trung bình của lô ga rít của các giá trị này (Prevenar 13 + QIV / giả dược – giả dược + QIV / Prevenar 13).

5.2 Đặc tính dược động học

Không áp dụng

5.3 Dữ liệu an toàn tiền lâm sàng

Một nghiên cứu về độc tính của Prevenar 13 trên thỏ dùng liều tiêm bắp lặp lại (5 liều tiêm vào bắp) tạo ra sự đáp ứng kháng thể đặc hiệu cho từng týp huyết thanh và không cho thấy các phản ứng bất lợi đáng kể tại chỗ hay toàn thân. Ngoài ra, không quan sát thấy phản ứng bất lợi đáng kể nào trong nghiên cứu tiêm bắp đơn liều về tính dung nạp tại chỗ ở thỏ.

Trong các nghiên cứu dược lý học về tính an toàn khi dùng liều đơn Prevenar 13 tiêm dưới da ở chuột cống hay khỉ, không có ảnh hưởng nào lên thần kinh trung ương, hô hấp hay hệ tim mạch. Trong các nghiên cứu độc tính dùng liều lặp lại tiêm dưới da (7 liều dưới da) ở chuột cống và khỉ, không có phản ứng bất lợi đáng kể nào được quan sát thấy. Ngoài ra, trong một nghiên cứu về độc tính dùng liều lặp lại tiêm dưới da (5 liều dưới da) ở chuột cống non, không có phản ứng bất lợi đáng kể nào được quan sát thấy.

Một nghiên cứu về độc tính sinh sản ở thỏ cái cho thấy việc tiêm bắp Prevenar 13 trước khi giao cấu và suốt thai kỳ không ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, phát triển phôi thai/thai nhi hay phát triển sau khi sinh.

6. ĐẶC TÍNH DƯỢC LÝ

6.1 Danh sách tá dược