Natri clorid
Acid succinic
Polysorbat 80
Nước cất pha tiêm
Nhôm phosphat

6.2 Tương kỵ

Khi chưa có nghiên cứu về tính tương hợp, không được trộn lẫn vắc xin này với các dược phẩm khác.

6.3 Hạn dùng

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

6.4 Thận trọng đặc biệt khi bảo quản

Bảo quản trong tủ lạnh (2°C–8°C). Không làm đông đá.

Loại bỏ nếu vắc xin đã bị đông đá. Bảo quản thuốc nguyên trong hộp.

Prevenar 13 đã được chứng minh là ổn định ở nhiệt độ lên đến 25°C trong 4 ngày. Sau khoảng thời gian này, cần sử dụng Prevenar 13 hoặc loại bỏ. Những dữ liệu này không phải là khuyến cáo cho việc vận chuyển hay bảo quản, nhưng có thể hướng dẫn quyết định sử dụng hay không trong trường hợp nhiệt độ có tăng lên tạm thời.

6.5 Tính chất và thành phần của bao bì đóng gói

Hộp chứa 1 bơm tiêm đơn liều đóng sẵn 0,5 ml thuốc kèm 1 kim tiêm riêng biệt

Hộp chứa 10 bơm tiêm đơn liều đóng sẵn 0,5 ml thuốc kèm 10 kim tiêm riêng biệt

6.6 Thận trọng đặc biệt khi thải bỏ và các xử lý khác

Trong khi bảo quản, có thể thấy cặn lắng đọng màu trắng và váng trong suốt nổi trên bề mặt. Hiện tượng này không phải là dấu hiệu hư hỏng.

Nên lắc kỹ vắc xin để có được hỗn dịch màu trắng đồng nhất trước khi đẩy khí ra khỏi bơm tiêm, và phải kiểm tra bằng mắt để xem có bất kỳ chất hạt/vẩn đục nào và/hoặc biến đổi về mặt vật lý nào hay không trước khi sử dụng. Không sử dụng nếu quan sát thấy có thay đổi.

Không có yêu cầu đặc biệt khi thải bỏ.

Bất kỳ dược phẩm chưa sử dụng hoặc rác thải nào đều phải được thải bỏ theo quy định địa phương.

Nhà sản xuất:

Nhà sản xuất: **Pfizer Ireland Pharmaceuticals**, Grange Castle Business Park, Clondalkin, Dublin 22, Ireland.