Carton box of combined pack (5 vaccine vials + 5 diluent vials)

MERCK SHARP & DOHME (ASIA) LTD HONG KONG
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

HD/EXP.:
Số lô SX/LOT.:
NSX/Mfg Date:

5 Single Dose 0.5 mL vials of vaccine and Sterile Diluent 5 Single Dose 0.7 mL vials

M-M-R® II

(measles, mumps, and rubella virus vaccine live)

Bảo quản vắc-xin M-M-R II ở 2°C đến 8°C. Luôn tránh ánh sáng vì có thể làm bất hoạt vi-rút. Không bảo quản hộp kết hợp trong tủ đông. Trong quá trình vận chuyển, để đảm bảo hiệu lực, hộp kết hợp của M-M-R II phải được bảo quản ở -20°C tới 8°C. Cần dùng vắc-xin càng sớm càng tốt sau khi hoàn nguyên. Để vắc-xin sau khi hoàn nguyên trong lọ vắc-xin ở chỗ tối ở 2°C tới 8°C và bỏ đi nếu không dùng trong vòng 8 giờ.

Store M-M-R II vaccine at 2°C to 8°C. Protect the vaccine from light at all times. Do not store the combination pack in the freezer. During shipping, to maintain potency, combination pack of M-M-R II must be stored between -20°C and +8°C.

M-M-R® II
DO NOT ACCEPT
IF VIAL SEAL IS BROKEN

℞ Thuốc kê đơn

MSD

M-M-R® II

Vắc-xin sống phòng vi-rút sởi, quai bị và rubella

Vắc-xin phòng vi-rút sởi: dòng vi-rút của Enders đã được làm giảm độc mạnh hơn. Phát triển trong môi trường nuôi cấy tế bào phôi gà

Vắc-xin phòng vi-rút quai bị: chủng Jeryl Lynn, phát triển trong môi trường nuôi cấy tế bào phôi gà

Vắc-xin phòng vi-rút rubella: dòng Wistar RA 27/3, phát triển trong môi trường nuôi cấy tế bào lưỡng bội ở người (WI-38).

Sau khi hoàn nguyên, liều tiêm 0,5 mL chứa không ít hơn một lượng tương ứng với 1000 $CCID_{50}$ vi-rút sởi; 12500 $CCID_{50}$ vi-rút quai bị và 1000 $CCID_{50}$ vi-rút rubella

Mỗi liều chứa 25 mcg neomycin.

Chế phẩm đông khô vô khuẩn. Không chứa chất bảo quản.

XXXXXXXX/XX-X/6953

9 317935 680018

SDK:

Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Hộp chứa 5 lọ vắc-xin đơn liều (0,5 mL) và 5 lọ dung môi (0,7 mL). Bột đông khô phải tiêm.


Đường dùng: tiêm dưới da hoặc tiêm bắp. Không được tiêm tĩnh mạch.

THẬN TRỌNG: ĐỂ ĐẢM BẢO HIỆU LỰC, chỉ sử dụng dung môi đi kèm vắc-xin để hoàn nguyên và tiêm. **Chỉ định, Cách dùng, Chống chỉ định** và các thông tin khác: xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo. Tiêu chuẩn: TCCS


Sản xuất và đóng gói cấp 1 vắc-xin bởi:
Merck Sharp & Dohme LLC;
5325 Old Oxford Road, Durham, North Carolina, 27712, Hoa Kỳ
Sản xuất và đóng gói cấp 1 dung môi bởi:
Jubilant HollisterStier LLC;
3525 North Regal Street, Spokane, Washington 99207, Hoa Kỳ

Đóng gói cấp 2 và xuất xưởng bởi:
Merck Sharp & Dohme B.V.; Waarderweg 39, Haarlem, 2031 BN, Hà Lan
DNNK:

Carton box of 10 vaccine vials (package A)



Carton box of 10 diluent vials (package B)



Label of vaccine vial



MERCK SHARP DOHME (ASIA) LTD HỘNG KÔNG
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Label of diluent vials

