℞ Thuốc bán theo đơn

PENTAXIM

VẮC-XIN HẤP PHỤ BẠCH HẦU - UỐN VÁN - HO GÀ (VÔ BÀO, THÀNH PHẦN) - BẠI LIỆT (BẤT HOẠT) VÀ VẮC-XIN CỘNG HỢP *HAEMOPHILUS INFLUENZAE* TÝP b

Vắc-xin đông khô và vắc-xin dạng hỗn dịch, hoàn nguyên thành hỗn dịch tiêm

Đọc kỹ tờ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Để xa tầm tay trẻ em.
Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

THÀNH PHẦN:

Sau khi hoàn nguyên, một liều (0,5ml) chứa:

Hoạt chất:

Giải độc tố bạch hầu[1]	≥ 30 I.U.
Giải độc tố uốn ván[1]	≥ 40 I.U.
Các kháng nguyên *Bordetella pertussis*:	
Giải độc tố ho gà[1]	25 microgam
Ngưng kết tố hồng cầu dạng sợi (FHA)[1]	25 microgam
Virus bại liệt (bất hoạt)	
Týp 1 (chủng Mahoney)	40 DU[2][3][4]
Týp 2 (chủng MEF-1)	8 DU[2][3][4]
Týp 3 (chủng Saukett)	32 DU[2][3][4]
Polysaccharide của *Haemophilus influenzae* týp b	10 microgam
cộng hợp với protein uốn ván	18-30 microgam

[1] hấp phụ bằng hydroxyt nhôm, hydrat hóa ..... 0,3 mg Al^{3+}
[2] DU đơn vị kháng nguyên D
[3] hoặc lượng kháng nguyên tương đương được xác định bằng một phương pháp hóa miễn dịch thích hợp.
[4] nuôi cấy trên tế bào VERO.

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
Lần đầu 27/.../2017

Tá dược:

Hỗn dịch tiêm

- Môi trường Hanks (không có đỏ phenol)
- Axit acetic và/hoặc natri hydroxyt (để chỉnh pH)
- Formaldehyde
- Phenoxyethanol
- Nước pha tiêm

Môi trường Hanks là một hỗn hợp gồm các axit amin (kể cả phenylalanine), các muối khoáng, các vitamin và các thành phần khác (ví dụ như glucose) hòa tan trong nước pha tiêm.

Bột đông khô

- Saccharose
- Trometamol

PENTAXIM có thể có một lượng rất ít (vết) glutaraldehyde, neomycin, streptomycin và polymyxin B (xem mục CHỐNG CHỈ ĐỊNH).

DẠNG DƯỢC PHẨM:

Vắc xin dạng bột đông khô và vắc xin dạng hỗn dịch, hoàn nguyên thành hỗn dịch tiêm.

PENTAXIM gồm bột đông khô trong lọ và hỗn dịch vô khuẩn trắng đục nạp trong bơm tiêm.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

- hộp 1 lọ, lọ 1 liều vắc-xin đông khô và 1 bơm tiêm có gắn sẵn kim tiêm, mỗi bơm tiêm nạp sẵn 1 liều (0,5 ml) vắc-xin dạng hỗn dịch.
- hộp 1 lọ, lọ 1 liều vắc-xin đông khô và 1 bơm tiêm không gắn kim tiêm, mỗi bơm tiêm nạp sẵn 1 liều (0,5 ml) vắc-xin dạng hỗn dịch, kèm theo 2 kim tiêm.
- hộp 10 lọ, lọ 1 liều vắc-xin đông khô và 10 bơm tiêm có gắn sẵn kim tiêm, mỗi bơm tiêm nạp sẵn 1 liều (0,5 ml) vắc-xin dạng hỗn dịch.
- hộp 10 lọ, lọ 1 liều vắc-xin đông khô và 10 bơm tiêm không gắn kim tiêm, mỗi bơm tiêm nạp sẵn 1 liều (0,5 ml) vắc-xin dạng hỗn dịch, kèm theo 20 kim tiêm.

DƯỢC LỰC HỌC

VẮC-XIN PHÒNG BỆNH BẠCH HẦU, UỐN VÁN, HO GÀ, BẠI LIỆT VÀ CÁC BỆNH DO NHIỄM *Haemophilus influenzae* TÝP b

Nhóm dược điều trị: vắc-xin phối hợp vi khuẩn và virus, mã ATC J07CA06.

Độc tố vi khuẩn bạch hầu và độc tố vi khuẩn uốn ván được khử độc bằng formaldehyde rồi tinh chế.

Vắc-xin bại liệt được được điều chế từ từ virus bại liệt các týp 1, 2 và 3 nhân lên trên tế bào Vero, tinh chế sau đó được bất hoạt bằng formaldehyde.

Các thành phần ho gà vô bào (PT và FHA) được ly trích từ canh cấy *Bordetella pertussis*, rồi tinh chế. Độc tố ho gà (PT) được khử độc bằng glutaraldehyde để trở thành giải độc tố ho gà (PTxd). FHA là chất tự nhiên. PTxd và FHA được chứng minh là hai thành phần chủ yếu quan trọng để bảo vệ phòng bệnh ho gà.

Vỏ nang polysaccharide PRP (polyribosil ribitol phosphate: PRP) được ly trích từ canh cấy *Haemophilus influenzae* týp b và cộng hợp với protein uốn ván (T) tạo nên vắc-xin cộng hợp PRP-T.

Ở người, vỏ nang polysaccharide (polyribosil ribitol phosphate: PRP) tạo đáp ứng huyết thanh kháng PRP. Tuy nhiên, như mọi kháng nguyên polysaccharide khác, bản chất của đáp ứng miễn dịch là không phụ thuộc tuyến ức, có đặc điểm là có đáp ứng kém ở trẻ nhũ nhi và không có hiệu quả khi tiêm nhắc trước 15 tháng tuổi. Sự kết hợp đồng hóa trị polysaccharide vỏ nang *Haemophilus influenzae* týp b với protein vận chuyển – protein uốn ván, cho phép vắc-xin cộng hợp tạo ra kháng nguyên tương tự kháng nguyên phụ thuộc tuyến ức, tạo nên một đáp ứng huyết thanh kháng PRP đặc hiệu ở trẻ nhũ nhi và đạt được hiệu quả tiêm nhắc lại.

Đáp ứng miễn dịch sau khi tiêm các liều trong loạt chủng ngừa cơ bản:

Các nghiên cứu về tính sinh miễn dịch ở trẻ nhũ nhi cho thấy 1 tháng sau liều thứ 3 trong loạt chủng ngừa cơ bản tất cả (100%) đều đạt hiệu giá kháng thể ở mức bảo vệ trong huyết thanh (> 0,01 IU/ml) đối với cả kháng nguyên bạch hầu và uốn ván.

Đối với ho gà, một đến hai tháng sau khi tiêm liều thứ ba trong loạt chủng ngừa cơ bản, 93% số trẻ được tiêm đạt hiệu giá kháng thể PT tăng gấp bốn lần và 88% đối với kháng thể FHA.

Ít nhất 99% số trẻ được chủng ngừa loạt cơ bản đạt hiệu giá kháng thể trong huyết thanh ở mức bảo vệ đối với virus bại liệt týp 1, 2 và 3 (≥ 5 khi biểu diễn bằng nghịch đảo độ pha loãng trong sự trung hòa huyết thanh).

1 tháng sau liều thứ 3 trong loạt chủng ngừa cơ bản, ít nhất 97,2% trẻ đạt được hiệu giá kháng PRP trên 0,15 mcg/ml.

Đáp ứng miễn dịch sau khi tiêm nhắc lại:

Sau liều nhắc lại đầu tiên (lúc 16-18 tháng tuổi), tất cả trẻ được chủng ngừa đều có kháng thể ở mức bảo vệ phòng bệnh bạch hầu (> 0,1 IU/ml), uốn ván (> 0,1 IU/ml), bại liệt (≥ 5 khi biểu diễn bằng nghịch đảo độ pha loãng trong sự trung hòa huyết thanh).

Tỉ lệ chuyển đổi huyết thanh đối với kháng thể ho gà (hiệu giá cao hơn bốn lần so với trước khi chủng ngừa) ít nhất là là 98% đối với PT (đo bằng phương pháp EIA) và 99% đối với FHA (đo bằng phương pháp EIA).

Hầu hết các trẻ đạt hiệu giá kháng thể kháng PRP ≥ 1,0 mcg/ml.

Kết quả của nghiên cứu theo dõi tính sinh miễn dịch đối với ho gà ở trẻ 5 – 6 tuổi đã tiêm chủng loạt cơ bản và tiêm nhắc với vắc-xin phối hợp có chứa thành phần ho gà vô bào cho thấy hiệu giá kháng thể kháng PT và kháng FHA đạt được ít nhất là bằng với các trẻ cùng tuổi đã tiêm với vắc-xin phối hợp có chứa thành phần ho gà toàn tế bào.

DƯỢC ĐỘNG HỌC
Không áp dụng.

CHỈ ĐỊNH:
PENTAXIM được chỉ định để giúp bảo vệ phòng bệnh bạch hầu, uốn ván, ho gà, bại liệt và phòng các bệnh nhiễm khuẩn xâm lấn do vi khuẩn *Haemophilus influenzae* týp b (viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết, v.v…) ở trẻ em từ 2 tháng tuổi trở lên.
Vắc-xin này không có tác dụng phòng các bệnh nhiễm khuẩn do các týp *Haemophilus influenzae* khác hoặc phòng viêm màng não do các loại vi sinh vật khác gây ra.

LIỀU DÙNG:
Lịch tiêm ngừa thông thường được khuyến cáo bao gồm tiêm ngừa cơ bản ở trẻ từ hai tháng tuổi với 3 mũi tiêm, cách nhau từ một đến hai tháng, sau đó trong năm tuổi thứ hai tiêm nhắc lại một mũi.

CÁCH DÙNG:
Với bơm tiêm không gắn sẵn kim, tra chặt kim tiêm để riêng vào đầu bơm tiêm bằng cách xoay một phần tư vòng.
Hoàn nguyên bằng cách bơm hỗn dịch vắc-xin phối hợp bạch hầu, uốn ván, ho gà vô bào và bại liệt dạng hỗn dịch vào lọ chứa vắc-xin cộng hợp *Haemophilus influenzae* týp b dạng bột đông khô. Lắc đều cho đến khi bột tan hoàn toàn. Sau khi hoàn nguyên, hỗn dịch màu trắng đục là bình thường.
Vắc-xin phải được tiêm ngay sau khi hoàn nguyên.

ĐƯỜNG DÙNG:

Tiêm bắp (IM).

Vị trí nên tiêm là mặt trước-bên của đùi (một phần ba giữa) đối với trẻ sơ sinh và ở vùng cơ Delta đối với trẻ lớn.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Không được dùng PENTAXIM trong trường hợp:

- Quá mẫn:
  - với bất kỳ hoạt chất nào của PENTAXIM,
  - với bất kỳ tá dược nào,
  - với glutaraldehyde, neomycin, streptomycin, hoặc polymyxin B (được sử dụng trong quá trình sản xuất và có thể còn lại một lượng rất ít (vết)),
  - với vắc xin ho gà (vô bào hay "toàn tế bào").
- Từng bị phản ứng nghiêm trọng đe dọa tính mạng sau khi tiêm vắc xin này hay vắc xin có thành phần tương tự.
- Trong trường hợp bị sốt hay bị bệnh cấp tính thì phải hoãn việc tiêm ngừa lại.
- Bị bệnh não tiến triển.
- Từng bị bệnh não trong vòng 7 ngày sau khi dùng liều vắc-xin bất kỳ có chứa kháng nguyên ho gà (vắc-xin ho gà toàn tế bào hay ho gà vô bào).

THẬN TRỌNG KHI DÙNG PENTAXIM:

Tính sinh miễn dịch của PENTAXIM có thể bị giảm do điều trị ức chế miễn dịch hay bị suy giảm miễn dịch. Vì vậy, trường hợp này được khuyến cáo nên đợi đến khi kết thúc việc điều trị hay khỏi bệnh rồi mới tiêm ngừa. Tuy nhiên, người ta khuyên vẫn nên tiêm ngừa cho các trẻ bị suy giảm miễn dịch mạn tính ví dụ như bị nhiễm HIV, mặc dù đáp ứng tạo kháng thể có thể bị hạn chế.

Nếu trước đây từng bị hội chứng Guillain-Barre hay viêm đám rối thần kinh cánh tay sau khi tiêm vắc-xin có chứa giải độc tố uốn ván, thì nên cân nhắc cẩn thận giữa lợi ích tiềm tàng và khả năng có thể bị tai biến khi tiêm vắc-xin để quyết định có tiếp tục dùng vắc-xin có chứa giải độc tố uốn ván nữa hay không. Đối với các trẻ nhỏ chưa được tiêm chủng các liều cơ bản đầy đủ (tiêm ít hơn ba liều) thì thường điều chỉnh lịch tiêm.

Không tiêm vào mạch máu: phải chắc chắn rằng kim tiêm không nằm trong mạch máu. Không tiêm trong da.

Cũng như khi sử dụng các vắc-xin bằng đường tiêm khác, phải thận trọng khi tiêm PENTAXIM ở những trẻ bị giảm tiểu cầu hay bị rối loạn chảy máu, vì các trẻ này có nguy cơ bị chảy máu khi tiêm bắp.

Trước khi tiêm vắc-xin phải hỏi kỹ tiền sử y khoa (đặc biệt là tiền sử liên quan đến việc chủng ngừa và bất kỳ tác dụng không mong muốn nào đã từng gặp khi chủng ngừa) và thăm khám lâm sàng.

Nếu đã từng bị bất kỳ triệu chứng nào sau đây, mà tạm thời các triệu chứng này được xem là có liên quan đến việc tiêm vắc-xin, thì phải xem xét cẩn thận khi quyết định cho tiêm liều vắc-xin có chứa thành phần ho gà tiếp theo:

Sốt ≥ 40°C trong vòng 48 giờ, mà không phải do một nguyên nhân xác định nào khác.

Trụy mạch hay tình trạng giống như sốc (giai đoạn giảm trương lực – giảm đáp ứng) trong vòng 48 giờ sau khi tiêm ngừa.

Quấy khóc dai dẳng, khó dỗ kéo dài ≥ 3 giờ, xảy ra trong vòng 48 giờ sau khi tiêm ngừa.

Co giật có hay không có sốt, xảy ra trong vòng 3 ngày sau khi tiêm ngừa.

Tiền sử bị co giật do sốt cao mà không liên quan đến lần tiêm vắc-xin trước đây thì không phải là chống chỉ định tiêm vắc-xin.

Đối với trường hợp này, việc theo dõi thân nhiệt trong 48 giờ sau khi tiêm vắc-xin và cho uống thuốc hạ nhiệt đều đặn trong 48 giờ là đặc biệt quan trọng.

Tiền sử bị co giật không do sốt cao và không liên quan đến việc tiêm vắc-xin trước đây thì phải có ý kiến của bác sĩ chuyên khoa trước khi tiêm vắc-xin.

Nếu từng bị phản ứng phù nề ở chi dưới sau khi tiêm vắc-xin có chứa thành phần *Haemophilus influenzae* týp b, thì hai vắc-xin, vắc-xin bạch hầu - uốn ván – ho gà - bại liệt và vắc-xin cộng hợp *Haemophilus influenzae* týp b nên được tiêm ở hai vị trí tiêm khác nhau vào hai ngày khác nhau.

Giống như khi sử dụng các vắc-xin bằng đường tiêm khác, cần chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện điều trị thích hợp và theo dõi sát người được tiêm để xử trí ngay khi bị phản ứng phản vệ, dù hiếm khi xảy ra.

PENTAXIM không bảo vệ phòng các bệnh nhiễm khuẩn do các týp *Haemophilus influenzae* khác hoặc phòng ngừa viêm màng não do các nguyên nhân khác.

Khi tiêm các liều cơ bản ở những trẻ nhũ nhi sinh quá non tháng (tuổi thai 28 tuần hay trước 28 tuần), đặc biệt đối với những trẻ có tiền sử hệ hô hấp chưa phát triển hoàn chỉnh thì trong 48-72 giờ sau khi tiêm vắc-xin cần lưu ý đến nguy cơ có thể xảy ra cơn ngưng thở tạm thời và cần thiết phải theo dõi hô hấp của đứa bé. Tiêm chủng đem lại nhiều lợi ích ở nhóm trẻ này, vì thế không nên từ chối hoặc trì hoãn việc tiêm chủng.

Ảnh hưởng đến xét nghiệm cận lâm sàng: vì kháng nguyên polysaccharide vỏ Hib được bài tiết trong nước tiểu, có thể thấy xét nghiệm nước tiểu dương tính trong vòng 1 đến 2 tuần sau tiêm vắc-xin. Trong khoảng thời gian này, nên thực hiện các xét nghiệm khác để xác định nhiễm Hib.

Lái xe hoặc vận hành máy: không áp dụng. PENTAXIM chỉ dùng ở trẻ em.

Tá dược có thể gây tác dụng không mong muốn: Formaldehyde, glutaraldehyde, neomycin, streptomycin và polymyxin B.

Dùng cùng lúc với các dược phẩm khác:
Có thể tiêm vắc-xin này cùng lúc với vắc-xin M-M-RVAXPRO hoặc vắc-xin HB-VAXPRO, nhưng tiêm ở hai vị trí khác nhau.

Có thai và cho con bú:
Không áp dụng. PENTAXIM chỉ dùng ở trẻ em.

Quá liều:
Không có tài liệu.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:
Các tác dụng không mong muốn được xếp theo nhóm và tần số xuất hiện và áp dụng quy ước sau:

Rất thường gặp: ≥ 10%
Thường gặp: ≥ 1% và < 10%
Không thường gặp: ≥ 0,1% và < 1%
Hiếm gặp: ≥ 0,01% và < 0,1%
Rất hiếm gặp: < 0,01%,.
Không biết: không thể đánh giá từ các dữ liệu hiện có.

Dựa trên các báo cáo tự phát, một vài tác dụng không mong muốn rất hiếm khi được báo cáo sau khi dùng PENTAXIM. Vì các tác dụng không mong muốn được báo cáo một cách tự nguyện từ một quần thể không xác định được số lượng, vì thế không thể đánh giá đúng tần số xuất hiện hay xác định mối quan hệ nhân quả với vắc xin. Đó là lý do tại sao các tác dụng không mong muốn này được xếp loại tần số là "Không biết".

Trong các nghiên cứu lâm sàng ở trẻ nhỏ được tiêm PENTAXIM trong loạt tiêm chủng cơ bản, các tác dụng không mong muốn có tần số thường gặp nhất là các phản ứng tại nơi tiêm , quấy khóc bất thường, cáu kỉnh và sốt.

Các dấu hiệu và triệu chứng này thường xuất hiện trong vòng 48 giờ sau khi tiêm vắc xin và có thể kéo dài 48 – 72 giờ, thường không cần điều trị đặc hiệu mà tự khỏi.

Tần suất các phản ứng tại nơi tiêm có xu hướng tăng khi tiêm nhắc so với khi tiêm chủng các liều cơ bản.

Rối loạn hệ miễn dịch

Các phản ứng không xác định được tần số xuất hiện
- Phản ứng quá mẫn cảm tức thì như sưng mặt, phù mạch, phù Quincke's, phản ứng phản vệ và sốc.

Rối loạn chuyển hóa và dinh dưỡng

Các phản ứng rất thường gặp:
- Chán ăn, ăn kém ngon.

Rối loạn tâm thần

Các phản ứng rất thường gặp:
- Cáu gắt, dễ bị kích thích.
- Quấy khóc bất thường.

Các phản ứng thường gặp
- Mất ngủ, xáo trộn giấc ngủ.

Các phản ứng không thường gặp:
- Khóc kéo dài khó dỗ.

Rối loạn hệ thần kinh

Các phản ứng rất thường gặp:
- Ngủ gà.

Các phản ứng không xác định được tần số xuất hiện
- Co giật có hay không có sốt kèm theo.
- Các đợt giảm đáp ứng – giảm trương lực.

Rối loạn dạ dày – ruột

Các phản ứng rất thường gặp:
- Nôn

Các phản ứng thường gặp:
- Tiêu chảy.

Rối loạn da và mô dưới da

Các phản ứng không xác định được tần số xuất hiện

- Phát ban, ban đỏ, mày đay

Rối loạn toàn thân và tình trạng tại nơi tiêm

Các phản ứng rất thường gặp:

- Quầng đỏ tại nơi tiêm.
- Sốt ≥ 38°C.
- Sưng tại nơi tiêm.
- Đau tại nơi tiêm.

Các phản ứng thường gặp

- Cứng tại nơi tiêm.

Các phản ứng không thường gặp:

- Sốt ≥ 39°C
- Đỏ và sưng ≥ 5 cm tại nơi tiêm

Các phản ứng hiếm gặp:

- Sốt > 40°C

Phản ứng sưng phù một hay cả hai chi dưới sau khi tiêm các vắc-xin chứa thành phần *Haemophilus influenzae* týp b hiếm gặp. Những phản ứng này thường xuất hiện sau khi tiêm các liều cơ bản, trong vòng vài giờ sau khi tiêm vắc xin và tự khỏi không để lại di chứng trong vòng 24 giờ. Các phản ứng này có thể kèm với tím tái, hồng ban, ban xuất huyết thoáng qua và khóc dữ dội.

Các phản ứng không xác định được tần số xuất hiện

- Phản ứng lan rộng tại nơi tiêm (> 50 mm), kể cả sưng chi lan rộng có thể từ nơi tiêm lan rộng ra khắp chi vượt quá một hay hai khớp. Các phản ứng này thường khởi phát trong vòng 24 – 72 giờ sau khi tiêm vắc-xin và có thể kèm với các triệu chứng khác như hồng ban, nóng, nhạy cảm đau khi thôi đè vào hay đau tại nơi tiêm. Các phản ứng này tự khỏi trong vòng 3 – 5 ngày. Nguy cơ xuất hiện phụ thuộc vào số liều vắc-xin có chứa thành phần ho gà vô bào đã tiêm, với khả năng thường gặp hơn sau liều 4 và liều 5

Các tác dụng không mong muốn tiềm tàng (nghĩa là không báo cáo trực tiếp do dùng PENTAXIM, nhưng được báo cáo khi dùng các vắc-xin có chứa một hay nhiều thành phần kháng nguyên có trong PENTAXIM):

- Hội chứng Guillain-Barre và viêm đám rối thần kinh cánh tay sau khi tiêm vắc-xin có chứa giải độc tố uốn ván.

Thông tin bổ sung liên quan đến quần thể đặc biệt

Cơn ngưng thở tạm thời ở những bé sinh quá non tháng (tuổi thai 28 tuần hay trước 28 tuần) (xem mục THẬN TRỌNG KHI DÙNG PENTAXIM).

Báo cáo các phản ứng bất lợi đáng ngờ

Việc báo cáo các phản ứng bất lợi đáng ngờ sau khi sản phẩm thuốc được cấp phép lưu hành là rất quan trọng. Điều này cho phép tiếp tục theo dõi cân bằng lợi ích/nguy cơ của sản phẩm thuốc. Nhân viên y tế được yêu cầu báo cáo mọi phản ứng bất lợi nghi ngờ qua hệ thống báo cáo quốc gia đến Trung tâm Quốc gia về thông tin thuốc và theo dõi phản ứng có hại của thuốc theo địa chỉ email : di.pvcenter@gmail.com

BẢO QUẢN PENTAXIM:

Để xa tầm tay và tầm mắt của trẻ em.

Bảo quản ở nhiệt độ từ +2°C đến +8°C (trong tủ lạnh). Không được để đông băng.

Không sử dụng sau ngày hết hạn sử dụng ghi trên nhãn, trên hộp.

Không sử dụng nếu nhận thấy vắc-xin có màu sắc bất thường hay có phần tử lạ.

Không được vứt bỏ thuốc vào cống hay thùng rác gia đình. Sản phẩm không còn sử dụng hay rác thải phải được xử lý theo quy định hiện hành.

TUỔI THỌ

36 tháng.

Tuổi thọ của vắc xin "Conjugate vaccine Haemophilus type b" là 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tuổi thọ của vắc xin "Diphtheria, Tetanus, Pertussis (acellular, component), Poliomyelitis (inactivated) vaccine (adsorbed)" là 36 tháng kể từ ngày làm thử nghiệm công hiệu hợp lệ đầu tiên.

Pentaxim là vắc-xin phối hợp gồm vắc-xin "Conjugate vaccine Haemophilus type b " và vắc xin "Diphtheria, Tetanus, Pertussis (acellular, component), Poliomyelitis (inactivated) vaccine (adsorbed)". Vì thế, hạn dùng của Pentaxim là hạn dùng đến sớm nhất trong hạn dùng của từng vắc xin kể trên.

Sau khi hoàn nguyên phải sử dụng vắc xin ngay tức thì.

HẠN DÙNG

Xem ngày hết hạn dùng "EXP" trên bao bì. Không sử dụng sau hạn dùng được ghi trên bao bì.

TÊN VÀ ĐỊA CHỈ NHÀ SẢN XUẤT / ĐƠN VỊ ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP LƯU HÀNH

SANOFI PASTEUR S.A.

Trụ sở chính: 2 avenue Pont Pasteur, 69007 Lyon – Pháp.

Sản xuất bởi **SANOFI PASTEUR S.A.** tại Campus Mérieux, 1541 avenue Marcel Mérieux, 69280 Marcy l'Etoile – Pháp (địa điểm 1) / Parc Industriel d'Incarville, 27100 Val de Reuil – Pháp (địa điểm 2). Vắc-xin Hib đóng ống và đông khô tại Sanofi S.P.A. Loc. Valcanello, 03012 Anagni (FR) – Ý.

TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT: Tiêu chuẩn cơ sở.

Ngày phê duyệt tờ hướng dẫn sử dụng:

SANOFI PASTEUR

Nội dung nhãn phụ PENTAXIM hộp 1 lọ, lọ 1 liều vắc-xin Hib đông khô + 1 bơm tiêm *có kim tiêm*, mỗi bơm tiêm nạp sẵn 1 liều (0,5 ml) vắc-xin DTacP-IPV dạng hỗn dịch

℞ Thuốc bán theo đơn

PENTAXIM

VẮC-XIN HẤP PHỤ BẠCH HẦU, UỐN VÁN, HO GÀ (VÔ BÀO, THÀNH PHẦN), BẠI LIỆT (BẤT HOẠT) VÀ VẮC-XIN CỘNG HỢP *HAEMOPHILUS INFLUENZAE* TÝP b

Hộp 1 lọ, lọ 1 liều vắc-xin đông khô + 1 bơm tiêm có gắn sẵn kim tiêm, mỗi bơm tiêm nạp sẵn 1 liều (0,5ml) vắc-xin dạng hỗn dịch; hoàn nguyên thành hỗn dịch tiêm.

Các hoạt chất: sau khi hoàn nguyên mỗi liều (0,5 ml) chứa Giải độc tố bạch hầu: ≥ 30 IU; Giải độc tố uốn ván: ≥ 40 IU; kháng nguyên *Bordetella pertussis*: Giải độc tố 25 mcg, Ngưng kết tố hồng cầu dạng sợi (FHA) 25 mcg; Virus bại liệt týp 1 bất hoạt: 40 DU, Virus bại liệt týp 2 bất hoạt: 8 DU, Virus bại liệt týp 3 bất hoạt: 32 DU; Polysaccharide của *Haemophilus influenzae* týp b cộng hợp với protein uốn ván: 10 mcg.

Tiêm bắp. Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và các thông tin khác: xem trong tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Bảo quản ở nhiệt độ từ +2°C đến +8°C. Không để đông băng. Để xa tầm tay trẻ em.

Tiêu chuẩn SX: TCCS. Số lô SX, NSX và HD: xem LOT, MANUF. và EXP. trên bao bì. Ngày hết hạn dùng là ngày cuối cùng của tháng hạn dùng (EXP.) trên bao bì.

SX bởi **SANOFI PASTEUR S.A.** tại Campus Mérieux, 1541 avenue Marcel Mérieux, 69280 Marcy l'Etoile – Pháp (địa điểm 1) / Parc Industriel d'Incarville, 27100 Val de Reuil – Pháp (địa điểm 2). Vắc-xin Hib đóng ống và đông khô tại Sanofi S.P.A. Loc. Valcanello, 03012 Anagni (FR) – Ý.

DNNK: Số ĐK:

Nhãn phụ trên hộp 1 lọ 1 liều vắc-xin Hib đông khô + 1 bơm tiêm *có kim tiêm* nạp sẵn 1 liều (0,5 ml) vắc-xin DTacP-IPV dạng hỗn dịch.
Kích thước 90 x 42 mm

℞ Thuốc bán theo đơn **PENTAXIM**

VẮC-XIN HẤP PHỤ BẠCH HẦU, UỐN VÁN, HO GÀ (VÔ BÀO, THÀNH PHẦN), BẠI LIỆT (BẤT HOẠT) VÀ VẮC-XIN CỘNG HỢP *HAEMOPHILUS INFLUENZAE* TÝP b

Hộp 1 lọ, lọ 1 liều vắc-xin đông khô + 1 bơm tiêm có gắn sẵn kim tiêm, mỗi bơm tiêm nạp sẵn 1 liều (0,5ml) vắc-xin dạng hỗn dịch; hoàn nguyên thành hỗn dịch tiêm.

Các hoạt chất: sau khi hoàn nguyên mỗi liều (0,5 ml) chứa Giải độc tố bạch hầu: ≥ 30 IU; Giải độc tố uốn ván: ≥ 40 IU; kháng nguyên *Bordetella pertussis*: Giải độc tố 25 mcg, Ngưng kết tố hồng cầu dạng sợi (FHA) 25 mcg; Virus bại liệt týp 1 bất hoạt: 40 DU, Virus bại liệt týp 2 bất hoạt: 8 DU, Virus bại liệt týp 3 bất hoạt: 32 DU; Polysaccharide của *Haemophilus influenzae* týp b cộng hợp với protein uốn ván: 10 mcg.

Tiêm bắp. Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và các thông tin khác: xem trong tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo. **Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.**

Bảo quản ở nhiệt độ từ +2°C đến +8°C. Không để đông băng. Để xa tầm tay trẻ em.

Tiêu chuẩn SX: TCCS. Số lô SX, NSX và HD: xem LOT, Manuf. và Exp. trên bao bì. Ngày hết hạn dùng là ngày cuối cùng của tháng hạn dùng (EXP.) trên bao bì. SX bởi **SANOFI PASTEUR S.A.** tại Campus Mérieux, 1541 avenue Marcel Mérieux, 69280 Marcy l'Etoile – Pháp (địa điểm 1) / Parc Industriel d'Incarville, 27100 Val de Reuil – Pháp (địa điểm 2). Vắc-xin Hib đóng ống và đông khô tại Sanofi S.P.A. Loc. Valcanello, 03012 Anagni (FR) – Ý.

DNNK: Số ĐK:

PENTAXIM
1 seringue/syringe + 1 flacon/vial

SANOFI PASTEUR SA
2, avenue Pont Pasteur
69007 Lyon - France/Francia

EXP:
LOT:
MANUF.

℞ Thuốc bán theo đơn **PENTAXIM**

VẮC-XIN HẤP PHỤ BẠCH HẦU, UỐN VÁN, HO GÀ (VÔ BÀO, THÀNH PHẦN), BẠI LIỆT (BẤT HOẠT) VÀ VẮC-XIN CỘNG HỢP *HAEMOPHILUS INFLUENZAE* TÝP b

Hộp 1 lọ, lọ 1 liều vắc-xin đông khô + 1 bơm tiêm có gắn sẵn kim tiêm, mỗi bơm tiêm nạp sẵn 1 liều (0,5ml) vắc-xin dạng hỗn dịch; hoàn nguyên thành hỗn dịch tiêm.

Các hoạt chất: sau khi hoàn nguyên mỗi liều (0,5 ml) chứa Giải độc tố bạch hầu: ≥ 30 IU; Giải độc tố uốn ván: ≥ 40 IU; kháng nguyên *Bordetella pertussis*: Giải độc tố 25 mcg, Ngưng kết tố hồng cầu dạng sợi (FHA) 25 mcg; Virus bại liệt týp 1 bất hoạt: 40 DU, Virus bại liệt týp 2 bất hoạt: 8 DU, Virus bại liệt týp 3 bất hoạt: 32 DU; Polysaccharide của *Haemophilus influenzae* týp b cộng hợp với protein uốn ván: 10 mcg.

Tiêm bắp. Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và các thông tin khác: xem trong tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo. **Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.**

Bảo quản ở nhiệt độ từ +2°C đến +8°C. Không để đông băng. Để xa tầm tay trẻ em.

Tiêu chuẩn SX: TCCS. Số lô SX, NSX và HD: xem LOT, Manuf. và Exp. trên bao bì. Ngày hết hạn dùng là ngày cuối cùng của tháng hạn dùng (EXP.) trên bao bì. SX bởi **SANOFI PASTEUR S.A.** tại Campus Mérieux, 1541 avenue Marcel Mérieux, 69280 Marcy l'Etoile – Pháp (địa điểm 1) / Parc Industriel d'Incarville, 27100 Val de Reuil – Pháp (địa điểm 2). Vắc-xin Hib đóng ống và đông khô tại Sanofi S.P.A. Loc. Valcanello, 03012 Anagni (FR) – Ý.

DNNK: Số ĐK:

PENTAXIM
1 jeringa + 1 frasco

283 970240

Après reconstitution une dose (0,5 ml) contient :
Anatoxine diphtérique[1] ..... ≥ 30 UI
Anatoxine tétanique[1] ..... ≥ 40 UI
Antigènes de *Bordetella pertussis* :
Anatoxine pertussique[1] ..... 25 microgrammes
Hémagglutinine filamenteuse ..... 25 microgrammes
Virus poliomyélitique (inactivé)
- type 1 (Mahoney) ..... 40 UD [2][3][4]
- type 2 (MEF-1) ..... 8 UD [2][3][4]
- type 3 (Saukett) ..... 32 UD [2][3][4]

Polyoside d'*Haemophilus influenzae* type b ..... 10 microgrammes
conjugué à la protéine tétanique ..... 18-30 microgrammes
[1] adsorbée sur hydroxyde d'aluminium, hydraté ..... 0,3 mg Al^{3+}
[2] UD : unité d'antigène D.
[3] ou quantité d'antigène équivalente déterminée selon une méthode immunochimique appropriée.
[4] produits sur cellules VERO.

Liste des excipients :
Saccharose, trométamol, hydroxyde d'aluminium, milieu de Hanks sans rouge de phénol (incluant la phénylalanine et le glucose), acide acétique et/ou hydroxyde de sodium (pour ajustement du pH), formaldéhyde, phénoxyéthanol et eau pour préparations injectables.
Lire la notice avant utilisation.
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
Utiliser immédiatement après reconstitution.
A conserver au réfrigérateur. Ne pas congeler.

PENTAXIM

VACCIN DIPHTÉRIQUE, TÉTANIQUE, COQUELUCHEUX (ACELLULAIRE, MULTICOMPOSÉ), POLIOMYÉLITIQUE (INACTIVÉ) ET CONJUGUÉ DE L'HAEMOPHILUS TYPE b, ADSORBÉ / DIPHTHERIA, TETANUS, PERTUSSIS (ACELLULAR, COMPONENT), POLIOMYELITIS (INACTIVATED) VACCINE AND HAEMOPHILUS TYPE b CONJUGATE VACCINE, ADSORBED / VACUNA ANTIDIFTÉRICA, ANTITETÁNICA, CONTRA LA TOS FERINA (ACELULAR, MULTICOMPUESTA), ANTIPOLIMIELÍTICA (INACTIVADA) Y CONJUGADA CONTRA EL HAEMOPHILUS DE TIPO b, ADSORBIDA

Poudre en flacon et suspension pour suspension injectable en seringue préremplie (0,5 ml) – Boîte de 1
Powder in vial and suspension for suspension for injection in prefilled syringe (0.5 ml) – Box of 1
Polvo en frasco y suspensión para suspensión inyectable en jeringa precargada (0,5 ml) – Caja de 1

Voie intramusculaire / Intramuscular route / Vía intramuscular

SANOFI PASTEUR

After reconstitution, one dose (0.5 ml) contains:
Diphtheria toxoid[1] ..... ≥ 30 IU
Tetanus toxoid[1] ..... ≥ 40 IU
Bordetella pertussis antigens:
Pertussis toxoid[1] ..... 25 micrograms
Filamentous haemagglutinin[1] ..... 25 micrograms
Poliomyelitis virus (inactivated)
- type 1 (Mahoney strain) ..... 40 DU [2][3][4]
- type 2 (MEF-1 strain) ..... 8 DU [2][3][4]
- type 3 (Saukett strain) ..... 32 DU [2][3][4]

Polysaccharide of *Haemophilus influenzae* type b ..... 10 micrograms
conjugated to the tetanus protein ..... 18-30 micrograms
[1] adsorbed on aluminium hydroxide, hydrated ..... 0.3 mg Al^{3+}
[2] DU: D antigen unit.
[3] or equivalent antigenic quantity determined by a suitable immunochemical method.
[4] produced on VERO cells.

List of excipients:
Saccharose, tromethamol, aluminium hydroxide, Hanks medium without phenol red (including phenylalanine and glucose), acetic acid and/or sodium hydroxide (for pH adjustment), formaldehyde, phenoxyethanol and water for injections.
Read the leaflet before use.
Keep out of the reach and sight of children.
Use immediately after reconstitution.
Store in a refrigerator. Do not freeze.

V2 30/06/2014 - CT

Code article : **970240**

Sanofi Pasteur
Export F/A/E

09702400

Repères d'arêtes n° : 1 - 7

Format : 48,5 x 22,5 x 141,5 mm

3 REF. PANTONE :
Reflex Blue (Textes + Logo)
285 C (Dégradé)
252 C (Demi-soleil)
Tracé

PENTAXIM
1 seringue/syringe + 1 flacon/vial

SANOFI PASTEUR SA
2, avenue Pont Pasteur
69007 Lyon - France/Francia

EXP:
LOT:
MANUF:

Después de reconstitución, una dosis (0,5 ml) contiene:
Toxoide diftérico[1] ..... ≥ 30 UI
Toxoide tetánico[1] ..... ≥ 40 UI
Antígenos de *Bordetella pertussis*:
Toxoide pertúsico[1] ..... 25 microgramos
Hemaglutinina filamentosa[1] ..... 25 microgramos
Poliovirus (inactivado)
- tipo 1 (cepa Mahoney) ..... 40 UD [2][3][4]
- tipo 2 (cepa MEF-1) ..... 8 UD [2][3][4]
- tipo 3 (cepa Saukett) ..... 32 UD [2][3][4]
Polisacárido de *Haemophilus influenzae* tipo b ..... 10 microgramos
conjugado con proteína tetánica ..... 18-30 microgramos

[1] adsorbida en hidróxido de aluminio, hidratado ..... 0,3 mg Al^{3+}
[2] UD: unidad de antígeno D.
[3] o cantidad equivalente de antígeno, determinada según unmétodo inmunoquímico apropiado.
[4] producidos a partir de células VERO.

Lista de excipientes:
Sacarosa, trometamol, hidróxido de aluminio, medio de Hanks sin rojo de fenol (incluyendo la fenilalanina y la glucosa), ácido acético y/o hidróxido de sodio (para ajuste del pH), formaldehído, fenoxietanol y agua para inyectables.

Leer el prospecto antes de usar.
Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños.
Usar inmediatamente después de la reconstitución.
Conservar en el refrigerador. No congelar.

PENTAXIM
1 jeringa + 1 frasco

Après reconstitution une dose (0,5 ml) contient :
Anatoxine diphtérique[1] ..... ≥ 30 UI
Anatoxine tétanique[1] ..... ≥ 40 UI
Antigènes de *Bordetella pertussis* :
Anatoxine pertussique[1] ..... 25 microgrammes
Hémagglutinine filamenteuse ..... 25 microgrammes
Virus poliomyélitique (inactivé)
- type 1 (Mahoney) ..... 40 UD [2][3][4]
- type 2 (MEF-1) ..... 8 UD [2][3][4]
- type 3 (Saukett) ..... 32 UD [2][3][4]

Polyoside d'*Haemophilus influenzae* type b ..... 10 microgrammes
conjugué à la protéine tétanique ..... 18-30 microgrammes

[1] adsorbée sur hydroxyde d'aluminium, hydraté ..... 0,3 mg Al^{3+}
[2] UD : unité d'antigène D.
[3] ou quantité d'antigène équivalente déterminée selon une méthode immunochimique appropriée.
[4] produits sur cellules VERO.

Liste des excipients :
Saccharose, trométamol, hydroxyde d'aluminium, milieu de Hanks sans rouge de phénol (incluant la phénylalanine et le glucose), acide acétique et/ou hydroxyde de sodium (pour ajustement du pH), formaldéhyde, phénoxyéthanol et eau pour préparations injectables.
Lire la notice avant utilisation.
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
Utiliser immédiatement après reconstitution.
A conserver au réfrigérateur. Ne pas congeler.

283 970240

CÔNG TY SANOFI PASTEUR VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PENTAXIM

VACCIN DIPHTÉRIQUE, TÉTANIQUE, COQUELUCHEUX (ACELLULAIRE, MULTICOMPOSÉ), POLIOMYÉLITIQUE (INACTIVÉ) ET CONJUGUÉ DE L'HAEMOPHILUS TYPE b, ADSORBÉ / DIPHTHERIA, TETANUS, PERTUSSIS (ACELLULAR, COMPONENT), POLIOMYELITIS (INACTIVATED) VACCINE AND HAEMOPHILUS TYPE b CONJUGATE VACCINE, ADSORBED / VACUNA ANTIDIFTÉRICA, ANTITETÁNICA, CONTRA LA TOS FERINA (ACELULAR, MULTICOMPUESTA), ANTIPOLIMIELÍTICA (INACTIVADA) Y CONJUGADA CONTRA EL HAEMOPHILUS DE TIPO b, ADSORBIDA

Poudre en flacon et suspension pour suspension injectable en seringue préremplie (0,5 ml) – Boîte de 1
Powder in vial and suspension for suspension for injection in prefilled syringe (0.5 ml) – Box of 1
Polvo en frasco y suspensión para suspensión inyectable en jeringa precargada (0,5 ml) – Caja de 1

Voie intramusculaire / Intramuscular route / Vía intramuscular

SANOFI PASTEUR

After reconstitution, one dose (0.5 ml) contains:
Diphtheria toxoid[1] ..... ≥ 30 IU
Tetanus toxoid[1] ..... ≥ 40 IU
Bordetella pertussis antigens:
Pertussis toxoid[1] ..... 25 micrograms
Filamentous haemagglutinin[1] ..... 25 micrograms
Poliomyelitis virus (inactivated)
- type 1 (Mahoney strain) ..... 40 DU [2][3][4]
- type 2 (MEF-1 strain) ..... 8 DU [2][3][4]
- type 3 (Saukett strain) ..... 32 DU [2][3][4]

Polysaccharide of *Haemophilus influenzae* type b ..... 10 micrograms
conjugated to the tetanus protein ..... 18-30 micrograms

[1] adsorbed on aluminium hydroxide, hydrated ..... 0.3 mg Al^{3+}
[2] DU: D antigen unit.
[3] or equivalent antigenic quantity determined by a suitable immunochemical method.
[4] produced on VERO cells.

List of excipients:
Saccharose, tromethamol, aluminium hydroxide, Hanks medium without phenol red (including phenylalanine and glucose), acetic acid and/or sodium hydroxide (for pH adjustment), formaldehyde, phenoxyethanol and water for injections.
Read the leaflet before use.
Keep out of the reach and sight of children.
Use immediately after reconstitution.
Store in a refrigerator. Do not freeze.

V2 30/06/2014 - CT

Code article : **970240**

Sanofi Pasteur
Export F/A/E

09702400

Repères d'arêtes n° : 1 - 7

Format : 48,5 x 22,5 x 141,5 mm

3 REF. PANTONE :
Reflex Blue (Textes + Logo)
285 C (Dégradé)
252 C (Demi-soleil)
Tracé

Nội dung nhãn phụ PENTAXIM hộp 1 lọ, lọ 1 liều vắc-xin Hib đông khô + 1 bơm tiêm *không gắn kim tiêm* nạp sẵn 1 liều (0,5 ml) vắc-xin DTacP-IPV dạng hỗn dịch, có kèm theo 2 kim tiêm.

CÔNG TY SANOFI PASTEUR VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

℞ Thuốc bán theo đơn

PENTAXIM

VẮC-XIN HẤP PHỤ BẠCH HẦU, UỐN VÁN, HO GÀ (VÔ BÀO, THÀNH PHẦN), BẠI LIỆT (BẤT HOẠT) VÀ VẮC-XIN CỘNG HỢP *HAEMOPHILUS INFLUENZAE* TÝP b

Hộp 1 lọ, lọ 1 liều vắc-xin đông khô + 1 bơm tiêm không gắn kim tiêm kèm theo 2 kim tiêm, mỗi bơm tiêm nạp sẵn 1 liều (0,5ml) vắc-xin dạng hỗn dịch; hoàn nguyên thành hỗn dịch tiêm.

Các hoạt chất: sau khi hoàn nguyên mỗi liều (0,5 ml) chứa Giải độc tố bạch hầu: ≥ 30 IU; Giải độc tố uốn ván: ≥ 40 IU; kháng nguyên *Bordetella pertussis*: Giải độc tố 25 mcg, Ngưng kết tố hồng cầu dạng sợi (FHA) 25 mcg; Virus bại liệt týp 1 bất hoạt: 40 DU, Virus bại liệt týp 2 bất hoạt: 8 DU, Virus bại liệt týp 3 bất hoạt: 32 DU; Polysaccharide của *Haemophilus influenzae* týp b cộng hợp với protein uốn ván: 10 mcg.

Tiêm bắp. Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và các thông tin khác: xem trong tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Bảo quản ở nhiệt độ từ +2°C đến +8°C. Không để đông băng. Để xa tầm tay trẻ em.

Tiêu chuẩn SX: TCCS. Số lô SX, NSX và HD: xem LOT, MANUF. và EXP. trên bao bì. Ngày hết hạn dùng là ngày cuối cùng của tháng hạn dùng (EXP.) trên bao bì. SX bởi **SANOFI PASTEUR S.A.** tại Campus Mérieux, 1541 avenue Marcel Mérieux, 69280 Marcy l'Etoile – Pháp (địa điểm 1) / Parc Industriel d'Incarville, 27100 Val de Reuil – Pháp (địa điểm 2). Vắc-xin Hib đóng ống và đông khô tại Sanofi S.P.A. Loc. Valcanello, 03012 Anagni (FR) – Ý.

DNNK: Số ĐK:

Nội dung nhãn phụ PENTAXIM hộp 1 lọ, lọ 1 liều vắc-xin Hib đông khô + 1 bơm tiêm *không gắn kim tiêm* kèm theo 2 kim tiêm, mỗi bơm tiêm nạp sẵn 1 liều (0,5 ml) vắc-xin DTacP-IPV dạng hỗn dịch
Kích thước nhãn phụ 47 x 87 mm

℞ Thuốc bán theo đơn PENTAXIM

VẮC-XIN HẤP PHỤ BẠCH HẦU, UỐN VÁN, HO GÀ (VÔ BÀO, THÀNH PHẦN), BẠI LIỆT (BẤT HOẠT) VÀ VẮC-XIN CỘNG HỢP *HAEMOPHILUS INFLUENZAE* TÝP b

Hộp 1 lọ, lọ 1 liều vắc-xin đông khô + 1 bơm tiêm không gắn kim tiêm kèm theo 2 kim tiêm, mỗi bơm tiêm nạp sẵn 1 liều (0,5ml) vắc-xin dạng hỗn dịch; hoàn nguyên thành hỗn dịch tiêm.

Các hoạt chất: sau khi hoàn nguyên mỗi liều (0,5 ml) chứa Giải độc tố bạch hầu: ≥ 30 IU; Giải độc tố uốn ván: ≥ 40 IU; kháng nguyên *Bordetella pertussis*: Giải độc tố 25 mcg, Ngưng kết tố hồng cầu dạng sợi (FHA) 25 mcg; Virus bại liệt týp 1 bất hoạt: 40 DU, Virus bại liệt týp 2 bất hoạt: 8 DU, Virus bại liệt týp 3 bất hoạt: 32 DU; Polysaccharide của *Haemophilus influenzae* týp b cộng hợp với protein uốn ván: 10 mcg.


Tiêm bắp. Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và các thông tin khác: xem trong tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo. **Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.**

Bảo quản ở nhiệt độ từ +2°C đến +8°C. Không để đông băng. Để xa tầm tay trẻ em.

Tiêu chuẩn SX: TCCS. Số lô SX, NSX và HD: xem LOT, Manuf và Exp trên bao bì. Ngày hết hạn dùng là ngày cuối cùng của tháng hạn dùng (EXP.) trên bao bì.

SX bởi **SANOFI PASTEUR S.A.** tại Campus Mérieux, 1541 avenue Marcel Mérieux, 69280 Marcy l'Etoile – Pháp (địa điểm 1) / Parc Industriel d'Incarville, 27100 Val de Reuil – Pháp (địa điểm 2). Vắc-xin Hib đóng ống và đông khô tại Sanofi S.P.A. Loc. Valcanello, 03012 Anagni (FR) – Ý.

DNNK: Số ĐK:



V2 23/06/2014 - CT/JMI

Code article : 970250

Sanofi Pasteur
Export F/A/E

09702509

Repères d'arêtes n° : 1-2-13

Format : 48,5 x 22,5 x 141,5 mm

3 REF. PANTONE :
Reflex Blue (Textes + Logo)
285 C (Dégradé)
252 C (Demi-soleil)
Tracé

PENTAXIM
1 seringue/syringe + 1 flacon/vial

SANOFI PASTEUR SA
2, avenue Pont Pasteur
69007 Lyon - France/Francia

EXP:
LOT:
MANUF:

Después de reconstitución, una dosis (0,5 ml) contiene:
Toxoide diftérico[1] ..... ≥ 30 UI
Toxoide tetánico[1] ..... ≥ 40 UI
Antígenos de *Bordetella pertussis*:
Toxoide pertúsico[1] ..... 25 microgramos
Hemaglutinina filamentosa[1] ..... 25 microgramos
Poliovirus (inactivado)
- tipo 1 (cepa Mahoney) ..... 40 UD [2][3][4]
- tipo 2 (cepa MEF-1) ..... 8 UD [2][3][4]
- tipo 3 (cepa Saukett) ..... 32 UD [2][3][4]
Polisacárido de *Haemophilus influenzae* tipo b ..... 10 microgramos
conjugado con proteína tetánica .....18-30 microgramos

[1] adsorbida en hidróxido de aluminio, hidratado ..... 0,3 mg Al^{3+}
[2] UD: unidad de antígeno D.
[3] o cantidad equivalente de antígeno, determinada según unmétodo inmunoquímico apropiado.
[4] producidos a partir de células VERO.

Lista de excipientes:
Sacarosa, trometamol, hidróxido de aluminio, medio de Hanks sin rojo de fenol (incluyendo la fenilalanina y la glucosa), ácido acético y/o hidróxido de sodio (para ajuste del pH), formaldehído, fenoxietanol y agua para inyectables.

Leer el prospecto antes de usar.
Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños.
Usar inmediatamente después de la reconstitución.
Conservar en el refrigerador. No congelar.

PENTAXIM
1 jeringa + 1 frasco

Après reconstitution une dose (0,5 ml) contient :
Anatoxine diphtérique[1] ..... ≥ 30 UI
Anatoxine tétanique[1] ..... ≥ 40 UI
Antigènes de *Bordetella pertussis* :
Anatoxine pertussique[1] .....25 microgrammes
Hémagglutinine filamenteuse .....25 microgrammes
Virus poliomyélitique (inactivé)
- type 1 (Mahoney) ..... 40 UD [2][3][4]
- type 2 (MEF-1) ..... 8 UD [2][3][4]
- type 3 (Saukett) ..... 32 UD [2][3][4]

Polyoside d'*Haemophilus influenzae* type b .....
..... 10 microgrammes
conjugué à la protéine tétanique .....
..... 18-30 microgrammes

[1] adsorbée sur hydroxyde d'aluminium, hydraté ..... 0,3 mg Al^{3+}
[2] UD : unité d'antigène D.
[3] ou quantité d'antigène équivalente déterminée selon une méthode immunochimique appropriée.
[4] produits sur cellules VERO.

Liste des excipients :
Saccharose, trométamol, hydroxyde d'aluminium, milieu de Hanks sans rouge de phénol (incluant la phénylalanine et le glucose), acide acétique et/ou hydroxyde de sodium (pour ajustement du pH), formaldéhyde, phénoxyéthanol et eau pour préparations injectables.
Lire la notice avant utilisation.
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
Utiliser immédiatement après reconstitution.
A conserver au réfrigérateur. Ne pas congeler.

970250 282

PENTAXIM

VACCIN DIPHTÉRIQUE, TÉTANIQUE, COQUELUCHEUX (ACELLULAIRE, MULTICOMPOSÉ), POLIOMYÉLITIQUE (INACTIVÉ) ET CONJUGUÉ DE L'HAEMOPHILUS TYPE b, ADSORBÉ / DIPHTHERIA, TETANUS, PERTUSSIS (ACELLULAR, COMPONENT), POLIOMYELITIS (INACTIVATED) VACCINE AND HAEMOPHILUS TYPE b CONJUGATE VACCINE, ADSORBED / VACUNA ANTIDIFTÉRICA, ANTITETÁNICA, CONTRA LA TOS FERINA (ACELULAR, MULTICOMPUESTA), ANTIPOLIMIELÍTICA (INACTIVADA) Y CONJUGADA CONTRA EL HAEMOPHILUS DE TIPO b, ADSORBIDA

Poudre en flacon et suspension pour suspension injectable en seringue préremplie (0,5 ml) avec deux aiguilles séparées – Boîte de 1
Powder in vial and suspension for suspension for injection in prefilled syringe (0.5 ml) with two separate needles – Box of 1
Polvo en frasco y suspensión para suspensión inyectable en jeringa precargada (0,5 ml) con dos agujas separadas – Caja de 1

Voie intramusculaire / Intramuscular route / Vía intramuscular

SANOFI PASTEUR

After reconstitution, one dose (0.5 ml) contains:
Diphtheria toxoid[1] ..... ≥ 30 IU
Tetanus toxoid[1] ..... ≥ 40 IU
Bordetella pertussis antigens:
Pertussis toxoid[1] ..... 25 micrograms
Filamentous haemagglutinin[1] ..... 25 micrograms
Poliomyelitis virus (inactivated)
- type 1 (Mahoney strain) ..... 40 DU [2][3][4]
- type 2 (MEF-1 strain) ..... 8 DU [2][3][4]
- type 3 (Saukett strain) ..... 32 DU [2][3][4]

Polysaccharide of *Haemophilus influenzae* type b .
..... 10 micrograms
conjugated to the tetanus protein .....
.....18-30 micrograms

[1] adsorbed on aluminium hydroxide, hydrated .....
..... 0.3 mg Al^{3+}
[2] DU: D antigen unit.
[3] or equivalent antigenic quantity determined by a suitable immunochemical method.
[4] produced on VERO cells.

List of excipients:
Saccharose, tromethamol, aluminium hydroxide, Hanks medium without phenol red (including phenylalanine and glucose), acetic acid and/or sodium hydroxide (for pH adjustment), formaldehyde, phenoxyethanol and water for injections.
Read the leaflet before use.
Keep out of the reach and sight of children.
Use immediately after reconstitution.
Store in a refrigerator. Do not freeze.

SANOFI PASTEUR VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

V2 23/06/2014 - CT/JMI

Code article : **970250**
Sanofi Pasteur
Export F/A/E

09702509

Repères d'arêtes n° : **1-2-13**

Format : 48,5 x 22,5 x 141,5 mm

3 REF. PANTONE :
Reflex Blue (Textes + Logo)
285 C (Dégradé)
252 C (Demi-soleil)
Tracé

Nhãn phụ PENTAXIM hộp 10 lọ, lọ 1 liều vắc-xin Hib đông khô + 10 bơm tiêm *có kim tiêm*, mỗi bơm tiêm nạp sẵn 1 liều (0,5 ml) vắc-xin DTacP-IPV dạng hỗn dịch

℞ Thuốc bán theo đơn

PENTAXIM

VẮC-XIN HẤP PHỤ BẠCH HẦU, UỐN VÁN, HO GÀ (VÔ BÀO, THÀNH PHẦN), BẠI LIỆT (BẤT HOẠT) VÀ VẮC-XIN CỘNG HỢP *HAEMOPHILUS INFLUENZAE* TÝP b

Hộp 10 lọ, lọ 1 liều vắc-xin đông khô + 10 bơm tiêm có gắn sẵn kim tiêm, mỗi bơm tiêm nạp sẵn 1 liều (0,5ml) vắc-xin dạng hỗn dịch; hoàn nguyên thành hỗn dịch tiêm.

Các hoạt chất: sau khi hoàn nguyên mỗi liều (0,5 ml) chứa Giải độc tố bạch hầu: ≥ 30 IU; Giải độc tố uốn ván: ≥ 40 IU; kháng nguyên *Bordetella pertussis*: Giải độc tố 25 mcg, Ngưng kết tố hồng cầu dạng sợi (FHA) 25 mcg; Virus bại liệt týp 1 bất hoạt: 40 DU, Virus bại liệt týp 2 bất hoạt: 8 DU, Virus bại liệt týp 3 bất hoạt: 32 DU; Polysaccharide của *Haemophilus influenzae* týp b cộng hợp với protein uốn ván: 10 mcg.

Tiêm bắp. Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và các thông tin khác: xem trong tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Bảo quản ở nhiệt độ từ +2°C đến +8°C. Không để đông băng. Để xa tầm tay trẻ em.

Tiêu chuẩn SX: TCCS. Số lô SX, NSX và HD: xem LOT, MANUF. và EXP. trên bao bì. Ngày hết hạn dùng là ngày cuối cùng của tháng hạn dùng (EXP.) trên bao bì.

SX bởi **SANOFI PASTEUR S.A.** tại Campus Mérieux, 1541 avenue Marcel Mérieux, 69280 Marcy l'Etoile – Pháp (địa điểm 1) / Parc Industriel d'Incarville, 27100 Val de Reuil – Pháp (địa điểm 2). Vắc-xin Hib đóng ống và đông khô tại Sanofi S.P.A. Loc. Valcanello, 03012 Anagni (FR) – Ý.

DNNK: Số ĐK:

Nhãn phụ trên hộp PENTAXIM 10 lọ, lọ 1 liều vắc-xin Hib đông khô + 10 bơm tiêm *có kim tiêm*, mỗi bơm tiêm nạp sẵn 1 liều (0,5 ml) vắc-xin DTacP-IPV dạng hỗn dịch.

Kích thước nhãn phụ 138 x 40 mm

℞ Thuốc bán theo đơn

PENTAXIM

VẮC-XIN HẤP PHỤ BẠCH HẦU, UỐN VÁN, HO GÀ (VÔ BÀO, THÀNH PHẦN), BẠI LIỆT (BẤT HOẠT) VÀ VẮC-XIN CỘNG HỢP *HAEMOPHILUS INFLUENZAE* TÝP b

Hộp 10 lọ, lọ 1 liều vắc-xin đông khô + 10 bơm tiêm có gắn sẵn kim tiêm, mỗi bơm tiêm nạp sẵn 1 liều (0,5ml) vắc-xin dạng hỗn dịch; hoàn nguyên thành hỗn dịch tiêm.

Các hoạt chất: sau khi hoàn nguyên mỗi liều (0,5 ml) chứa Giải độc tố bạch hầu: ≥ 30 IU; Giải độc tố uốn ván: ≥ 40 IU; kháng nguyên *Bordetella pertussis*: Giải độc tố 25 mcg, Ngưng kết tố hồng cầu dạng sợi (FHA) 25 mcg; Virus bại liệt týp 1 bất hoạt: 40 DU, Virus bại liệt týp 2 bất hoạt: 8 DU, Virus bại liệt týp 3 bất hoạt: 32 DU; Polysaccharide của *Haemophilus influenzae* týp b cộng hợp với protein uốn ván: 10 mcg.Tiêm bắp. Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và các thông tin khác: xem trong tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo. **Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Bảo quản ở nhiệt độ từ +2°C đến +8°C. Không để đông băng. Để xa tầm tay trẻ em.** Tiêu chuẩn SX: TCCS. Số lô SX, NSX và HD: xem LOT, MANUF. và EXP. trên bao bì. Ngày hết hạn dùng là ngày cuối cùng của tháng hạn dùng (EXP.) trên bao bì. SX bởi SANOFI PASTEUR S.A. tại Campus Mérieux, 1541 avenue Marcel Mérieux, 69280 Marcy l'Etoile – Pháp (địa điểm 1) / Parc Industriel d'Incarville, 27100 Val de Reuil – Pháp (địa điểm 2). Vắc-xin Hib đóng ống và đông khô tại Sanofi S.P.A. Loc. Valcanello, 03012 Anagni (FR) – Ý.

DNNK: Số ĐK:

SANOFI PASTEUR

10 Doses
Dosis

PENTAXIM

Después de reconstitución, una dosis (0,5 ml) contiene:

Toxoide diftérico[1]	≥ 30 UI
Toxoide tetánico[1]	≥ 40 UI
Antígenos de *Bordetella pertussis*:	
Toxoide pertúsico[1]	25 microgramos
Hemaglutinina filamentosa[1]	25 microgramos
Poliovirus (inactivado)	
- tipo 1 (cepa Mahoney)	40 UD [2][3][4]
- tipo 2 (cepa MEF-1)	8 UD [2][3][4]
- tipo 3 (cepa Saukett)	32 UD [2][3][4]
Polisacárido de *Haemophilus influenzae* tipo b	10 microgramos
conjugado con proteína tetánica	18-30 microgramos

[1] adsorbida en hidróxido de aluminio, hidratado ..... 0,3 mg Al^{3+}
[2] UD: unidad de antígeno D.
[3] o cantidad equivalente de antígeno, determinada según unmétodo inmunoquímico apropiado.
[4] producidos a partir de células VERO.

Lista de excipientes:
Sacarosa, trometamol, hidróxido de aluminio, medio de Hanks sin rojo de fenol (incluyendo la fenilalanina y la glucosa), ácido acético y/o hidróxido de sodio (para ajuste del pH), formaldehído, fenoxietanol y agua para inyectables.

Leer el prospecto antes de usar.
Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños.
Usar inmediatamente después de la reconstitución.
Conservar en el refrigerador. No congelar.

SANOFI PAST
2, avenue Pont
69007 Lyon - Fran

V
UE, TÉTANIQUE, COQUELUCHEUX (ACELLULAIRE,
OLIOMYÉLITIQUE (INACTIVÉ) ET CONJUGUÉ DE
PE b, ADSORBÉ / DIPHTHERIA, TETANUS, PERTUSSIS
ONENT), POLIOMYELITIS (INACTIVATED) VACCINE AND
E b CONJUGATE VACCINE, ADSORBED / VACUNA
TITÉTÁNICA, CONTRA LA TOS FERINA (ACELULAR,
, ANTIPOLIMIELÍTICA (INACTIVADA) Y CONJUGADA
PHILUS DE TIPO b, ADSORBIDA

r suspension injectable en seringue préremplie (0,5 ml) – Boîte de 10 — Voie intramusculaire
spension for injection in prefilled syringe (0.5 ml) – Box of 10 — Intramuscular route
spensión inyectable en jeringa precargada (0,5 ml) – Caja de 10 — Vía intramuscular

MANUF:
LOT:
EXP:

283 970280

℞ Thuốc bán theo đơn

PENTAXIM

VẮC-XIN HẤP PHỤ BẠCH HẦU, UỐN VÁN, HO GÀ (VÔ BÀO, THÀNH PHẦN), BẠI LIỆT (BẤT HOẠT) VÀ VẮC-XIN CỘNG HỢP *HAEMOPHILUS INFLUENZAE* TÝP b

Hộp 10 lọ, lọ 1 liều vắc-xin đông khô + 10 bơm tiêm có gắn sẵn kim tiêm, mỗi bơm tiêm nạp sẵn 1 liều (0,5ml) vắc-xin dạng hỗn dịch; hoàn nguyên thành hỗn dịch tiêm.

Các hoạt chất: sau khi hoàn nguyên mỗi liều (0,5 ml) chứa Giải độc tố bạch hầu: ≥ 30 IU; Giải độc tố uốn ván: ≥ 40 IU; kháng nguyên *Bordetella pertussis*: Giải độc tố 25 mcg, Ngưng kết tố hồng cầu dạng sợi (FHA) 25 mcg; Virus bại liệt týp 1 bất hoạt: 40 DU, Virus bại liệt týp 2 bất hoạt: 8 DU, Virus bại liệt týp 3 bất hoạt: 32 DU; Polysaccharide của *Haemophilus influenzae* týp b cộng hợp với protein uốn ván: 10 mcg.Tiêm bắp. Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và các thông tin khác: xem trong tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo. **Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Bảo quản ở nhiệt độ từ +2°C đến +8°C. Không để đông băng. Để xa tầm tay trẻ em.** Tiêu chuẩn SX: TCCS. Số lô SX, NSX và HD: xem LOT, MANUF. và EXP. trên bao bì. Ngày hết hạn dùng là ngày cuối cùng của tháng hạn dùng (EXP.) trên bao bì. SX bởi SANOFI PASTEUR S.A. tại Campus Mérieux, 1541 avenue Marcel Mérieux, 69280 Marcy l'Etoile – Pháp (địa điểm 1) / Parc Industriel d'Incarville, 27100 Val de Reuil – Pháp (địa điểm 2). Vắc-xin Hib đóng ống và đông khô tại Sanofi S.P.A. Loc. Valcanello, 03012 Anagni (FR) – Ý.

DNNK: Số ĐK:

CÔNG TY SANOFI PASTEUR
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PENTAXIM

VACCIN DIPHTÉRIQUE, CONJUGUÉ DE L'HAEM POLIOMYELITIS (INACT ANTIDIFTÉRICA, ANTI (INACTIVADA) Y CONJU

Poudre en flacon et suspension po
Powder in vial and suspension for
Polvo en frasco y suspensión para

EUR SA
Pasteur
ce/Francia

V2	09/07/2014 - FJ
Code article : 970280	Sanofi Pasteur F/A/E
09702806	Repères d'arêtes n° : 1 - 31
Dim. : 222 x 141 x 42 mm	
3 REF. PANTONE : Reflex Blue (Textes + RA + Logo) 285 C (Dégradé) 252 C (Demi-soleil)	Tracé

ENTAXIM

CIN DIPHTÉRIQUE, TÉTANIQUE, COQUELUCHEUX (ACELLULAIRE, MULTICOMPOSÉ), POLIOMYÉLITIQUE (INACTIVÉ) ET NJUGUÉ DE L'HAEMOPHILUS TYPE b, ADSORBÉ / DIPHTHERIA, TETANUS, PERTUSSIS (ACELLULAR, COMPONENT), IOMYELITIS (INACTIVATED) VACCINE AND HAEMOPHILUS TYPE b CONJUGATE VACCINE, ADSORBED / VACUNA TIDIFTÉRICA, ANTITETÁNICA, CONTRA LA TOS FERINA (ACELULAR, MULTICOMPUESTA), ANTIPOLIMIELÍTICA ACTIVADA) Y CONJUGADA CONTRA EL HAEMOPHILUS DE TIPO b, ADSORBIDA

10 Doses Dosis

e en flacon et suspension pour suspension injectable en seringue préremplie (0,5 ml) – Boîte de 10
er in vial and suspension for suspension for injection in prefilled syringe (0.5 ml) – Box of 10
en frasco y suspensión para suspensión inyectable en jeringa precargada (0,5 ml) – Caja de 10

Voie intramusculaire
Intramuscular route
Vía intramuscular

SANOFI PASTE

PENTAXIM

After reconstitution, one dose (0.5 ml) contains:

Diphtheria toxoid[1]	≥ 30 IU
Tetanus toxoid[1]	≥ 40 IU
Bordetella pertussis antigens:	
Pertussis toxoid[1]	25 micrograms
Filamentous haemagglutinin[1]	25 micrograms
Poliomyelitis virus (inactivated)	
- type 1 (Mahoney strain)	40 DU [2][3][4]
- type 2 (MEF-1 strain)	8 DU [2][3][4]
- type 3 (Saukett strain)	32 DU [2][3][4]
Polysaccharide of *Haemophilus influenzae* type b conjugated to the tetanus protein	10 micrograms 18-30 micrograms

[1] adsorbed on aluminium hydroxide, hydrated ..... 0.3 mg Al^{3+}

[2] DU: D antigen unit.

[3] or equivalent antigenic quantity determined by a suitable immunochemical method.

[4] produced on VERO cells.

List of excipients:

Saccharose, tromethamol, aluminium hydroxide, Hanks medium without phenol red (including phenylalanine and glucose), acetic acid and/or sodium hydroxide (for pH adjustment), formaldehyde, phenoxyethanol and water for injections.

Read the leaflet before use.

Keep out of the reach and sight of children.

Use immediately after reconstitution.

Store in a refrigerator. Do not freeze.

UR

SANOFI PASTEUR

10 Doses
Dosis

MANUF:

LOT:

EXP:

r suspension injectable en seringue prérempliе (0,5 ml) – Boîte de 10 — Voie intramusculaire
uspension for injection in prefilled syringe (0.5 ml) – Box of 10 — Intramuscular route
uspensión inyectable en jeringa precargada (0,5 ml) – Caja de 10 — Vía intramuscular

PHILUS DE TIPO b, ADSORBIDA
, ANTIPOLIMIELÍTICA (INACTIVADA) Y CONJUGADA
NTITÉTÁNICA, CONTRA LA TOS FERINA (ACELULAR,
E b CONJUGATE VACCINE, ADSORBED / VACUNA
ONENT), POLIOMYELITIS (INACTIVATED) VACCINE AND
PE b, ADSORBÉ / DIPHTHERIA,TETANUS, PERTUSSIS
OLIOMYÉLITIQUE (INACTIVÉ) ET CONJUGUÉ DE
UE,TÉTANIQUE, COQUELUCHEUX (ACELLULAIRE,

PENTAXIM

Después de reconstitución, una dosis (0,5 ml) contiene:

Toxoide diftérico[1]	≥ 30 UI
Toxoide tetánico[1]	≥ 40 UI
Antígenos de *Bordetella pertussis*:	
Toxoide pertúsico[1]	25 microgramos
Hemaglutinina filamentosa[1]	25 microgramos
Poliovirus (inactivado)	
- tipo 1 (cepa Mahoney)	40 UD [2][3][4]
- tipo 2 (cepa MEF-1)	8 UD [2][3][4]
- tipo 3 (cepa Saukett)	32 UD [2][3][4]
Polisacárido de *Haemophilus influenzae* tipo b conjugado con proteína tetánica	10 microgramos 18-30 microgramos

[1] adsorbida en hidróxido de aluminio, hidratado ..... 0,3 mg Al^{3+}
[2] UD: unidad de antígeno D.
[3] o cantidad equivalente de antígeno, determinada según unmétodo inmunoquímico apropiado.
[4] producidos a partir de células VERO.

Lista de excipientes:
Sacarosa, trometamol, hidróxido de aluminio, medio de Hanks sin rojo de fenol (incluyendo la fenilalanina y la glucosa), ácido acético y/o hidróxido de sodio (para ajuste del pH), formaldehído, fenoxietanol y agua para inyectables.

Leer el prospecto antes de usar.
Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños.
Usar inmediatamente después de la reconstitución.
Conservar en el refrigerador. No congelar.

SANOFI PASTE
2, avenue Pont F
69007 Lyon - Franc

283 970280

PENTAXIM

Après reconstitution une dose (0,5 ml) contient :

Anatoxine diphtérique[1]	≥ 30 UI
Anatoxine tétanique[1]	≥ 40 UI
Antigènes de *Bordetella pertussis* :	
Anatoxine pertussique[1]	25 microgrammes
Hémagglutinine filamenteuse	25 microgrammes
Virus poliomyélitique (inactivé)	
- type 1 (Mahoney)	40 UD [2][3][4]
- type 2 (MEF-1)	8 UD [2][3][4]
- type 3 (Saukett)	32 UD [2][3][4]
Polyoside d'*Haemophilus influenzae* type b conjugué à la protéine tétanique	10 microgrammes 18-30 microgrammes

[1] adsorbée sur hydroxyde d'aluminium, hydraté ..... 0,3 mg Al^{3+}

[2] UD : unité d'antigène D.

[3] ou quantité d'antigène équivalente déterminée selon une méthode immunochimique appropriée.

[4] produits sur cellules VERO.

Liste des excipients :
Saccharose, trométamol, hydroxyde d'aluminium, milieu de Hanks sans rouge de phénol (incluant la phénylalanine et le glucose), acide acétique et/ou hydroxyde de sodium (pour ajustement du pH), formaldéhyde, phénoxyéthanol et eau pour préparations injectables.

Lire la notice avant utilisation.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Utiliser immédiatement après reconstitution.

A conserver au réfrigérateur. Ne pas congeler.

PEN

VACCI

CONJU

POLIO

ANTID

(INAC

Poudre e

Powder i

Polvo en

UR SA
teur
Francia

V2	09/07/2014 - FJ
Code article : 970280	Sanofi Pasteur F/A/E
09702806	Repères d'arêtes n° : 1 - 31
Dim. : 222 x 141 x 42 mm	
3 REF. PANTONE : Reflex Blue (Textes + RA + Logo) 285 C (Dégradé) 252 C (Demi-soleil)	Tracé

SANOFI PASTEUR S.A. CÔNG TY VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NTAXIM

N DIPHTÉRIQUE, TÉTANIQUE, COQUELUCHEUX (ACELLULAIRE, MULTICOMPOSÉ), POLIOMYÉLITIQUE (INACTIVÉ) ET JGUÉ DE L'HAEMOPHILUS TYPE b, ADSORBÉ / DIPHTHERIA, TETANUS, PERTUSSIS (ACELLULAR, COMPONENT), MYELITIS (INACTIVATED) VACCINE AND HAEMOPHILUS TYPE b CONJUGATE VACCINE, ADSORBED / VACUNA IFTÉRICA, ANTITETÁNICA, CONTRA LA TOS FERINA (ACELULAR, MULTICOMPUESTA), ANTIPOLIMIELÍTICA TIVADA) Y CONJUGADA CONTRA EL HAEMOPHILUS DE TIPO b, ADSORBIDA

10 Doses Dosis

flacon et suspension pour suspension injectable en seringue préremplie (0,5 ml) – Boîte de 10
vial and suspension for suspension for injection in prefilled syringe (0.5 ml) – Box of 10
frasco y suspensión para suspensión inyectable en jeringa precargada (0,5 ml) – Caja de 10

Voie intramusculaire
Intramuscular route
Vía intramuscular

SANOFI PA

PENTAXIM

After reconstitution, one dose (0.5 ml) contains:

Diphtheria toxoid[1]	≥ 30 IU
Tetanus toxoid[1]	≥ 40 IU
Bordetella pertussis antigens:	
Pertussis toxoid[1]	25 micrograms
Filamentous haemagglutinin[1]	25 micrograms
Poliomyelitis virus (inactivated)	
- type 1 (Mahoney strain)	40 DU [2][3][4]
- type 2 (MEF-1 strain)	8 DU [2][3][4]
- type 3 (Saukett strain)	32 DU [2][3][4]
Polysaccharide of *Haemophilus influenzae* type b	10 micrograms
conjugated to the tetanus protein	18-30 micrograms

[1] adsorbed on aluminium hydroxide, hydrated ..... 0.3 mg Al^{3+}

[2] DU: D antigen unit.

[3] or equivalent antigenic quantity determined by a suitable immunochemical method.

[4] produced on VERO cells.

List of excipients:

Saccharose, tromethamol, aluminium hydroxide, Hanks medium without phenol red (including phenylalanine and glucose), acetic acid and/or sodium hydroxide (for pH adjustment), formaldehyde, phenoxyethanol and water for injections.

Read the leaflet before use.

Keep out of the reach and sight of children.

Use immediately after reconstitution.

Store in a refrigerator. Do not freeze.

TEUR

Nội dung nhãn phụ PENTAXIM hộp 10 lọ, lọ 1 liều vắc-xin Hib đông khô + 10 bơm tiêm *không gắn kim tiêm* mỗi bơm tiêm nạp sẵn 1 liều (0,5 ml) vắc-xin DTacP-IPV dạng hỗn dịch, có kèm theo 20 kim tiêm.

℞ Thuốc bán theo đơn

PENTAXIM

VẮC-XIN HẤP PHỤ BẠCH HẦU, UỐN VÁN, HO GÀ (VÔ BÀO, THÀNH PHẦN), BẠI LIỆT (BẤT HOẠT) VÀ VẮC-XIN CỘNG HỢP *HAEMOPHILUS INFLUENZAE* TÝP b

Hộp 10 lọ, lọ 1 liều vắc-xin đông khô + 10 bơm tiêm không gắn kim tiêm kèm theo 20 kim tiêm, mỗi bơm tiêm nạp sẵn 1 liều (0,5ml) vắc-xin dạng hỗn dịch; hoàn nguyên thành hỗn dịch tiêm.

Các hoạt chất: sau khi hoàn nguyên mỗi liều (0,5 ml) chứa Giải độc tố bạch hầu: ≥ 30 IU; Giải độc tố uốn ván: ≥ 40 IU; kháng nguyên *Bordetella pertussis*: Giải độc tố 25 mcg, Ngưng kết tố hồng cầu dạng sợi (FHA) 25 mcg; Virus bại liệt týp 1 bất hoạt: 40 DU, Virus bại liệt týp 2 bất hoạt: 8 DU, Virus bại liệt týp 3 bất hoạt: 32 DU; Polysaccharide của *Haemophilus influenzae* týp b cộng hợp với protein uốn ván: 10 mcg.

Tiêm bắp. Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và các thông tin khác: xem trong tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Bảo quản ở nhiệt độ từ +2°C đến +8°C. Không để đông băng. Để xa tầm tay trẻ em.

Tiêu chuẩn SX: TCCS. Số lô SX, NSX và HD: xem LOT, MANUF. và EXP. trên bao bì. Ngày hết hạn dùng là ngày cuối cùng của tháng hạn dùng (EXP.) trên bao bì.

SX bởi **SANOFI PASTEUR S.A.** tại Campus Mérieux, 1541 avenue Marcel Mérieux, 69280 Marcy l'Etoile – Pháp (địa điểm 1) / Parc Industriel d'Incarville, 27100 Val de Reuil – Pháp (địa điểm 2). Vắc-xin Hib đóng ống và đông khô tại Sanofi S.P.A. Loc. Valcanello, 03012 Anagni (FR) – Ý.

DNNK: Số ĐK:

Nhãn phụ trên hộp PENTAXIM hộp 10 lọ, lọ 1 liều vắc-xin Hib đông khô + 10 bơm tiêm *không gắn kim tiêm* mỗi bơm tiêm nạp sẵn 1 liều (0,5 ml) vắc-xin DTacP-IPV dạng hỗn dịch, có kèm theo 20 kim tiêm.

Kích thước nhãn phụ 138 x 40 mm

℞ Thuốc bán theo đơn

PENTAXIM

VẮC-XIN HẤP PHỤ BẠCH HẦU, UỐN VÁN, HO GÀ (VÔ BÀO, THÀNH PHẦN), BẠI LIỆT (BẤT HOẠT) VÀ VẮC-XIN CỘNG HỢP *HAEMOPHILUS INFLUENZAE* TÝP b

Hộp 10 lọ, lọ 1 liều vắc-xin đông khô + 10 bơm tiêm không gắn kim tiêm kèm theo 20 kim tiêm, mỗi bơm tiêm nạp sẵn 1 liều (0,5 ml) vắc-xin dạng hỗn dịch; hoàn nguyên thành hỗn dịch tiêm.

Các hoạt chất: sau khi hoàn nguyên mỗi liều (0,5 ml) chứa Giải độc tố bạch hầu: ≥ 30 IU; Giải độc tố uốn ván: ≥ 40 IU; kháng nguyên *Bordetella pertussis*: Giải độc tố 25 mcg, Ngưng kết tố hồng cầu dạng sợi (FHA) 25 mcg; Virus bại liệt týp 1 bất hoạt: 40 DU, Virus bại liệt týp 2 bất hoạt: 8 DU, Virus bại liệt týp 3 bất hoạt: 32 DU; Polysaccharide của *Haemophilus influenzae* týp b cộng hợp với protein uốn ván: 10 mcg. Tiêm bắp. Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và các thông tin khác: xem trong tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo. **Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Bảo quản ở nhiệt độ từ +2°C đến +8°C. Không để đông băng. Để xa tầm tay trẻ em.** Tiêu chuẩn SX: TCCS. Số lô SX, NSX và HD: xem LOT, MANUF. và EXP. trên bao bì. Ngày hết hạn dùng là ngày cuối cùng của tháng hạn dùng (EXP.) trên bao bì. SX bởi **SANOFI PASTEUR S.A.** tại Campus Mérieux, 1541 avenue Marcel Mérieux, 69280 Marcy l'Etoile – Pháp (địa điểm 1) / Parc Industriel d'Incarville, 27100 Val de Reuil – Pháp (địa điểm 2). Vắc-xin Hib đóng ống và đông khô tại Sanofi S.P.A. Loc. Valcanello, 03012 Anagni (FR) – Ý.

DNNK: Số ĐK:

SANOFI PASTEUR

10 doses

PENTAXIM

Después de reconstitución, una dosis (0,5 ml) contiene:

Toxoide diftérico[1]	≥ 30 UI
Toxoide tetánico[1]	≥ 40 UI
Antígenos de *Bordetella pertussis*:	
Toxoide pertúsico[1]	25 microgramos
Hemaglutinina filamentosa[1]	25 microgramos
Poliovirus (inactivado)	
- tipo 1 (cepa Mahoney)	40 UD [2][3][4]
- tipo 2 (cepa MEF-1)	8 UD [2][3][4]
- tipo 3 (cepa Saukett)	32 UD [2][3][4]
Polisacárido de *Haemophilus influenzae* tipo b conjugado con proteína tetánica	10 microgramos 18-30 microgramos

[1] adsorbida en hidróxido de aluminio, hidratado ..... 0,3 mg Al^{3+}

[2] UD: unidad de antígeno D.

[3] o cantidad equivalente de antígeno, determinada según un método inmunoquímico apropiado.

[4] producidos a partir de células VERO.

Lista de excipientes:

Sacarosa, trometamol, hidróxido de aluminio, medio de Hanks sin rojo de fenol (incluyendo la fenilalanina y la glucosa), ácido acético y/o hidróxido de sodio (para ajuste del pH), formaldehído, fenoxietanol y agua para inyectables.

Leer el prospecto antes de usar.

Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños.

Usar inmediatamente después de la reconstitución.

Conservar en el refrigerador. No congelar.

SANOFI PAST
2, avenue Pont
69007 Lyon - Fran

UE, TÉTANIQUE, COQUELUCHEUX (ACELLULAIRE,
OLIOMYÉLITIQUE (INACTIVÉ) ET CONJUGUÉ DE
PE b, ADSORBÉ / DIPHTHERIA, TETANUS, PERTUSSIS
ONENT), POLIOMYELITIS (INACTIVATED) VACCINE AND
E b CONJUGATE VACCINE, ADSORBED / VACUNA
TITÉTÁNICA, CONTRA LA TOS FERINA (ACELULAR,
, ANTIPOLIMIELÍTICA (INACTIVADA) Y CONJUGADA
PHILUS DE TIPO b, ADSORBIDA

r suspension injectable en seringue préremplie (0,5 ml) — Voie intramusculaire
de 10 — Intramuscular route
spension for injection in prefilled syringe (0.5 ml) — Via intramuscular
: 10
spensión inyectable en jeringa precargada (0,5 ml)
10

MANUF:

LOT:

EXP:

283 970270

CÔNG TY SANOFI PASTEUR S
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

℞ Thuốc bán theo đơn

PENTAXIM

VẮC-XIN HẤP PHỤ BẠCH HẦU, UỐN VÁN, HO GÀ (VÔ BÀO, THÀNH PHẦN), BẠI LIỆT (BẤT HOẠT) VÀ VẮC-XIN CỘNG HỢP *HAEMOPHILUS INFLUENZAE* TÝP b

Hộp 10 lọ, lọ 1 liều vắc-xin đông khô + 10 bơm tiêm không gắn kim tiêm kèm theo 20 kim tiêm, mỗi bơm tiêm nạp sẵn 1 liều (0,5 ml) vắc-xin dạng hỗn dịch; hoàn nguyên thành hỗn dịch tiêm.

Các hoạt chất: sau khi hoàn nguyên mỗi liều (0,5 ml) chứa Giải độc tố bạch hầu: ≥ 30 IU; Giải độc tố uốn ván: ≥ 40 IU; kháng nguyên *Bordetella pertussis*: Giải độc tố 25 mcg, Ngưng kết tố hồng cầu dạng sợi (FHA) 25 mcg; Virus bại liệt týp 1 bất hoạt: 40 DU, Virus bại liệt týp 2 bất hoạt: 8 DU, Virus bại liệt týp 3 bất hoạt: 32 DU; Polysaccharide của *Haemophilus influenzae* týp b cộng hợp với protein uốn ván: 10 mcg. Tiêm bắp. Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và các thông tin khác: xem trong tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo. **Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Bảo quản ở nhiệt độ từ +2°C đến +8°C. Không để đông băng. Để xa tầm tay trẻ em.** Tiêu chuẩn SX: TCCS. Số lô SX, NSX và HD: xem LOT, MANUF. và EXP. trên bao bì. Ngày hết hạn dùng là ngày cuối cùng của tháng hạn dùng (EXP.) trên bao bì. SX bởi **SANOFI PASTEUR S.A.** tại Campus Mérieux, 1541 avenue Marcel Mérieux, 69280 Marcy l'Etoile – Pháp (địa điểm 1) / Parc Industriel d'Incarville, 27100 Val de Reuil – Pháp (địa điểm 2). Vắc-xin Hib đóng ống và đông khô tại Sanofi S.P.A. Loc. Valcanello, 03012 Anagni (FR) – Ý.

DNNK: Số ĐK:

PENTAXIM

VACCIN DIPHTÉRIQUE,TE
CONJUGUÉ DE L'HAEMOP
POLIOMYELITIS (INACTIV
ANTIDIFTÉRICA, ANTITE
(INACTIVADA) Y CONJUG

Poudre en flacon et suspension pour s
Powder in vial and suspension for susp
Polvo en frasco y suspensión para susp

VACCIN DIPHTÉRIQ
MULTICOMPOSÉ), P
L'HAEMOPHILUS TY
(ACELLULAR, COMP
HAEMOPHILUS TYP
ANTIDIFTÉRICA, AN
MULTICOMPUESTA)
CONTRA EL HAEMO

Poudre en flacon et suspension pou
avec deux aiguilles séparées – Boîte
Powder in vial and suspension for su
with two separate needles – Box o
Polvo en frasco y suspensión para su
con dos agujas separadas – Caja de

UR SA
asteur
e/Francia

V2	09/07/2014 - FJ
Code article : **970270**	Sanofi Pasteur **XF/A/E**
09702707	Repères d'arêtes n° : **2 - 3**
Dim. : 222 x 141 x 42	
3 REF. PANTONE : **Reflex Blue C (Texte + Logo)** **285 C (Dégradé)** **252 C (Demi soleil)**	Tracé

NTAXIM

N DIPHTÉRIQUE, TÉTANIQUE, COQUELUCHEUX (ACELLULAIRE, MULTICOMPOSÉ), POLIOMYÉLITIQUE (INACTIVÉ) ET GUÉ DE L'HAEMOPHILUS TYPE b, ADSORBÉ / DIPHTHERIA, TETANUS, PERTUSSIS (ACELLULAR, COMPONENT), MYELITIS (INACTIVATED) VACCINE AND HAEMOPHILUS TYPE b CONJUGATE VACCINE, ADSORBED / VACUNA IFTÉRICA, ANTITETÁNICA, CONTRA LA TOS FERINA (ACELULAR, MULTICOMPUESTA), ANTIPOLIMIELÍTICA TIVADA) Y CONJUGADA CONTRA EL HAEMOPHILUS DE TIPO b, ADSORBIDA

10 dose: dosis

flacon et suspension pour suspension injectable en seringue préremplie (0,5 ml) avec deux aiguilles séparées – Boîte de 10 — Voie intramusculaire
vial and suspension for suspension for injection in prefilled syringe (0.5 ml) with two separate needles – Box of 10 — Intramuscular route
rasco y suspensión para suspensión inyectable en jeringa precargada (0,5 ml) con dos agujas separadas – Caja de 10 — Vía intramuscular

SANOFI PAST

PENTAXIM

After reconstitution, one dose (0.5 ml) contains:

Diphtheria toxoid[1]	≥ 30 IU
Tetanus toxoid[1]	≥ 40 IU
Bordetella pertussis antigens:	
Pertussis toxoid[1]	25 micrograms
Filamentous haemagglutinin[1]	25 micrograms
Poliomyelitis virus (inactivated)	
- type 1 (Mahoney strain)	40 DU [2][3][4]
- type 2 (MEF-1 strain)	8 DU [2][3][4]
- type 3 (Saukett strain)	32 DU [2][3][4]
Polysaccharide of *Haemophilus influenzae* type b	10 micrograms
conjugated to the tetanus protein	18-30 micrograms

[1] adsorbed on aluminium hydroxide, hydrated ..... 0.3 mg Al^{3+}

[2] DU: D antigen unit.

[3] or equivalent antigenic quantity determined by a suitable immunochemical method.

[4] produced on VERO cells.

List of excipients:

Saccharose, tromethamol, aluminium hydroxide, Hanks medium without phenol red (including phenylalanine and glucose), acetic acid and/or sodium hydroxide (for pH adjustment), formaldehyde, phenoxyethanol and water for injections.

Read the leaflet before use.

Keep out of the reach and sight of children.

Use immediately after reconstitution.

Store in a refrigerator. Do not freeze.

EUR

SANOFI PASTEUR

10 doses
10 dosis

PENTAXIM

Después de reconstitución, una dosis (0,5 ml) contiene:

Toxoide diftérico[1]	≥ 30 UI
Toxoide tetánico[1]	≥ 40 UI
Antígenos de *Bordetella pertussis*:	
Toxoide pertúsico[1]	25 microgramos
Hemaglutinina filamentosa[1]	25 microgramos
Poliovirus (inactivado)	
- tipo 1 (cepa Mahoney)	40 UD [2][3][4]
- tipo 2 (cepa MEF-1)	8 UD [2][3][4]
- tipo 3 (cepa Saukett)	32 UD [2][3][4]
Polisacárido de *Haemophilus influenzae* tipo b conjugado con proteína tetánica	10 microgramos 18-30 microgramos

[1] adsorbida en hidróxido de aluminio, hidratado ..... 0,3 mg Al^{3+}

[2] UD: unidad de antígeno D.

[3] o cantidad equivalente de antígeno, determinada según un método inmunoquímico apropiado.

[4] producidos a partir de células VERO.

Lista de excipientes:

Sacarosa, trometamol, hidróxido de aluminio, medio de Hanks sin rojo de fenol (incluyendo la fenilalanina y la glucosa), ácido acético y/o hidróxido de sodio (para ajuste del pH), formaldehído, fenoxietanol y agua para inyectables.

Leer el prospecto antes de usar.

Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños.

Usar inmediatamente después de la reconstitución.

Conservar en el refrigerador. No congelar.

SANOFI PAST
2, avenue Pont
69007 Lyon - Fran

. suspension injectable en seringue prérempli (0,5 ml) — Voie intramusculaire
de 10 — Intramuscular route
. spension for injection in prefilled syringe (0.5 ml) — Vía intramuscular
10
spensión inyectable en jeringa precargada (0,5 ml)
10

MANUF:

LOT:

EXP:

UE, TÉTANIQUE, COQUELUCHEUX (ACELLULAIRE,
OLIOMYÉLITIQUE (INACTIVÉ) ET CONJUGUÉ DE
PE b, ADSORBÉ / DIPHTHERIA, TETANUS, PERTUSSIS
ONENT), POLIOMYELITIS (INACTIVATED) VACCINE AND
E b CONJUGATE VACCINE, ADSORBED / VACUNA
ITTETÁNICA, CONTRA LA TOS FERINA (ACELULAR,
, ANTIPOLIMIELÍTICA (INACTIVADA) Y CONJUGADA
PHILUS DE TIPO b, ADSORBIDA

283 970270

PENTAXIM

Après reconstitution une dose (0,5 ml) contient :

Anatoxine diphtérique[1]	≥ 30 UI
Anatoxine tétanique[1]	≥ 40 UI
Antigènes de *Bordetella pertussis* :	
Anatoxine pertussique[1]	25 microgrammes
Hémagglutinine filamenteuse	25 microgrammes
Virus poliomyélitique (inactivé)	
- type 1 (Mahoney)	40 UD [2][3][4]
- type 2 (MEF-1)	8 UD [2][3][4]
- type 3 (Saukett)	32 UD [2][3][4]
Polyoside d'*Haemophilus influenzae* type b conjugué à la protéine tétanique	10 microgrammes 18-30 microgrammes

[1] adsorbée sur hydroxyde d'aluminium, hydraté ..... 0,3 mg Al^{3+}

[2] UD : unité d'antigène D.

[3] ou quantité d'antigène équivalente déterminée selon une méthode immunochimique appropriée.

[4] produits sur cellules VERO.

Liste des excipients :

Saccharose, trométamol, hydroxyde d'aluminium, milieu de Hanks sans rouge de phénol (incluant la phénylalanine et le glucose), acide acétique et/ou hydroxyde de sodium (pour ajustement du pH), formaldéhyde, phénoxyéthanol et eau pour préparations injectables.

Lire la notice avant utilisation.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Utiliser immédiatement après reconstitution.

A conserver au réfrigérateur. Ne pas congeler.

UR SA
steur
/Francia

PEN
VACCI
CONJU
POLIO
ANTID
(INACT

Poudre en
Powder in
Polvo en f

VACCIN DIPHTÉRIQ
MULTICOMPOSÉ), F
L'HAEMOPHILUS TY
(ACELLULAR, COM
HAEMOPHILUS TYP
ANTIDIFTÉRICA, A
MULTICOMPUESTA
CONTRA EL HAEMO

Poudre en flacon et suspension po
avec deux aiguilles séparées – Boî
Powder in vial and suspension for
with two separate needles – Box
Polvo en frasco y suspensión para
con dos agujas separadas – Caja d

V2	09/07/2014 - FJ
Code article : 970270	Sanofi Pasteur XF/A/E
09702707	Repères d'arêtes n° : 2 - 3
Dim. : 222 x 141 x 42	
3 REF. PANTONE : Reflex Blue C (Texte + Logo) 285 C (Dégradé) 252 C (Demi soleil)	Tracé

CÔNG TY SANOFI PASTEUR S.A.
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TAXIM

DIPHTÉRIQUE, TÉTANIQUE, COQUELUCHEUX (ACELLULAIRE, MULTICOMPOSÉ), POLIOMYÉLITIQUE (INACTIVÉ) ET UÉ DE L'HAEMOPHILUS TYPE b, ADSORBÉ / DIPHTHERIA, TETANUS, PERTUSSIS (ACELLULAR, COMPONENT), YELITIS (INACTIVATED) VACCINE AND HAEMOPHILUS TYPE b CONJUGATE VACCINE, ADSORBED / VACUNA TÉRICA, ANTITETÁNICA, CONTRA LA TOS FERINA (ACELULAR, MULTICOMPUESTA), ANTIPOLIMIELÍTICA VADA) Y CONJUGADA CONTRA EL HAEMOPHILUS DE TIPO b, ADSORBIDA

10 doses dosis

con et suspension pour suspension injectable en seringue préremplie (0,5 ml) avec deux aiguilles séparées – Boîte de 10 — Voie intramusculaire
l and suspension for suspension for injection in prefilled syringe (0.5 ml) with two separate needles – Box of 10 — Intramuscular route
co y suspensión para suspensión inyectable en jeringa precargada (0,5 ml) con dos agujas separadas – Caja de 10 — Vía intramuscular

SANOFI PASTE

PENTAXIM

After reconstitution, one dose (0.5 ml) contains:

Diphtheria toxoid[1] ..... ≥ 30 IU
Tetanus toxoid[1] ..... ≥ 40 IU
Bordetella pertussis antigens:
Pertussis toxoid[1] ..... 25 micrograms
Filamentous haemagglutinin[1] ..... 25 micrograms
Poliomyelitis virus (inactivated)
- type 1 (Mahoney strain) ..... 40 DU [2][3][4]
- type 2 (MEF-1 strain) ..... 8 DU [2][3][4]
- type 3 (Saukett strain) ..... 32 DU [2][3][4]

Polysaccharide of *Haemophilus influenzae* type b ..... 10 micrograms
conjugated to the tetanus protein ..... 18-30 micrograms

[1] adsorbed on aluminium hydroxide, hydrated ..... 0.3 mg Al^{3+}
[2] DU: D antigen unit.
[3] or equivalent antigenic quantity determined by a suitable immunochemical method.
[4] produced on VERO cells.

List of excipients:
Saccharose, tromethamol, aluminium hydroxide, Hanks medium without phenol red (including phenylalanine and glucose), acetic acid and/or sodium hydroxide (for pH adjustment), formaldehyde, phenoxyethanol and water for injections.

Read the leaflet before use.
Keep out of the reach and sight of children.
Use immediately after reconstitution.
Store in a refrigerator. Do not freeze.





VI	29/01/2013 - JMI
Code article **967000**	Sanofi Pasteur **F/A/E**
SPECIFICITE(S) MLE	SPECIFICITE(S) VDR * Laque laser VDR
Dim. int. : 19 x 38 mm	
■ seringue ☐ flacon ☐ ampoule	
3 Ref. Pantone C : **Black C (Textes)** **178 (Bandeau sup.)** **285 (Bandeau inf.)** **Tracé** * Laque laser VDR	



094 966950

DIPHTHERIA, TETANUS, PERTUSSIS (ACELLULAR, COMPONENT), POLIOMYELITIS (INACTIVATED) VACCINE (ADSORBED) pour/for/para PENTAXIM

0,5 ml - 1 dose/dosis
Voie IM/Intramuscular use/Vía IM
Sanofi Pasteur

Manuf. :

Lot:

Exp.:

Lot:

Exp.:

Vaccin/Vaccine/Vacuna DTacP-IPV pour/for/para PENTAXIM
Sanofi Pasteur

CÔNG TY SANOFI PASTEUR S.A.
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

VI **28/01/2013 - JMI**

Code article	Sanofi Pasteur
966950	**F/A/E**


SPECIFICITE(S) MLE	SPECIFICITE(S) VDR
	* Laque laser VDR

Dim. int. : 23 x 46 mm

■ seringue ☐ flacon ☐ ampoule

4 Ref. Pantone C : **Black C (Textes)**
Blanc (Aplat)
178 (Band. Sup.)
285 (Band. Inf.)
Tracé
* Laque laser VDR

+ Laque Laser



GAB SPE 23x46 SER simple détachable LPM
version 5 du 06/11/2009

095 970220

Manuf.:

Lot :

Exp :

VACCIN CONJUGUÉ
CONJUGATE VACCINE
VACUNA CONJUGADA
HAEMOPHILUS TYPE/TIPO b

Poudre pour reconstitution de/
Powder for reconstitution of/Polvo para reconstitución de PENTAXIM
1 dose/dosis
Voie IM/Intramuscular route/via IM
Voir notice/see leaflet/veáse prospecto

Sanofi Pasteur

GAB SPE 22x44 FL
version 1 du 16/12/2008

1100 + 1300 - SSA

VI 17/06/2014 - CT


Code article :
970220

Sanofi Pasteur
F/A/E

Etiquette : ☐ seringue ■ flacon ☐ ampoule

Dimension : 22 x 44 mm

SPECIFICITE(S) MLE
Orientation



SPECIFICITE(S) VDR
Orientation
* Laque laser VDR



3 REF. PANTONE :
Black C (Textes)
1365 (Bandeau sup.)
183 (Bandeau inf.)
+ Laque laser

SANOFI PASTEUR S.A. VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

TUQ CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Thu Thủy

