
Đợt 34
(HSBS1)
5 năm

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
Lần đầu: 24/10/2017

V4	06/02/2017 - CT/SP
Code article	Sanofi Pasteur
977820	XFAE
Etui - Format : 31,5 x 22,5 x 128,5 mm	
3 Réf. Pantone Coated : Reflex blue 1375 232	
☐ Présence de tramé	
Tracé Vernis avec réserve	



V4	06/02/2017 - CT/SP
Code article	Sanofi Pasteur
977820	XFAE
Etui - Format : 31,5 x 22,5 x 128,5 mm	
3 Réf. Pantone Coated : Reflex blue 1375 232	
☐ Présence de tramé	
Tracé Vernis avec réserve	

SANOFI PASTEUR S.A. CÔNG TY VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

0977820

AVAXIM 80 U
Pédiatrique/Pediatric
1 dose

EXPIRAD. LOT MANUF.

Virus de la hepatitis A, cepa GBM* (inactivado) ** .....80 U***
Para una dosis de 0,5 ml

* Cultivada en células diploides humanas MRC-5
** Adsorbido en hidróxido de aluminio, hidratado (0,15 miligramos de Al)
*** A falta de una referencia internacional normalizada, el contenido antigénico se expresa con la ayuda de una referencia interna

2-fenoxietanol, formaldehído, medio 199 Hanks sin rojo de fenol (combinación compleja de aminoácidos (incluida la fenilalanina), sales minerales, vitaminas, y otros compuestos) suplementado con polisorbato 80, diluido con agua para inyectables y con un pH ajustado con ácido clorhídrico o hidróxido de sodio.

• Agitar antes de inyectar • Leer el prospecto antes de utilizar este medicamento • Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños • Conservar en el refrigerador (entre 2 °C y 8 °C) • Conservar la jeringa en el embalaje exterior al abrigo de la luz • No congelar • Prevención contra la infección provocada por el virus de la hepatitis A en niños de 12 meses a 15 años de edad • El producto no utilizado o desechado se debe eliminar conforme a la normativa vigente.

SANOFI PASTEUR SA - 2, avenue Pont Pasteur, 69007 Lyon, France/Francia

AVAXIM 80 U
Pédiatrico
1 dosis

0977820

Virus de l'hépatite A, souche GBM* (inactivé) ** .....80 U***
Pour une dose de 0,5 ml

* Cultivée sur cellules diploïdes humaines MRC-5
** Adsorbé sur hydroxyde d'aluminium, hydraté (0,15 milligrammes d'Al)
*** En l'absence de référence internationale standardisée le contenu antigénique est exprimé à l'aide d'une référence interne

2-Phénoxyéthanol, formaldéhyde, milieu 199 Hanks sans rouge phénol (mélange complexe d'acides aminés (incluant la phénylalanine), de sels minéraux, de vitamines et d'autres composants) supplémenté avec du polysorbate 80, dilué dans de l'eau pour préparations injectables, avec un pH ajusté avec de l'acide chlorhydrique ou de l'hydroxyde de sodium.

• Agiter avant injection • Lire la notice avant utilisation • Tenir hors de la vue et de la portée des enfants • A conserver au réfrigérateur (entre 2°C et 8°C) • Conserver la seringue dans l'emballage extérieur à l'abri de la lumière • Ne pas congeler • Prévention contre l'infection provoquée par le virus de l'hépatite A chez l'enfant âgé de 12 mois à 15 ans • Tout produit non utilisé ou déchet doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur.

AVAXIM 80 U

Pédiatrique/Pediatric/Pediátrico

Vaccin de l'hépatite A (inactivé, adsorbé)
Hepatitis A vaccine (inactivated, adsorbed)
Vacuna contra la hepatitis A (inactivada, adsorbida)

Suspension injectable en seringue préremplie (0,5 ml) avec aiguille - 1 dose — Voie intramusculaire
Suspension for injection in pre-filled syringe (0.5 mL) with needle - 1 dose — Intramuscular route
Suspensión inyectable en jeringa precargada (0,5 ml) con aguja - 1 dosis — Vía intramuscular

SANOFI PASTEUR

Hepatitis A virus, GBM strain* (inactivated) ** .....80 U***
For one dose of 0.5 mL

* Cultured on MRC-5 human diploid cells
** Adsorbed on hydrated aluminium hydroxide (0.15 milligrams of Al)
*** In the absence of an international standardised reference, the antigen content is expressed using an in-house reference

2-Phenoxyethanol, formaldehyde and Hanks medium 199 without phenol red (a complex mixture of amino acids (including phenylalanine), mineral salts, vitamins and other components), supplemented with polysorbate 80 and diluted in water for injections, with a pH adjusted with hydrochloric acid or sodium hydroxide.

• Shake before injection • Read the package leaflet before use • Keep out of the sight and reach of children • Store in a refrigerator (2°C - 8°C) • Keep the syringe in the outer package, protected from light • Do not freeze • Prevention of the infection caused by the hepatitis A virus in children aged from 12 months to 15 years • Any unused product or waste material should be disposed of in accordance with local requirements.


AVAXIM 80 U Pédiatrique/ Pediatric/Pediátrico

Vaccin de l'hépatite A (inactivé, adsorbé)/Hepatitis A vaccine (inactivated, adsorbed)/Vacuna contra la hepatitis A (inactivada, adsorbida)
1 dose/dosis - 0,5 ml/0.5 ml
Voie IM/IM route/Vía IM
Agiter avant injection/Shake before injection/Agitar antes de inyectar.
Sanofi Pasteur

Manuf. :
Lot :
EXP/CAD :
195 977800

SANOFI PASTEUR VACCINES COMPANY LIMITED
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

V2	03/02/2017 - CT/SP
Code article **977800**	Sanofi Pasteur **XFAE**
SPECIFICITE(S) MLE	SPECIFICITE(S) VDR
Etiquette - Format : 19 x 38 mm	
■ seringue ☐ flacon ☐ ampoule	
3 Réf. Pantone Coated : **Black** 1375 232	
Tracé	



AVAXIM 80 U Pediatric,
nhãn phụ hộp 1 bơm tiêm nạp sẵn 1 liều (0,5 ml)

℞ **Thuốc bán theo đơn** **AVAXIM 80 U Pediatric** **VẮC-XIN VIÊM GAN A (BẤT HOẠT, HẤP PHỤ)** Hỗn dịch tiêm. Hộp 1 bơm tiêm nạp sẵn 1 liều (0,5 ml). Hoạt chất trong 1 liều 0,5ml: Virus Viêm gan A, chủng GBM (bất hoạt) 80U. Tiêm bắp. Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và các thông tin khác: xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng. **Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.**	**Bảo quản ở nhiệt độ từ +2^{0}C đến +8^{0}C (trong tủ lạnh). Không để đông băng. Để xa tầm tay và tầm mắt trẻ em.** Tiêu chuẩn SX: TCCS. Số lô SX, NSX và HD: xem LOT, MANUF. và EXP. trên bao bì. Ngày hết hạn là ngày cuối cùng của tháng hết hạn (EXP.) trên bao bì. SX bởi SANOFI PASTEUR S.A. tại 1541 avenue Marcel Merieux, 69280 Marcy l'Etoile – Pháp (địa điểm 1) / Parc Industriel d'Incarville, 27100 Val de Reuil – Pháp (địa điểm 2). DNNK: Số ĐK:

SANOFI PASTEUR VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY

Kích thước nhãn phụ 22 x 128 mm

℞ Thuốc bán theo đơn **AVAXIM 80 U Pediatric** **(VẮC-XIN VIÊM GAN A BẤT HOẠT, HẤP PHỤ)** Hỗn dịch tiêm. Hộp 1 bơm tiêm nạp sẵn 1 liều (0,5 ml). Hoạt chất trong 1 liều 0,5ml: Virus Viêm gan A, chủng GBM (bất hoạt) 80U. Tiêm bắp. Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và các thông tin khác: xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng. **Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.**	**Bảo quản ở nhiệt độ từ +2^{0}C đến +8^{0}C (trong tủ lạnh). Không để đông băng. Để xa tầm tay và tầm mắt trẻ em.** Tiêu chuẩn SX: TCCS. Số lô SX, NSX và HD: xem LOT, MANUF. và EXP. trên bao bì. Ngày hết hạn là ngày cuối cùng của tháng hết hạn (EXP.) trên bao bì. SX bởi SANOFI PASTEUR S.A. tại 1541 avenue Marcel Merieux, 69280 Marcy l'Etoile – Pháp (địa điểm 1) / Parc Industriel d'Incarville, 27100 Val de Reuil – Pháp (địa điểm 2). DNNK: Số ĐK:

TIN-26370(BS)

℞ Thuốc bán theo đơn

AVAXIM 80 U Pediatric

VẮC XIN VIÊM GAN A BẤT HOẠT, HẤP PHỤ

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Để xa tầm tay trẻ em
Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

THÀNH PHẦN

Hoạt chất: Virus viêm gan A, chủng GBM* (bất hoạt) ** ..... 80 U***
Trong 1 liều 0,5 mL.

* nuôi cấy trên các tế bào lưỡng bội người MRC-5
** hấp phụ trên hydroxid nhôm hydrat hóa (0,15 milligram Al).
*** không có chất chuẩn quốc tế, hàm lượng kháng nguyên được tính bằng cách sử dụng chất chuẩn của nhà sản xuất.

Các thành phần khác: 2-Phenoxyethanol, Formaldehyde và môi trường Hanks 199[(1)] (không có phenol đỏ) bổ sung với polysorbate 80.

[(1)] môi trường Hanks 199 là một hỗn hợp phức tạp gồm các axit amin (bao gồm phenylalanine), muối khoáng, vitamin, và các chất khác, pha loãng trong nước pha tiêm, pH được điều chỉnh bằng hydrochloric acid hoặc sodium hydroxyde.

DẠNG DƯỢC PHẨM

Hỗn dịch tiêm, được nạp sẵn trong bơm tiêm (0,5 ml).

AVAXIM 80 U Pediatric là một hỗn dịch trắng mờ và đục.

QUI CÁCH ĐÓNG GÓI

Hộp 1 bơm tiêm nạp sẵn 1 liều (0,5 ml) vắc xin.

ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC

Nhóm dược trị liệu: vắc-xin virus, ATC code: J07B C02

Vắc-xin này được điều chế từ virus viêm gan A được nuôi cấy, thu hoạch và bất hoạt bằng formaldehyde.

Đáp ứng kháng thể tạo miễn dịch chống lại virus viêm gan A có được do vắc-xin viêm gan A tồn tại lâu hơn và cao hơn so với đáp ứng kháng thể có được khi tạo miễn dịch thụ động bằng immunoglobulin. Vắc-xin này tạo ra đáp ứng kháng thể chống lại virus viêm gan A (hiệu giá ≥ 20 mIU/ml) trong vòng 2 tuần sau khi tiêm vắc-xin ở trên 95% người tiêm vắc-xin và ở 100% người tiêm trước khi tiêm liều nhắc lại.

Miễn dịch tồn tại 6 đến 36 tháng và được củng cố sau một liều nhắc lại.

Sự tồn tại lâu dài của nồng độ kháng thể kháng virus viêm gan A ở mức bảo vệ sau liều thứ hai (nhắc lại) của AVAXIM 80 Pediatric hiện tại chưa được thiết lập. Tuy nhiên, các dữ liệu hiện có cho thấy kháng thể kháng virus viêm gan A tồn tại trên 10 năm sau liều thứ hai ở những người khỏe mạnh.

ĐẶC TÍNH DƯỢC ĐỘNG HỌC

Không áp dụng.

CHỈ ĐỊNH

AVAXIM 80 U Pediatric được chỉ định để tạo miễn dịch chủ động phòng các bệnh do nhiễm virus viêm gan A ở trẻ em từ 12 tháng đến dưới 16 tuổi.

Vắc-xin này nên được sử dụng theo những khuyến cáo chính thức.

LIỀU DÙNG

Tiêm chủng cơ bản với một liều vắc-xin. Liều được khuyến cáo là 0,5 mL cho mỗi lần tiêm. Để được bảo vệ phòng bệnh lâu dài, khuyến cáo tiêm liều nhắc lại lúc 6 tháng đến 36 tháng sau khi tiêm liều cơ bản.

Kháng thể kháng virus viêm gan A tồn tại khoảng vài năm (trên 10 năm) sau liều thứ hai (tiêm nhắc lại).

CÁCH DÙNG VÀ ĐƯỜNG DÙNG

Lắc trước khi tiêm cho đến khi được một hỗn dịch đồng chất.

Vắc-xin phải được kiểm tra cảm quan trước khi dùng để kiểm tra không có tiểu phân lạ.

Vắc-xin này phải được sử dụng bằng đường tiêm bắp (IM).

Các vị trí tiêm được khuyến cáo là vùng cơ delta.

Trong trường hợp ngoại lệ, ở bệnh nhân bị giảm tiểu cầu hay bệnh nhân bị chứng dễ chảy máu thì có thể tiêm dưới da (SC).

Không được tiêm vắc-xin này ở vùng mông vì số lượng khác nhau của các mô mỡ ở vùng này có thể làm biến đổi hiệu quả của vắc-xin.

Không được tiêm vào lòng mạch máu: phải chắc chắn rằng kim không đâm vào lòng mạch máu.

Không được tiêm bằng đường trong da.

Các sản phẩm không còn sử dụng hay thải bỏ cần phải được xử lý theo qui định hiện hành.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Quá mẫn cảm với thành phần hoạt chất, với một trong các tá dược, với neomycin (có thể hiện diện dạng vết trong mỗi liều dùng do việc sử dụng chất này trong quá trình sản xuất).
- Từng bị phản ứng quá mẫn cảm sau khi tiêm vắc-xin này.
- Nên hoãn tiêm chủng trong trường hợp bệnh cấp tính nặng có sốt.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG ĐẶC BIỆT

Giống như khi dùng các vắc-xin bằng đường tiêm khác, phải chuẩn bị sẵn thuốc để điều trị và theo dõi người được tiêm vắc-xin trong trường hợp bị phản ứng phản vệ sau khi tiêm vắc-xin.

Ngất (ngất xỉu) có thể xảy ra sau, hoặc thậm chí trước, bất kỳ tiêm chủng nào như một phản ứng tâm lý với kim tiêm, đặc biệt ở thanh thiếu niên. Điều này có thể được kèm theo một số dấu hiệu thần kinh như rối loạn tầm nhìn thoáng qua, dị cảm và gồng cứng kèm co giật (tonic-clonic) các chi trong giai đoạn phục hồi. Điều quan trọng là các quy trình phù hợp để tránh bất kỳ thương tích nào do ngất đi.

AVAXIM 80 U Pediatric chưa được nghiên cứu ở bệnh nhân có suy giảm miễn dịch.

Điều trị ức chế miễn dịch hay tình trạng suy giảm miễn dịch có thể làm đáp ứng miễn dịch của vắc-xin kém đi. Trong những trường hợp này, nên đợi đến khi hoàn tất việc điều trị rồi mới tiêm chủng hay đảm bảo đối tượng được bảo vệ tốt. Tuy nhiên, tiêm chủng cho các đối tượng suy giảm miễn dịch mạn tính như nhiễm HIV được khuyến khích mặc dù đáp ứng kháng thể có thể hạn chế.

Vì bệnh viêm gan A có thời gian ủ bệnh, nên có thể đã nhiễm virus, mặc dù không có triệu chứng tại thời điểm tiêm chủng.

Tác động của việc sử dụng AVAXIM 80 U Pediatric trong suốt giai đoạn ủ bệnh của bệnh viêm gan A chưa được ghi nhận.

Trong trường hợp này, tiêm chủng có thể không có tác động trên sự phát triển của bệnh viêm gan A.

Việc sử dụng vắc-xin này ở những đối tượng có bệnh gan cần được cân nhắc thận trọng, vì không có nghiên cứu nào được thực hiện trên các đối tượng này.

Như với tất cả các loại vắc-xin, tiêm chủng có thể không tạo được đáp ứng bảo vệ ở một số đối tượng được tiêm.

Vắc-xin này không bảo vệ cơ thể phòng ngừa bệnh do nhiễm virus viêm gan B, virus viêm gan C, hay virus viêm gan E hay các tác nhân gây bệnh gan đã được biết khác.

Phụ nữ có thai và cho con bú

Phụ nữ có thai

Không có dữ liệu liên quan về việc sinh quái thai ở động vật.

Ở người, hiện nay, không có đủ dữ liệu để đánh giá nguy cơ về sinh quái thai hay nhiễm độc thai khi tiêm vắc-xin viêm gan A trong thai kỳ.

Để cẩn trọng, tốt nhất không nên tiêm vắc-xin này trong thai kỳ, trừ khi có nguy cơ phơi nhiễm cao.

Phụ nữ cho con bú

Có thể tiêm vắc-xin này trong thời gian cho con bú sữa mẹ.

Lái xe và vận hành máy móc

Chưa có nghiên cứu về ảnh hưởng đối với khả năng lái xe và vận hành máy móc.

Sử dụng cùng với các dược phẩm khác

Có thể tiêm immunoglobulin cùng lúc với vắc-xin này với điều kiện là phải tiêm tại hai nơi khác nhau. Tỷ lệ huyết thanh bảo vệ không thay đổi nhưng nồng độ kháng thể có thể thấp hơn ở người chỉ tiêm vắc-xin.

Trong trường hợp dùng cùng lúc, không được trộn vắc-xin này với các vắc-xin khác trong cùng một bơm tiêm. Vắc-xin này có thể dùng cùng lúc, tại 2 vị trí tiêm khác nhau, với các vắc-xin tiêm nhắc thường quy ở trẻ em trong năm tuổi thứ hai, ví dụ như các vắc-xin chứa một hay nhiều thành phần sau: bạch hầu, uốn ván, ho gà (toàn tế bào hay vô bào), *Haemophilus influenzae* týp b và vắc-xin bại liệt uống hay vắc-xin bại liệt bất hoạt.

Vắc-xin này có thể tiêm cùng lúc, nhưng ở hai vị trí tiêm khác nhau, cùng với vắc-xin phòng ngừa bệnh sởi, quai bị và rubella.

Vắc-xin này có thể dùng để tiêm nhắc lại ở những người trước đây đã tiêm với một loại vắc-xin viêm gan A bất hoạt khác.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Các tác dụng không mong muốn ghi nhận được từ các thử nghiệm lâm sàng và kinh nghiệm hậu mại toàn cầu.

Trong mỗi hệ cơ quan, các tác dụng không mong muốn được xếp theo tần xuất, các phản ứng thường gặp nhất được nêu đầu tiên, theo quy ước sau:

Rất thường gặp (≥ 1/10), thường gặp (≥ 1/100 đến < 1/10), không thường gặp (≥ 1/1.000 đến < 1/100), hiếm gặp ≥ 1/10.000 đến < 1/1.000), rất hiếm gặp (< 1/10.000) kể cả các trường hợp báo cáo tự phát.

Các nghiên cứu lâm sàng

Hơn 3.500 trẻ em trong độ tuổi từ 12 tháng đến dưới 16 tuổi (khoảng 7.000 liều dùng) đã được tiêm chủng bằng vắc-xin này trong các nghiên cứu lâm sàng.

Tất cả các tác dụng không mong muốn đều ở mức độ vừa, giới hạn trong vòng một vài ngày sau khi tiêm vắc-xin và tự khỏi. Tần suất các phản ứng sau khi tiêm liều nhắc lại ít hơn so với với sau khi tiêm liều đầu tiên.

Tuy nhiên, như các dược phẩm khác, khi triển khai sử dụng rộng rãi vắc-xin ở quy mô thương mại có thể gặp các tác dụng không mong muốn hiếm xảy ra.

Rối loạn dinh dưỡng và chuyển hóa

Thường gặp: giảm sự thèm ăn

Rối loạn tâm thần

Thường gặp: dễ kích động, mất ngủ

Rối loạn hệ thần kinh

Thường gặp: đau nhức đầu

Rối loạn dạ dày – ruột

Thường gặp: đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn, nôn

Rối loạn cơ xương và mô liên kết

Thường gặp: đau cơ, đau khớp

Rối loạn toàn thân và nơi tiêm

Thường gặp: phản ứng tại vị trí tiêm như đau, đỏ, phù hoặc chai cứng, sốt, suy nhược

Rối loạn da và mô dưới da

Không thường gặp: phát ban, mề đay

Kinh nghiệm hậu mại

Dựa trên các báo cáo tự phát, các biến cố bất lợi sau đây được báo cáo trong quá trình sử dụng thương mại AVAXIM 80 U Pediatric. Các biến cố này rất hiếm khi được báo cáo. Tuy vậy, tỉ lệ xuất hiện không được biết chính xác (không thể ước tính dựa trên dữ liệu hiện có).

Rối loạn hệ thần kinh

Ngất có nguồn gốc phó giao cảm khi phản ứng do bị kích thích với việc tiêm phòng.

QUÁ LIỀU

Quá liều hầu như không gây ra bất kỳ ảnh hưởng có hại nào.

BÁO CÁO CÁC PHẢN ỨNG BẤT LỢI NGHI NGỜ

Việc báo cáo các phản ứng bất lợi đáng ngờ sau khi sản phẩm thuốc được cấp phép lưu hành là rất quan trọng. Điều này cho phép tiếp tục theo dõi cân bằng lợi ích/nguy cơ của sản phẩm thuốc. Nhân viên y tế được yêu cầu báo cáo mọi phản ứng bất lợi nghi ngờ qua hệ thống báo cáo quốc gia đến Trung tâm Quốc gia về thông tin thuốc và theo dõi phản ứng có hại của thuốc theo địa chỉ hộp thư điện tử: di.pvcenter@gmail.com

BẢO QUẢN

Để xa tầm tay và tầm mắt của trẻ em.

Vắc xin phải được bảo quản ở nhiệt độ từ +2°C đến +8°C (trong tủ lạnh) và tránh ánh sáng. Không được để đông băng.

TUỔI THỌ:

36 tháng kể từ ngày làm thử nghiệm công hiệu đầu tiên. Xem ngày hết hạn dùng "EXP" trên bao bì.

Không sử dụng sau hạn dùng được ghi trên bao bì.

TÊN VÀ ĐỊA CHỈ NHÀ SẢN XUẤT / ĐƠN VỊ ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP LƯU HÀNH

SANOFI PASTEUR S.A.
Trụ sở chính: 2 avenue Pont Pasteur, 69007 Lyon – Pháp.

Sản xuất bởi SANOFI PASTEUR S.A. tại 1541 avenue Marcel Merieux, 69280 Marcy l'Etoile – Pháp (địa điểm 1) / Parc Industriel d'Incarville, 27100 Val de Reuil – Pháp (địa điểm 2).

TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT: Tiêu chuẩn cơ sở

Phiên bản: 01/2016

NGÀY PHÊ DUYỆT NỘI DUNG:

SANOFI PASTEUR

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

TUQ CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Thu Thủy