14/831

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
Lần đầu: 08/06/2016

V3	03/05/2013 - VF/CT
Code article : 965260	Sanofi Pasteur F/A/E
09652606	Repères d'arêtes n° : 1 - 13 - 31
Dim. int. : 31,5 x 22,5 x 128,5 mm	
3 REF. PANTONE : Reflex Blue C (Textes + Nom + RA n°1 et n°31 + Logo) 354 C (Dégradé)	286 C (Demi-soleil + RA n°13) Tracé

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CÔNG TY SANOFI PASTEUR S.A.

TYPHIM Vi
1 seringue/syringe/jeringa

SANOFI PASTEUR SA
2, avenue Pont Pasteur
69007 Lyon - France/Francia

EXP: LOT: MANUF:

℞ Thuốc bán theo đơn

TYPHIM Vi (VẮC-XIN THƯƠNG HÀN Vi POLYSACCHARIDE)

Dung dịch tiêm. Hộp 1 bơm tiêm 1 liều 0,5 ml. Hoạt chất: mỗi liều 0,5 ml chứa Polysaccharide của *Samonella typhi* (chủng Ty2) 25 mcg. **Tiêm bắp hay tiêm dưới da.** Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và các thông tin khác: xem trong tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo. **Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Để xa tầm tay trẻ em. Bảo quản trong tủ lạnh (+2°C đến +8°C). Không để đông băng.**

Tiêu chuẩn SX: TCCS. Số lô SX, NSX và HD: xem LOT, MANUF. và EXP. trên bao bì. Ngày hết hạn dùng là ngày 01 của tháng hạn dùng (EXP.) trên bao bì. SX bởi SANOFI PASTEUR S.A. tại Campus Mérieux, 1541 avenue Marcel Mérieux, 69280 Marcy l'Etoile – Pháp (địa điểm 1) / Parc Industriel d'Incarville, 27100 Val de Reuil – Pháp (địa điểm 2).

DNNK: SĐK:

TYPHIM Vi
1 seringue/syringe/jeringa

Composition en substances actives :
Une dose de 0,5 ml de vaccin contient :
– Polyosides de *Salmonella typhi* (souche Ty2) ..... 25 µg
Liste des excipients :
– Phénol et solution tampon contenant du chlorure de sodium, du phosphate disodique dihydraté, du phosphate monosodique dihydraté et de l'eau pour préparations injectables.

A conserver au réfrigérateur (entre + 2°C et + 8°C).
Ne pas congeler.
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
Lire attentivement la notice avant utilisation.
Prévention de la fièvre typhoïde chez les adultes et les enfants de plus de 2 ans.

093 965260

TYPHIM Vi

VACCIN TYPHOÏDIQUE POLYOSIDIQUE/POLYSACCHARIDE
TYPHOID VACCINE/VACUNA ANTITIFOÍDICA POLISACÁRIDA

Solution injectable en seringue préremplie - 0,5 ml - boîte de 1
Solution for injection in a prefilled syringe - 0.5 ml - box of 1
Solución inyectable en jeringa prellenada - 0,5 ml - caja de 1

Voie intramusculaire (IM) ou sous-cutanée (SC)/Intramuscular (IM) or subcutaneous (SC) route/
Vía intramuscular (IM) o subcutánea (SC)

SANOFI PASTEUR

Statement of active substances:
One dose of 0.5 ml of vaccine contains:
– Polysaccharides of *Salmonella typhi* (Ty2 strain) ..... 25 µg
List of excipients:
– Phenol and buffer solution containing sodium chloride, disodium phosphate dihydrate, sodium dihydrogen phosphate dihydrate and water for injections.

Store in a refrigerator (between + 2°C and + 8°C).
Do not freeze.
Keep out of the reach and sight of children.
Read the leaflet carefully before use.
Prevention of typhoid fever in adults and children over 2 years of age.

V3 03/05/2013 - VF/CT

Code article : **965260**

Sanofi Pasteur
F/A/E

09652606

Repères d'arêtes n° : 1 - 13 - 31

Dim. int. : 31,5 x 22,5 x 128,5 mm

3 REF. PANTONE :
Reflex Blue C (Textes + Nom + RA n°1 et n°31 + Logo)
286 C (Demi-soleil + RA n°13)
Tracé
354 C (Dégradé)



TYPHIM Vi
1 seringue/syringe/jeringa

SANOFI PASTEUR SA
2, avenue Pont Pasteur
69007 Lyon - France/Francia

EXP.:
LOT:
MANUF.:

Composición en principios activos :
Una dosis de 0,5 ml de vacuna contiene :
– Polisacáridos de *Salmonella typhi* (cepa Ty2) 25µg
Lista de excipientes :
– Fenol y solución tampón que contiene cloruro de sodio, fosfato disódico dihidratado, fosfato monosódico dihidratado y agua para los preparados inyectables.
Conservar en refrigerador (entre + 2°C y + 8°C).
No congelar.
Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños.
Leer detenidamente el prospecto antes de utilizar la vacuna.
Prevención de la fiebre tifoidea en adultos y niños mayores de 2 años.

TYPHIM Vi
1 seringue/syringe/jeringa

Composition en substances actives :
Une dose de 0,5 ml de vaccin contient :
– Polyosides de *Salmonella typhi* (souche Ty2) ..... 25 µg
Liste des excipients :
– Phénol et solution tampon contenant du chlorure de sodium, du phosphate disodique dihydraté, du phosphate monosodique dihydraté et de l'eau pour préparations injectables.

A conserver au réfrigérateur (entre + 2°C et + 8°C).
Ne pas congeler.
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
Lire attentivement la notice avant utilisation.
Prévention de la fièvre typhoïde chez les adultes et les enfants de plus de 2 ans.

093 965260

TYPHIM Vi

VACCIN TYPHOÏDIQUE POLYOSIDIQUE/POLYSACCHARIDE
TYPHOID VACCINE/VACUNA ANTITIFOÍDICA POLISACÁRIDA


Solution injectable en seringue préremplie - 0,5 ml - boîte de 1
Solution for injection in a prefilled syringe - 0.5 ml - box of 1
Solución inyectable en jeringa prellenada - 0,5 ml - caja de 1
Voie intramusculaire (IM) ou sous-cutanée (SC)/Intramuscular (IM) or subcutaneous (SC) route/
Vía intramuscular (IM) o subcutánea (SC)

SANOFI PASTEUR

Statement of active substances:
One dose of 0.5 ml of vaccine contains:
– Polysaccharides of *Salmonella typhi* (Ty2 strain) ..... 25 µg
List of excipients:
– Phenol and buffer solution containing sodium chloride, disodium phosphate dihydrate, sodium dihydrogen phosphate dihydrate and water for injections.

Store in a refrigerator (between + 2°C and + 8°C).
Do not freeze.
Keep out of the reach and sight of children.
Read the leaflet carefully before use.
Prevention of typhoid fever in adults and children over 2 years of age.

Nhãn trên bơm tiêm nạp sẵn 1 liều (0,5 ml) vắc xin



CÔNG TY SANOFI PASTEUR
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

VI	21/05/2013 - CT
Code article 967031	Sanofi Pasteur F/A/E
SPECIFICITE(S) MLE	SPECIFICITE(S) VDR
Dim. int. : 19 x 38 mm	
■ seringue ☐ flacon ☐ ampoule	
3 Ref. Pantone C : Black C (Textes) 286 (Bandeau sup.) 354 (Bandeau inf.) Tracé	



TYPHIM Vi, nội dung nhãn phụ hộp 1 bơm tiêm 1 liều

℞ **Thuốc bán theo đơn**

TYPHIM Vi (VẮC-XIN THƯƠNG HÀN Vi POLYSACCHARIDE)

Dung dịch tiêm.

Hộp 1 bơm tiêm 1 liều 0,5 ml.

Hoạt chất: mỗi liều 0,5 ml chứa Polysaccharide của *Samonella typhi* (chủng Ty2) 25 mcg.

Tiêm bắp hay tiêm dưới da.

Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và các thông tin khác: xem trong tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Để xa tầm tay trẻ em. Bảo quản trong tủ lạnh (+2°C đến +8°C). Không để đông băng.

Tiêu chuẩn SX: TCCS.

Số lô SX, NSX và HD: xem LOT, MANUF. và EXP. trên bao bì. Ngày hết hạn dùng là ngày 01 của tháng hạn dùng (EXP.) trên bao bì.

SX bởi SANOFI PASTEUR S.A. tại Campus Mérieux, 1541 avenue Marcel Mérieux, 69280 Marcy l'Etoile – Pháp (địa điểm 1) / Parc Industriel d'Incarville, 27100 Val de Reuil – Pháp (địa điểm 2).

DNNK: SĐK:

CÔNG TY SANOFI PASTEUR S.A. VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TYPHIM Vi, nhãn phụ trên hộp 1 bơm tiêm 1 liều

Kích thước nhãn phụ: 30 x 80 mm

℞ Thuốc bán theo đơn

TYPHIM Vi (VẮC-XIN THƯƠNG HÀN Vi POLYSACCHARIDE)

Dung dịch tiêm. Hộp 1 bơm tiêm 1 liều 0,5 ml. Hoạt chất: mỗi liều 0,5 ml chứa Polysaccharide của *Samonella typhi* (chủng Ty2) 25 mcg. **Tiêm bắp hay tiêm dưới da.** Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và các thông tin khác: xem trong tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo. **Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Để xa tầm tay trẻ em. Bảo quản trong tủ lạnh (+2°C đến +8°C). Không để đông băng.** Tiêu chuẩn SX: TCCS. Số lô SX, NSX và HD: xem LOT, MANUF. và EXP. trên bao bì. Ngày hết hạn dùng là ngày 01 của tháng hạn dùng (EXP.) trên bao bì. SX bởi SANOFI PASTEUR S.A. tại Campus Mérieux, 1541 avenue Marcel Mérieux, 69280 Marcy l'Etoile – Pháp (địa điểm 1) / Parc Industriel d'Incarville, 27100 Val de Reuil – Pháp (địa điểm 2).

DNNK: SĐK:

14/31

℞ **Thuốc này chỉ dùng theo đơn của bác sĩ**

TYPHIM Vi
VẮC-XIN THƯƠNG HÀN Vi POLYSACCHARIDE

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nên tuân thủ cẩn thận lời khuyên của bác sĩ hoặc y tá.
Nếu muốn biết thêm thông tin hoặc lời khuyên, hãy hỏi bác sĩ hoặc y tá.
Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.
Nên giữ tờ hướng dẫn sử dụng này. Có thể cần đọc lại tờ hướng dẫn sử dụng này.

THÀNH PHẦN
Hoạt chất:
Polysaccharide của *Salmonella typhi* chủng Ty2..... 25 mcg trong một liều 0,5ml

Các thành phần khác: Phenol và dung dịch đệm chứa sodium chloride, disodium phosphate dihydrate, sodium dihydrogen phosphate dihydrate, và nước pha tiêm.

DẠNG BÀO CHẾ:
Dung dịch tiêm.

ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC
Vắc-xin này được điều chế từ polysaccharide vỏ Vi của *Samonella typhi* tinh chế. 15 ngày đến 3 tuần sau khi tiêm vắc-xin thì có miễn dịch. Thời gian bảo vệ ít nhất là 3 năm.

Trong các nghiên cứu thực hiện tại những vùng dịch tễ cao, sau khi tiêm 1 liều vắc-xin thì tỷ lệ huyết thanh bảo vệ (đối với bệnh thương hàn) đạt 77% ở Nepal và 55% ở Nam Phi. Tại những nước công nghiệp hóa, trên 90% người có chuyển đổi huyết thanh sau khi tiêm 1 liều vắc-xin.

ĐẶC TÍNH DƯỢC ĐỘNG HỌC
Không áp dụng.

CHỈ ĐỊNH
Typhim Vi là vắc-xin, được chỉ định để phòng ngừa bệnh thương hàn ở người lớn và trẻ em trên 2 tuổi.

TYPHIM Vi được chỉ định đặc biệt cho những người đi du lịch đến những vùng có bệnh thương hàn lưu hành, di dân, nhân viên y tế và quân nhân.

LIỀU DÙNG
CHỈ DÀNH CHO NGƯỜI LỚN VÀ TRẺ EM TRÊN 2 TUỔI.

Chỉ cần tiêm một mũi thì đã bảo đảm được bảo vệ với bệnh thương hàn.

Việc tiêm nhắc cần phải được thực hiện mỗi 3 năm nếu như đối tượng vẫn tiếp tục có nguy cơ phơi nhiễm.

Trẻ em và người lớn áp dụng cùng một lịch tiêm.

CÁCH DÙNG VÀ ĐƯỜNG DÙNG

Tiêm bắp hay tiêm dưới da.

Các sản phẩm không còn sử dụng được hay vật liệu thải bỏ cần phải được xử lý theo qui định của cơ quan chức năng.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không dùng TYPHIM Vi nếu:

- Bị dị ứng với bất kỳ thành phần nào của vắc-xin,
- Không được tiêm bắp cho người có rối loạn chảy máu như hemophili hoặc giảm tiểu cầu.

THẬN TRỌNG KHI DÙNG TYPHIM Vi

- Đang bị sốt, bệnh cấp tính hay bệnh mạn tính đang tiến triển (trong trường hợp này, tốt nhất nên hoãn việc tiêm vắc-xin lại).
- Không được tiêm vắc-xin này vào mạch máu: phải chắc chắn rằng mũi kim không xuyên vào lòng mạch máu.
- Vắc-xin này bảo vệ cơ thể phòng bệnh thương hàn do *Salmonella typhi*, nhưng không bảo vệ cơ thể phòng bệnh thương hàn do các vi khuẩn khác (*Salmonella paratyphi* A hoặc B).
- Vắc-xin này không chỉ định dùng ở trẻ em dưới 2 tuổi vì hiệu quả bảo vệ ở nhóm tuổi này không đầy đủ.
- Khi tiêm bất cứ vắc-xin nào cũng phải theo dõi phản ứng có hại. Tuy phản ứng phản vệ hiếm xảy ra nhưng bao giờ cũng phải có sẵn thuốc cấp cứu phản ứng phản vệ mỗi khi tiêm chủng.

Có thai – đang cho con bú

Có thai không phải là lý do để không tiêm vắc-xin, vì bệnh có tính chất nghiêm trọng và trong trường hợp có nguy cơ phơi nhiễm bệnh thương hàn cao.

Phụ nữ có thai chỉ được sử dụng vắc-xin này trong thai kỳ khi có ý kiến của bác sĩ.

Có thể tiêm vắc-xin này khi đang cho con bú sữa mẹ.

Phải hỏi ý kiến bác sĩ hay dược sĩ trước khi dùng bất kỳ một loại thuốc gì.

Điều khiển xe và vận hành máy móc

Không có nghiên cứu về ảnh hưởng của vắc-xin đối với việc điều khiển xe và vận hành máy móc.

Dùng các thuốc khác

TYPHIM Vi có thể tiêm cùng lúc với các vắc-xin khác (viêm gan siêu vi A, sốt vàng, bạch hầu, uốn ván, bại liệt, dại, viêm màng não do não mô cầu nhóm A và C và viêm gan siêu vi B) trong cùng một đợt chủng ngừa.

PHẢI BÁO VỚI BÁC SĨ HAY DƯỢC SĨ VỀ CÁC DƯỢC PHẨM ĐANG SỬ DỤNG HAY GẦN ĐÂY CÓ SỬ DỤNG, DÙ LÀ DƯỢC PHẨM MUA KHÔNG CẦN ĐƠN CỦA BÁC SĨ.

Quá liều

Không áp dụng.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Giống như các dược phẩm khác, ở một số người, TYPHIM Vi có thể gây một số tác dụng không mong muốn.

Các ảnh hưởng được ghi nhận sau khi chủng ngừa thường nhẹ và tồn tại trong thời gian ngắn.

- Các phản ứng tại nơi tiêm vắc-xin (đau, sưng, quầng đỏ).
- Hiếm gặp các phản ứng toàn thân (sốt, mệt mỏi, nhức đầu, khó chịu, đau khớp và đau cơ, buồn nôn, đau bụng)
- Rất hiếm gặp các phản ứng dị ứng (ngứa, phát ban, nổi mày đay).

Một số trường hợp cá biệt, phản ứng mẫn cảm do tiêm protein lạ (serum sickness) hay phản ứng dị ứng nghiêm trọng (phản ứng phản vệ) cũng được ghi nhận.

NẾU GHI NHẬN ĐƯỢC BẤT CỨ PHẢN ỨNG KHÔNG MONG MUỐN CHƯA ĐƯỢC ĐỀ CẬP ĐẾN TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NÀY, PHẢI BÁO CHO BÁC SĨ HAY DƯỢC SĨ.

BẢO QUẢN TYPHIM Vi

Để xa tầm tay và tầm mắt của trẻ em.

Bảo quản trong tủ lạnh (2 °C đến +8 °C). Không được để đông băng.

QUI CÁCH ĐÓNG GÓI:

- Hộp 01 bơm tiêm nạp sẵn 1 liều (0,5ml) vắc-xin.
- Hộp 10 lọ, lọ 20 liều (10 ml) vắc-xin.

NHÀ SẢN XUẤT / ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH

SANOFI PASTEUR S.A.
Trụ sở chính: 2 avenue Pont Pasteur, 69007 Lyon – Pháp.

Sản xuất bởi SANOFI PASTEUR S.A. tại Campus Mérieux, 1541 avenue Marcel Mérieux, 69280 Marcy l'Etoile – Pháp (địa điểm 1) / Parc Industriel d'Incarville, 27100 Val de Reuil – Pháp (địa điểm 2).

HẠN DÙNG:
36 tháng.
Xem ngày hết hạn dùng "EXP." trên bao bì.
Không sử dụng sau hạn dùng được ghi trên bao bì.

TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT: tiêu chuẩn cơ sở.

Phiên bản: 12/2004.

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

TUQ CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Thu Thủy