Đợt 21

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
TĐ/BS ngày 04 tháng 9 năm 2013
(theo công văn ...../QLD-ĐK)

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ... M.S.D.N: 0101150040-C.T.C.P

RS.JEV

Vắc xin phòng viêm não Nhật Bản sống, giảm độc lực chủng SA 14-14-2

Hộp 01 lọ đơn liều vắc xin đông khô kèm 01 lọ nước pha tiêm 0.5 mL Đường dùng: tiêm dưới da

Thành phần: Mỗi liều đơn 0.5 mL vắc xin sau hoàn nguyên chứa:
Virus gây viêm não Nhật Bản, chủng SA -14-14-2, sống, giảm độc lực không ít hơn 5,4 log PFU
Tá dược: Gelatin, sucrose, lactose, ure, albumin huyết thanh người, nước pha tiêm
Bảo quản: Từ 2 - 8°C, tránh ánh sáng
Sản xuất bởi: Chengdu Institute of Biological Products Co., Ltd (CDIBP), Trung Quốc
Nhập khẩu: CTCPYT Đức Minh - số 51, ngõ 205, ngách 323/83 Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội
Số lô, ngày sản xuất, hạn dùng: xem "Lot No.", "Mfg.Date" và "Exp.Date" trên nhãn lọ hoặc hộp
Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định: xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng

Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Store and ship at 2 - 8°C, protect from light

Before use, read product insert carefully! Keep out of reach of children.

Subcutaneous injection only!

Manufacturer:
Chengdu Institute of Biological Products Co., Ltd. Chengdu, P.R.China
379 # 3rd Section, Jinhua Road,
Jinjiang District, Chengdu 610023,
Sichuan, P.R. China

CHENGDU INSTITUTE OF BIOLOGICAL PRODUCTS CO., LTD

RS.JEV

Japanese Encephalitis Vaccine, Live

Compositions
A human dose of 0.5 ml contains:
Live-attenuated JE virus (Seed strain SA14-14-2).....5.4 log PFU above
Excipients: Gelatin, Sucrose, Lactose, Urea, Human Serum Albumin,
Sterile Diluent (water for injection) 0.5 ml

RS.JEV

1 dose/ vial
1 vial of lyophilized vaccine and
1 vial of water for injection 0.5 mL

Lot No.:

Mfg.Date:
[dd/mm/yyyy]

Exp.Date:
[dd/mm/yyyy]

SĐK:

Marketed and Distributed by: AMV GR



Diluent for RS.JEV

Dung môi hoàn nguyên vắc xin RS.JEV

Hộp 10 lọ nước pha tiêm 0.5 mL
Bảo quản: 2 - 30°C, không đông đá.
Sản xuất bởi: Chengdu Institute of Biological Products Co., Ltd (CDIBP), Trung Quốc
Nhập khẩu: CTCPYT Đức Minh - Số 51, ngõ 205, ngách 323/83, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội
Số lô, ngày sản xuất, hạn dùng: Xem "Lot. No", "Mfg.Date" và Exp. Date" trên nhãn lọ hoặc hộp
Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Chengdu Institute of Biological Products Co., Ltd

[Constituents]
Water for injection...0.5ml/vial.
[Storage]
2~30℃, do not freeze.

成都生物制品研究所有限责任公司
Manufacturer
Chengdu Institute of Biological Products Co., Ltd. Chengdu, P.R. China
379 #, 3rd Section, Jinhua Road, Jinjiang District, Chengdu 610023, Sichuan, P. R. China

乙型脑炎减毒活疫苗稀释剂
0.5 ml/瓶×10瓶

Diluent for RS. JEV

Use for RS.JEV only

0.5 ml/vial×10 vials

Chengdu Institute of Biological Products Co., Ltd

Lot No.:

Mfg. Date:
[dd/mm/yyyy]
Exp. Date:
[dd/mm/yyyy]

1 dose/vial x 10 vials

RS.JEV

Japanese Encephalitis Vaccine, Live

Compositions
A human dose of 0.5 ml contains:
Live-attenuated JE virus (Seed strain SA14-14-2).....5.4 log PFU above
Excipients: Gelatin, Sucrose, Lactose, Urea, Human Serum Albumin,
Sterile Diluent (water for injection) 0.5 ml

CHENGDU INSTITUTE OF BIOLOGICAL PRODUCTS CO., LTD

Lot No.:

Mfg.Date:
[dd/mm/yyyy]

Exp.Date:
[dd/mm/yyyy]

SDK:

Marketed and Distributed by: AMV GR

RS.JEV

Vắc xin phòng viêm não Nhật Bản sống, giảm độc lực chủng SA 14-14-2

Hộp 10 lọ đơn liều vắc xin đông khô

Đường dùng: tiêm dưới da

Thành phần: Mỗi liều đơn 0,5 mL vắc xin sau hoàn nguyên chứa:
Virus gây viêm não Nhật Bản, chủng SA-14-14-2, sống, giảm độc lực không ít hơn 5,4 log PFU
Tá dược: Gelatin, sucrose, lactose, ure, albumin huyết thanh người, nước pha tiêm
Bảo quản: Từ 2 - 8°C, tránh ánh sáng
Sản xuất bởi: Chengdu Institute of Biological Products Co., Ltd (CDIBP), Trung Quốc
Nhập khẩu: CTCPVT Đức Minh - số 51, ngõ 205, ngách 323/83 Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội
Số lô, ngày sản xuất, hạn dùng: xem "Lot No.", "Mfg.Date" và "Exp.Date" trên nhãn lọ hoặc hộp
Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định: xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng

Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Store and ship at 2 - 8°C, protect from light

Before use, read product insert carefully!
Keep out of reach of children.

Subcutaneous injection only!

Manufacturer:
Chengdu Institute of Biological Products Co., Ltd. Chengdu, P.R.China
379 # 3rd Section, Jinhua Road, Jinjiang District, Chengdu 610023, Sichuan, P.R. China

乙型脑炎减毒活疫苗

1 人份/瓶×10 瓶

国药准字S19980008

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MINH HẢI - TP. HỒ CHÍ MINH
RONGSHENG
S.Đ.N: 0101150040-C.T.C.P

NHÃN LỌ DUNG MÔI

Water for injection

Diluent

Use for RS.JEV only

0.5 ml/ vial

Store and ship at 2 - 30°C, do not freeze

Lot No.:
Mfg. Date:
Exp. Date:

Manufacturer

Chengdu Institute of Biological Products Co., Ltd, Chengdu, P.R. China

NHÃN LỌ VACCIN

RS. JEV

国药准字S19980008

Japanese Encephalitis Vaccine, Live

1 dose/ vial

Subcutaneous injection only

Above 5.4 logPFU / dose

[Storage]

Store and ship at 2 - 8℃, protect from light

Lot No.:

Mfg. Date:

Exp.Date:

Manufacturer

Chengdu Institute of Biological Products Co., Ltd, Chengdu, P.R. China

Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

RS.JEV – vắc xin phòng viêm não Nhật Bản, sống, giảm độc lực

Chủng SA 14-14-2

Thành phần

Mỗi liều đơn 0,5 ml vắc xin sau hoàn nguyên chứa

Virus gây viêm não Nhật Bản, chủng SA 14-14-2, sống, giảm độc lực không ít hơn 5,4 log PFU

Tá dược:

Lactose, sucrose, albumin huyết thanh người, urea, gelatin.

Dung môi: nước pha tiêm

Mô tả

Chế phẩm vắc xin viêm não Nhật Bản sống, giảm độc lực được nuôi cấy trên tế bào thận chuột. Sau khi nuôi cấy và thu hoạch, hỗn dịch virus được thêm chất ổn định thích hợp và làm đông khô. Sản phẩm có dạng bánh màu vàng nhạt hoặc hồng nhạt. Sau khi hoàn nguyên tạo dịch lỏng trong suốt màu đỏ cam hoặc hồng nhạt.

Dạng bào chế và quy cách đóng gói:

Bột đông khô và dung môi pha tiêm

Hộp 10 lọ đơn liều vắc xin đông khô kèm hộp 10 lọ nước pha tiêm 0.5 mL

Hộp 01 lọ đơn liều vắc xin đông khô kèm 01 lọ nước pha tiêm 0.5 mL

Dược động học: không áp dụng

Dược lực học:

Sau khi chủng ngừa loại vắc xin này, có thể kích thích cơ thể tạo ra miễn dịch đối với virus viêm não Nhật Bản B. Vắc xin này dùng để phòng bệnh viêm não Nhật Bản B.

Chỉ định

Phòng bệnh viêm não Nhật Bản B.

Đối tượng tiêm chủng:

Trẻ em khỏe mạnh từ 12 tháng tuổi đến 47 tháng tuổi.

Liều dùng và cách dùng

- Căn cứ theo liều lượng trên nhãn, hoàn nguyên vắc xin đông khô với dung môi pha loãng kèm theo, lắc kỹ trước khi sử dụng
- Tiêm dưới da vắc xin ở vùng cơ delta cánh tay.

Lịch chủng ngừa như sau:

- Mũi cơ bản: 01 liều 0.5 mL lúc trẻ 12 tháng tuổi
- Mũi nhắc lại: 01 liều 0.5 mL khi trẻ 2 tuổi, sau đó không cần tiêm nhắc lại nữa.

Tác dụng phụ

Tác dụng phụ thường gặp:

- Trong vòng 24 tiếng sau khi tiêm chủng, chỗ tiêm có thể bị đau, trong hầu hết các trường hợp hiện tượng trên sẽ tự biến mất trong vòng 2-3 ngày.
- Thông thường có thể xảy ra sốt trong vòng 1 – 2 tuần sau khi tiêm chủng, trong đó đa phần là sốt ở mức độ nhẹ, và tự giảm dần trong vòng 1 – 2 ngày mà không cần điều trị. Khi cần có thể nghỉ ngơi hợp lý, uống nhiều nước, chú ý giữ ấm, đề phòng nhiễm trùng thứ phát; đối với trường hợp sốt mức độ nặng hơn hoặc thời gian sốt kéo dài quá 48 giờ thì có thể xử lý bằng cách điều trị triệu chứng hoặc dùng phương pháp vật lý.
- Sau khi tiêm chủng, thỉnh thoảng xuất hiện phát ban rải rác trên da, thông thường không cần điều trị đặc biệt, khi cần thiết có thể điều trị triệu chứng.

Tác dụng phụ hiếm gặp:

Sốt mức độ nặng: cần xử lý bằng phương pháp vật lý và điều trị triệu chứng, tránh để sốt cao dẫn đến hiện tượng ngất xỉu.

Những tác dụng phụ cực kỳ hiếm gặp:

- Phát ban dị ứng: thông thường có thể xảy ra ngứa trong vòng 72 giờ sau khi tiêm chủng. Cần điều trị ngay bằng thuốc điều trị dị ứng.
- Sốc phản vệ: có thể xảy ra trong vòng 1 giờ sau khi tiêm chủng, cần tiến hành ngay các biện pháp cấp cứu như tiêm Adrenaline.
- Ban xuất huyết dị ứng: khi xuất hiện hiện tượng ban xuất huyết dị ứng cần xử lý lâm sàng ngay và kịp thời điều trị chống sốc phản vệ bằng corticosteroid, điều trị không đúng hoặc không kịp thời có thể dẫn đến xuất huyết viêm thận.
- Phù mạch thần kinh, cần phải điều trị ngay.

Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

Chống chỉ định

- Những người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của vắc xin, bao gồm cả tá dược và gentamicin sulfate.
- Những người bị bệnh cấp tính, bệnh mạn tính nặng, bị sốt hoặc đang trong thời kỳ cấp tính của bệnh mạn tính.
- Phụ nữ có thai

miễn dịch

- Những người bị bệnh về não, bệnh động kinh không kiểm soát được và các bệnh về thần kinh khác.

Thận trọng

- Cần sử dụng thận trọng vắc xin cho những người có tiền sử bị ngất hoặc trong gia đình có người từng bị ngất, những người mắc bệnh mãn tính, người có tiền sử bị bệnh động kinh, bị dị ứng, phụ nữ đang trong thời kỳ cho con bú.
- Tránh để vắc xin tiếp xúc với thuốc sát trùng khi mở lọ và trong suốt quá trình tiêm.
- Tuyệt đối không sử dụng vắc xin nếu phát hiện thấy lọ bị hở, nhãn mác không rõ ràng, hết hạn hoặc có vón cục sau khi hoàn nguyên.
- Sử dụng vắc xin ngay sau khi mở, nếu không bảo quản vắc xin ở 2 – 8^{0}C và sử dụng trong vòng 30 phút; bỏ phần vắc xin thừa nếu có
- Cần chuẩn bị sẵn Adrenaline đề phòng trường hợp có phản ứng phản vệ nghiêm trọng. Người được tiêm sau khi tiêm cần được giữ lại để theo dõi tại chỗ khoảng 30 phút.
- Việc tiêm chủng nên được hoãn lại ít nhất 3 tháng sau khi tiêm globulin miễn dịch.
- Không tiêm vắc xin trong vòng 1 tháng trước hoặc sau khi tiêm vắc xin sống khác.
- Sản phẩm này là vắc xin sống giảm độc lực, không khuyến cáo sử dụng trong thời gian có dịch bệnh này.
- Phụ nữ trong độ tuổi sinh nở, tránh mang thai trong vòng 3 tháng sau khi tiêm chủng loại vắc xin này.
- Tuyệt đối không được để vắc xin bị đông đá.

Tương tác với các thuốc khác hoặc các dạng tương tác khác.

Hiện chưa có dữ liệu lâm sàng nào về việc dùng đồng thời vắc xin RS.JEV với các vắc xin khác, tuy vậy khuyến cáo không tiêm vắc xin trong vòng 1 tháng trước hoặc sau khi tiêm vắc xin sống khác

Quá liều: hiện chưa có báo cáo về tình trạng quá liều xảy ra

Bảo quản

Bảo quản vắc xin ở nhiệt độ 2 - 8°C. Tránh ánh sáng.

Bảo quản dung môi ở nhiệt độ 2 – 30^{0}C, không đông đá.

Hạn sử dụng

18 tháng kể từ ngày sản xuất

Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn đăng ký số: WS-(ZB-072)-2010, Dược điển Trung Quốc (xuất bản năm 2010) quyển III.

Nhà sản xuất: Chengdu Institute of Biological Products Co., Ltd.

379, 3rd Section, Jinhua Road, Jinjiang District, Chengdu 610023 Sichuan, Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa

Không sử dụng vắc xin đã hết hạn dùng!

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ!