


CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
Lần đầu: 27/3/2017

Heber Biotec S.A.
La Habana, Cuba

Quimi-Hib®
25 VIALS / BULBOS

0,5 mL Vacuna conjugada contra el *Haemophilus in fluenzae* tipo b/
Haemophilus in fluenzae **type b conjugate vaccine**

Inyección intramuscular/ Intramuscular injection
25 bulbos x 0,5 mL / 25 Vials x 0,5 mL

Cada 0,5 mL contiene/ Each 0,5 mL contains:

Timerosal/ Thimerosal	0,025 mg
Cloruro de sodio/ Sodium Chloride	4 mg
Hidrogeno fosfato de disodio anhidro/ di-Sodium hydrogen phosphate anhydrous	0,56 mg
Dihidrogeno fosfato de sodio dihidratado/ Sodium dihydrogen phosphate dihydrate	0,62 mg

10 mcg de polisacárido conjugados a aproximadamente 25 mcg de anatoxina tetánica
10 mcg of polysaccharide conjugate to near of 25 mcg of tetanus toxoid

Lote / lot:
Fab. / Mfd.:
Vence / Exp.:

Reg. No.: B-03-150-J07
BI-04-098-E

Produced by: Center for Genetic Engineering
and Biotechnology (CIGB)
Ave. 31 e/158 y 190, Cubanacán, Playa, La Habana, Cuba

83x83x45
C.R: 51572

Rx - Thuốc bán theo đơn **Quimi-Hib®** *Hộp 25 lọ 0,5 ml. Dung dịch tiêm bắp*

Thành phần: lọ 0,5 ml chứa 10µg polysaccharid PRP cộng hợp với khoảng 26µg giải độc tố uốn ván
Số lô, NSX, HD: xem "lot", "Mfd", "Exp" trên bao bì
Bảo quản: 2-8°C, không để đông lạnh **SĐK:**
Sản xuất bởi: Center for Genetic Engineering and Biotechnology (CIGB) Ave. 31, e/158 and 190, Playa, Havana, Cuba;
Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định, các thông tin khác: xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo
DNNK: CTCP Y tế Đức Minh, số 51, ngõ 205, ngách 323/83, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Quimi-Hib® 25 BULBOS / VIALS

0,5 mL Vacuna conjugada contra el *Haemophilus in fluenzae* tipo b/
Haemophilus in fluenzae **type b conjugate vaccine**

Inyección intramuscular/ Intramuscular injection
1 Dosis/ Dose = 0,5 mL

Heber Biotec S.A.
La Habana, Cuba

INSTRUCTION:
See enclosed leaflet.

Keep out of the reach of children.

Store at 2 - 8 °C.

DO NOT FREEZE

INSTRUCCIONES:
Véase prospecto adjunto.

Mantengase alejado del alcance de los ninos.

Almacenese de 2 a 8°C.


NO CONGELAR.

01/QĐ-ĐK/B32


0,5 ml
Quimi-Hib®
Vacuna conjugada contra el
Haemophilus influenzae tipo b/
Haemophilus influenzae type b
conjugate vaccine
Heber Biotec
Produced by:
Center for Genetic Engineering
and Biotechnology
Ave. 31 e/ 158 y 190, Cubanacán, La Habana, Cuba
Inyección intramuscular/
Intramuscular injection
1 Dosis/1 Dose = 0,5 mL
Almacénese de 2 a 8°C/
Store at 2-8°C.
NO CONGELAR/
DO NOT FREEZE.
Lote/Lot:
Fab/Mfd.:
Vence/Exp.:


Produced by:
Center for Genetic Engineering
and Biotechnology (CIGB)
Ave 31 e/158 y 190,
Cubanacán, La Habana, Cuba
Rx
Quimi-Hib®
0,5 mL Haemophilus influenzae
type b conjugate vaccine
Intramuscular injection
1 Dose = 0,5 mL; 1 vial x 0.5mL
Each 0,5 mL contains:
10 µg of polysaccharide
conjugate to near of
26 µg of tetanus toxoid
Thimerosal ..... 0,025 mg
Sodium chloride ..... 4 mg
di-Sodium hydrogen phosphate
anhydrous ..... 0,56 mg
Sodium dihydrogen phosphate
dihydrate ..... 0,62 mg
Heber Biotec
Heber Biotec, S.A.
La Habana, Cuba.
Rx
Quimi-Hib®
INSTRUCCIONES:
Veáse prospecto adjunto.
Manténgase alejado
del alcance de los ninõs.
Almacénese de 2 a 8°C.
NO CONGELAR.
Producido por:
Centro de Ingeniería Genética
y Biotecnología
Ave. 31 e/ 158 y 190, Cubanacán
La Habana/ Havana, Cuba.
Rx
Quimi-Hib®
0,5 mL Vacuna conjugada contra
el Haemophilus influenzae tipo b
Inyección intramuscular
1 Dosis = 0,5 mL;1 bulbo x 0.5mL
Cada 0,5 mL contiene:
10 µg de polisacárido conjugados
a aproximadamente
26µg de anatoxina tetánica
Timerosal ..... 0,025 mg
Cloruro de sodio ..... 4 mg
Hidrógeno fosfato de disodio
anhidro ..... 0,56 mg
Dihidrógeno fosfato de sodio
dihidratado ..... 0,62 mg
Heber Biotec
Heber Biotec, S.A.
La Habana, Cuba.
Rx
Quimi-Hib®
INSTRUCTIONS :
See enclosed leaflet.
Keep out of the reach of children.
Store at 2-8°C.
DO NOT FREEZE.
Lot:
Mfd.:
Exp.:
Produced by:
Center for Genetic Engineering
and Biotechnology(CIGB)
Ave. 31 e/ 158 y 190, Cubanacán
La Habana/ Havana, Cuba.
Rx - Thuốc bán theo đơn
Hộp 1 lọ 0,5 ml
Quimi-Hib®
Dung dịch tiêm bắp
Thành phần: lọ 0,5 ml chứa 10µg polysaccharid
PRP cộng hợp với khoảng 26µg giải độc tố uốn ván
Số lô, NSX, HD: xem "lot", "Mfd", "Exp" trên bao bì
SĐK:
Bảo quản: 2-8°C, không để đông lạnh
Sản xuất bởi: Center for Genetic Engineering and
Biotechnology (CIGB)
Ave. 31, e/158 and 190, Playa, Havana, CuBa
DNNK: CTCP Y tế Đức Minh, số 51, ngõ 205,
ngách 323/83, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định, các thông tin khác: xin
đọc tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.
Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng


CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH
INSTRUCCIONES:
Vease prospedo adjunto.
Manténgase alejado del alcance de los ninõs.
Almacénese de 2 - 8°C.
NO CONGELAR.
Lot:
Fab.:
Vence.:
Producido por:
Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología
Ave. 31 e/ 158 y 190, Cubanacán
La Habana / Havana, Cuba.
Rx
Heber Biotec
Heber Biotec, S.A.
La Habana, Cuba.
Produced by:
Center for Genetic Engineering and Biotechnology (CIGB)
Ave 31 e/158 y 190,
Cubanacan Playa, Havana Cuba
Distributed by: AMV Group
AMV GROUP
Quimi-Hib®
10 vials
Haemophilus influenzae
type b conjugate vaccine
0,5 mL
1 Dose = 0,5 mL; Intramuscular injection
Each 0,5 mL contains:
10 µg of polysaccharide conjugate to near of 26 µg of tetanus toxoid
Thimerosal ..... 0,025 mg
Sodium chloride ..... 4 mg
di-Sodium hydrogen phosphate anhydrous ..... 0,56 mg
Sodium dihydrogen phosphate dihydrate ..... 0,62 mg
INSTRUCTIONS:
See enclosed leaflet.
Keep out of the reach of children.
Store at 2 - 8°C.
DO NOT FREEZE.
Lot:
Mfd.:
Exp.:
Produced by:
Center for Genetic Engineering and Biotechnology (CIGB)
Ave. 31 e/ 158 y 190, Cubanacán
La Habana / Havana, Cuba.
Rx
Heber Biotec
Heber Biotec, S.A.
La Habana, Cuba.
Quimi-Hib®
Vacuna conjugada contra el
Haemophilus influenzae tipo b
0,5 mL
1 Dosis = 0,5 mL; Inyección intramuscular
Cada 0,5 mL contains: 10 µg de polisacárido conjugados a aproximadamente 26 µg de anatoxina tetánica
Timerosal ..... 0,025 mg
Coruro de sodio ..... 4 mg
Hidrógeno fostato de disodio anhidro ..... 0,56 mg
Dihidrógeno fostato de sodio dihidratado ..... 0,62 mg
10 vials
Heber Biotec
Heber Biotec, S.A.
La Habana, Cuba.
Produced by:
Center for Genetic Engineering and Biotechnology (CIGB)
Ave 31 e/158 y 190.
Cubanacan Playa, Havana Cuba
Distributed by: AMV Group
Quimi-Hib®
Haemophilus influenzae
type b conjugate vaccine
0,5 mL
Intramuscular injection
1 Dose = 0,5 mL


Quimi-Hib®
6·25 VIALS
0,5 mL Haemophilus b conjugate vaccine
Intramuscular injection
1 Dose = 0,5 mL
Each 0,5 mL contains:
10 µg of polysaccharide conjugate to near of 26 µg of tetanus toxoid
Thimerosal 0,025 mg
Sodium chloride 4 mg
di-Sodium hydrogen phosphate anhydrous 0,56 mg
Sodium dihydrogen phosphate dihydrate 0,62 mg
Heber Biotec
Heber Biotec, S.A.
La Habana, Cuba
Producido por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología/
Produced by Center for Genetic Engineering and Biotechnology
Ave. 31 e/ 158 y 190, Cubanacán, La Habana/ Havana, Cuba
Rx - Thuốc bán theo đơn
Quimi-Hib®
Hộp chứa 6 hộp 25 lọ 0,5 ml
Dung dịch tiêm bắp
Thành phần: lọ 0,5 ml chứa 10µg polysaccharid PRP cộng hợp với khoảng 26µg giải độc tố uốn ván
Số lô, ngày sản xuất, hạn dùng: xem "lot", "Mfd", "Exp" trên bao bì
Bảo quản: 2-8°C, không để đông lạnh
SĐK:
Sản xuất bởi: Center for Genetic Engineering and Biotechnology (CIGB), Ave. 31, e/158 and 190, Playa, Havana, Cuba;
Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định, các thông tin khác: xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.
DNNK: CTCP Y tế Đức Minh, số 51, ngõ 205, ngách 323/83, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Reg. No.: B-03-150-J07
BI-04-098-E
Lote / lot:
Fab. / Mfd.:
Vence / Exp.:
255x95x85
C.R: 51573
INSTRUCTION:
See enclosed leaflet.
Keep out of the reach of children.
Store at 2-8 °C.
DO NOT FREEZE
Quimi-Hib®
6·25 BULBOS
0,5 mL Vacuna conjugada contra el Haemophilus b influenzae tipo b
Inyección intramuscular
1 Dosis = 0,5 mL
Cada 0,5 mL contiene
10 µg de polisacárido conjugados a aproximadamente
26 µg de anatoxina tetánica
Timerosal 0,025 mg
Cloruro de sodio 4 mg
Hidrógeno fosfato de disodio anhidro 0,56 mg
Dihidrógeno fosfato de sodio dihidratado 0,62mg
Heber Biotec
Heber Biotec S.A.
La Habana, Cuba
INSTRUCCIONES:
Véase prospecto adjunto.
Mantengase alejado del alcance de los ninos.
Almacenese de 2 a 8°C.
NO CONGELAR.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sỹ.

Vắc xin này thuộc nhóm thuốc kê đơn, chỉ dùng nếu có đơn của bác sỹ.

Quimi-Hib®

Vắc xin phòng viêm phổi và viêm màng não mủ do *Hemophilus influenzae* type b

1/ Thành phần:

Vắc xin liên hợp phòng *Hemophilus influenzae* type b chứa các oligosaccharide tổng hợp giống với polysaccharide vỏ ngoài tự nhiên của vi khuẩn. Oligosaccharide được cộng hợp với protein mang là giải độc tố uốn ván.

Mỗi lọ vắc xin Quimi-Hib 0,5ml chứa:

Hoạt chất: 10 µg polysaccharide polyribosylribitolphosphate cộng hợp với giải độc tố uốn ván (20,8- 31,25 µg).

Tá dược: Thiomersal: 0,025mg; sodium chloride: 4mg; sodium dihydrogen phosphate dihydrate: 0,62mg; Disodium hydrogen phosphate anhydrous 0,56mg; nước cất pha tiêm vđ 0,5 ml.

2/ Dạng bào chế

Dung dịch tiêm

3/ Đường dùng

Tiêm bắp

4/ Dược động học: không áp dụng

5/ Dược lực học – cơ chế tác dụng:

Vắc xin được sử dụng để kích thích miễn dịch chủ động đối với nhiễm khuẩn *Haemophilus influenzae* typ b (Hib) bằng cách tạo kháng thể đặc hiệu. Sự kết hợp các oligosaccharide tổng hợp giống với polysaccharide vỏ ngoài tự nhiên của vi khuẩn *Haemophilus influenzae* typ b với protein mang là giải độc tố uốn ván làm gia tăng khả năng miễn dịch, do giải độc tố uốn ván có bản chất protein đã tạo cho polysacarid hoặc oligosacarid kiểu miễn dịch phụ thuộc tuyến ức. Các kháng nguyên phụ thuộc tuyến ức gây đáp ứng miễn dịch chủ yếu là tạo IgG và khả năng tăng cường. Nghiên cứu hoạt tính chức năng của các kháng thể đặc hiệu kháng PRP do vắc xin liên hợp *Haemophilus influenzae* typ b tạo ra ở trẻ nhỏ và trẻ lớn đã chứng minh hoạt tính diệt khuẩn và thực bào qua opsonin.

6/ Chỉ định:

Tạo miễn dịch chủ động chống lại các bệnh do vi khuẩn *Hemophilus influenzae* type b gây ra cho trẻ em từ 2 tháng đến 15 tuổi.

7/ Chống chỉ định:

Không tiêm vắc xin cho đối tượng dị ứng với các thành phần của vắc xin.

Không tiêm vắc xin cho các đối tượng đang bị sốt cấp tính.

8/ Thận trọng và cảnh báo

Như mọi vắc xin khác, cần chuẩn bị sẵn adrenalin 1:1000 hoặc corticosteroids để dùng khi xảy ra các phản ứng quá mẫn.

Đối tượng tiêm chủng có các biểu hiện quá mẫn sau khi tiêm không nên nhận thêm mũi tiêm lần sau

Việc tiêm chủng cho trẻ bị suy giảm miễn dịch bẩm sinh và/hoặc mắc phải và ở trẻ đang sử dụng thuốc ức chế miễn dịch có thể cho đáp ứng hạn chế hoặc không hình thành đủ miễn dịch.

Mặc dù Quimi-Hib® có thể tạo kháng thể kháng uốn ván nhưng không thay thế được vắc xin DTP

Không tiêm vắc xin vào mạch máu cũng như tĩnh mạch.

Loại bỏ toàn bộ phần còn lại trong lọ vắc xin sau khi tiêm.

Phụ nữ có thai, cho con bú: Không sử dụng vắc xin cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú.

9/ Tương tác với các loại thuốc khác:

Quimi-Hib® có thể được tiêm đồng thời (nhưng khác vị trí tiêm) với các vắc xin phòng bạch hầu/uốn ván, bạch hầu/uốn ván/ho gà (DTP) và viêm gan B.

Khi tiêm đồng thời 2 hoặc nhiều vắc xin tại cùng vị trí giải phẫu, các vị trí tiêm cần cách nhau ít nhất 1 inch (~2,5 cm).

10/ Liều dùng và cách dùng:

Lịch tiêm chủng khuyến cáo cho trẻ dưới 1 tuổi gồm 3 liều Quimi-Hib® bắt đầu khi trẻ 2 tháng tuổi và các mũi tiếp theo cách nhau 8 tuần (2-4-6). Sau khi tiêm các mũi cơ bản, nên tiêm mũi nhắc lại cho trẻ khi trẻ 18 tháng tuổi. Có thể tiêm mũi nhắc lại cho trẻ từ 15 tháng tuổi, sau khi tiêm mũi cuối cùng trước đó ít nhất 2 tháng. Trong mọi trường hợp có thể xê dịch thời điểm tiêm trong khoảng thời gian ±7 ngày

Trẻ trên 12 tháng tuổi chưa tiêm Quimi-Hib® trong năm đầu đời chỉ cần tiêm 1 liều vắc xin.

Tiêm Quimi-Hib® vào vùng trước bên đùi cho trẻ dưới 2 tuổi và tiêm vào vùng cơ delta đối với trẻ trên 2 tuổi.

Khi sử dụng, rút 0,5 mL (1 liều) từ lọ vắc xin và tiêm bắp.

Phải chắc chắn kim tiêm không đâm vào mạch máu khi tiêm bắp

11/ Quá liều:

Hiện chưa có trường hợp quá liều nào được ghi nhận

12/ Tác dụng phụ:

Vắc xin Quimi-Hib dung nạp tốt và ít gây dị ứng. Ở trẻ sơ sinh, các phản ứng tại chỗ (đỏ, đau tại chỗ, cứng da) và phản ứng toàn thân (sốt nhẹ, sốt, dễ kích ứng , ban da, buồn nôn, nôn) có thể xảy ra. Ở trẻ lớn hơn có thể xuất hiện các phản ứng tại chỗ như đau tại nơi tiêm, ban đỏ, da cứng, ngứa và các phản ứng toàn thân như sốt, đau đầu, khó chịu, buồn nôn, nôn, mệt mỏi. Các tác dụng không mong muốn trong tất cả các trường hợp thường nhẹ và tự khỏi trong 72 giờ sau khi tiêm.

Hỏi ý kiến bác sĩ trong trường hợp có bất kỳ phản ứng nào khác với các phản ứng đã nêu ở trên.

13/ Bảo quản:

Bảo quản lọ vắc xin ở nhiệt độ từ 2-8°C, không để đông lạnh

Vắc xin cần tiêm ngay sau khi mở lọ và không dùng vắc xin khi đã quá hạn

Để vắc xin xa tầm với của trẻ em.

14/ Hạn sử dụng: 3 năm kể từ ngày sản xuất

15/ Đóng gói:

Hộp chứa 25 lọ đơn liều Quimi-Hib

Hộp chứa 1 lọ Quimi-Hib 0,5 ml

Hộp chứa 10 hộp nhỏ, mỗi hộp 1 lọ Quimi-Hib

Hộp chứa 6 hộp nhỏ, mỗi hộp có 25 lọ Quimi-Hib

16/ Nhà sản xuất:

Center for Genetic Engineering and Biotechnology (C.I.G.B)

Ave/ 31. e 158 and 190, Playa, Havana, Cuba

17/ Ngày xem xét sửa đổi, cập nhật nội dung tờ hướng dẫn sử dụng:

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

TUQ CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Thu Thủy