QĐ 196/ Đ32BS

# ComBe Five Vial Label 0.5 ml Vietnam Export

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH

## Actual size

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
Lần đầu: 30/05/2017




## Enalrged 300 %

● P 281 CVC ● P Relfex Blue C ● Black 50 x 15 mm

Each dose of 0.5 mL contains:
Diphtheria Toxoid 25 Lf (≥ 30 IU)
Tetanus Toxoid 5.5 Lf (≥ 60 IU)
B. Pertussis (Whole Cell) 16 IOU (≥ 4 IU)
r-HBsAg 12.5 µg
Purified Capsular Polysaccharide of Hib (PRP) covalently linked to 20 to 36.7 µg
of Tetanus Toxoid 11 µg
$Al^{+++}$ (as $AlPO_4$) ≤ 1.25 mg
Preservative:
Thiomersal BP/Ph.Eur 0.01% w/v.
Dose: 0.5 mL for Intramuscular Injection
Store between 2°C to 8°C
**DO NOT FREEZE**, Shake well before use
M. L. No.: 01/RR/AP/2006/V/R

Diphtheria, Tetanus, Pertussis (Whole Cell), Hepatitis B (rDNA) and *Haemophilus Influenzae* Type b Conjugate Vaccine (Adsorbed)

**ComBE Five (Liquid)**

(DTwP-rHepB-Hib)

Single Dose Vial - 0.5 mL

5721.01 ENG

Batch No.:
Mfg. Date:
Expiry Date :

Manufactured by:
*Biological E. Limited*
Plot No. 1, S.P Biotechnology Park, Phase II, Kolthur Village, Shameerpet Mandal, R. R. District- 500 078, Telangana, India.




● P 281 CVC ● P Relfex Blue C ● Black

Single Dose Vial - 0.5 mL

**ComBE Five** (Liquid)
(DTwP - rHepB - Hib)

21x21x45 mm

5722.01 ENG

Diphtheria, Tetanus, Pertussis (Whole Cell), Hepatitis B (rDNA) and *Haemophilus Influenzae* Type b Conjugate Vaccine (Adsorbed)

**ComBE Five** (Liquid)
(DTwP - rHepB - Hib)
**Single Dose Vial - 0.5 mL**

Each dose of 0.5 mL contains:

| | |
|---|---|
| Diphtheria Toxoid | 25 Lf (≥ 30 IU) |
| Tetanus Toxoid | 5.5 Lf (≥ 60 IU) |
| B. Pertussis (Whole Cell) | 16 IOU (≥ 4 IU) |
| r-HBsAg | 12.5 µg |
| Purified Capsular Polysaccharide of Hib (PRP) covalently linked to 20 to 36.7 µg of Tetanus Toxoid | 11 µg |
| Al $^{+++}$ (as $AlPO_4$) | ≤ 1.25 mg |
| Preservative: Thiomersal BP/Ph.Eur | 0.01% w/v. |

Dose: 0.5 mL for Intramuscular Injection

Store between 2°C to 8°C

**DO NOT FREEZE**

Shake well before use

M. L. No.: 01/RR/AP/2006/V/R

Diphtheria, Tetanus, Pertussis (Whole Cell), Hepatitis B (rDNA) and *Haemophilus Influenzae* Type b Conjugate Vaccine (Adsorbed)

**ComBE Five** (Liquid)
(DTwP - rHepB - Hib)
**Single Dose Vial - 0.5 mL**

Batch No. :
Mfg. Date :
Expiry Date:

Manufactured by:
***Biological E. Limited***
Plot No. 1, S.P Biotechnology Park,
Phase II, Kolthur Village,
Shameerpet Mandal,
R. R. District- 500 078,
Telangana, India.



Diphtheria,Tetanus, Pertussis (Whole Cell), 10 Vials
Hepatitis B (rDNA) and Haemophilus Influenzae
Type b Conjugate Vaccine (Adsorbed)
ComBE Five (Liquid)
(DTwP-rHepB-Hib)
Single Dose Vial - 0.5 mL
113 x 45 x 49 mm
P 281 CVC
P Relfex Blue C
Black
5723.01ENG
10 Vials
Diphtheria,Tetanus, Pertussis (Whole Cell),
Hepatitis B (rDNA) and Haemophilus Influenzae
Type b Conjugate Vaccine (Adsorbed)
ComBE Five (Liquid)
(DTwP-rHepB-Hib)
Single Dose Vial - 0.5 mL
Each dose of 0.5 mL contains:
Diphtheria Toxoid 25 Lf (≥ 30 IU)
Tetanus Toxoid 5.5 Lf (≥ 60 IU)
B. Pertussis (Whole Cell) 16 IOU (≥ 4 IU)
r-HBsAg 12.5 µg
Purified Capsular Polysaccharide of Hib (PRP) covalently linked to 20 to 36.7 µg of Tetanus Toxoid 11 µg
Al*** (as AlPO4) ≤ 1.25 mg
Preservative:
Thiomersal BP/Ph.Eur 0.01% w/v.
Dose: 0.5 mL for intramuscular Injection
Store between 2°C to 8°C
DO NOT FREEZE, Shake well before use
10 Vials
Diphtheria,Tetanus, Pertussis (Whole Cell),
Hepatitis B (rDNA) and Haemophilus Influenzae
Type b Conjugate Vaccine (Adsorbed)
ComBE Five (Liquid)
(DTwP-rHepB-Hib)
Single Dose Vial - 0.5 mL
M. L. No.: 01/RR/AP/2006/V/R
Batch No. :
Mfg. Date :
Expiry Date:
Manufactured by:
Biological E. Limited
Plot No. 1, S.P Biotechnology Park, Phase II,
Kolthur Village, Shameerpet Mandal,
R. R. District- 500 078, Telangana, India.

# SPECIMEN ARTWORKS

## Carton Front Label – Single dose (0.5 mL)

P Reflex Blue C Black


125 x 35mm




## Carton Top Label – Single dose (0.5 mL)

P Reflex Blue C Black

125 x 90mm



Each dose of 0.5 mL contains:

| | |
|---|---|
| Diphtheria Toxoid | 25 Lf (≥30 IU) |
| Tetanus Toxoid | 5.5 Lf (≥60 IU) |
| B. Pertussis (Whole Cell) | 16 IOU (≥4 IU) |
| r-HBsAg | 12.5 µg |
| Purified capsular polysaccharide of Hib (PRP) covalently linked to 20 to 36.7 µg of tetanus toxoid | 11 µg |
| $Al^{+++}$ (as $AlPO_4$) | ≤ 1. 25 mg |
| Preservative: Thiomersal BP /Ph.Eur | 0.01% w/v. |

Dose: 0.5 mL for Intramuscular Injection

Store between 2° C to 8°C

**DO NOT FREEZE**

Shake well before use

**Diphtheria, Tetanus, Pertussis (Whole Cell), Hepatitis B (rDNA) and *Haemophilus Influenzae* Type b Conjugate Vaccine (Adsorbed)**

**(DTwP-rHepB-Hib)**

**ComBE Five**

**(Liquid)**

**48 Vials x 0.5 mL**

M. L. No. : 01/RR/AP/2006/V/R

Batch No. :

Mfg. Date :

Expiry Date:

Manufactured by:

***Biological E. Limited***

Plot No. 1, S.P Biotechnology Park,
Phase II, Kolthur Village,
Shameerpet Mandal,
R. R. District - 500 078,
Telangana, INDIA.


Each dose of 0.5 mL contains:

| | |
|---|---|
| Diphtheria Toxoid | 25 Lf (≥30 IU) |
| Tetanus Toxoid | 5.5 Lf (≥60 IU) |
| B. Pertussis (Whole Cell) | 16 IOU (≥4 IU) |
| r-HBsAg | 12.5 µg |
| Purified capsular polysaccharide of Hib (PRP) covalently linked to 20 to 36.7 µg of tetanus toxoid | 11 µg |
| $Al^{+++}$ (as $AlPO_4$) | ≤ 1. 25 mg |
| Preservative: Thiomersal BP /Ph.Eur | 0.01% w/v. |

Dose: 0.5 mL for Intramuscular Injection

Store between 2° C to 8°C

**DO NOT FREEZE**

Shake well before use

**Diphtheria, Tetanus, Pertussis (Whole Cell), Hepatitis B (rDNA) and *Haemophilus Influenzae* Type b Conjugate Vaccine (Adsorbed)**

**(DTwP-rHepB-Hib)**

**ComBE Five**

**(Liquid)**

**48 Vials x 0.5 mL**

M. L. No. : 01/RR/AP/2006/V/R

Batch No. :

Mfg. Date :

Expiry Date :

Manufactured by:

***Biological E. Limited***

Plot No. 1, S.P Biotechnology Park, Phase II,
Kolthur Village, Shameerpet Mandal,
R. R. Distrct - 500 078, Telangana, INDIA.

**NHÃN PHỤ ComBE Five (Liquid)**

**Hộp 1 lọ vắc xin 0.5 ml**

*Rx - Thuốc bán theo đơn* **ComBe Five (liquid)** Hộp 1 lọ vắc xin 0,5 ml

(Vắc xin phòng bệnh Bạch hầu, Uốn ván, Ho gà, Viêm gan B và bệnh nhiễm khuẩn do *Haemophilus influenza* týp b)

Hỗn dịch tiêm bắp LẮC KỸ TRƯỚC KHI DÙNG

**Thành phần, chỉ định, cách dùng, chống chỉ định, các thông tin khác**: đề nghị xem trong tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo

**Số lô SX, NSX, HD**: xem "Batch No.", "Mfg. Date" và "Exp. Date" trên bao bì

*Ngày hết hạn là ngày cuối cùng của tháng hết hạn*

**SĐK:**

**Bảo quản**: 2-8 °C, không để đông đá

**Sản xuất tại: BIOLOGICAL E. LIMITED** Plot No. 1, S.P Biotechnology Park, Phase II, Kolthur Village, Shameerpet Mandal, Ranga Reddy District,-500 078, Telangana, Ấn Độ.

**DNNK** : CTCPYT Đức Minh, số 51 ngõ 205, ngách 323/83 Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

***Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.***

**NHÃN PHỤ ComBE Five (Liquid)**

**Hộp 10 lọ vắc xin 0.5 ml**

*Rx - Thuốc bán theo đơn* **ComBe Five (liquid)** Hộp 10 lọ vắc xin 0,5 ml
(Vắc xin phòng bệnh Bạch hầu, Uốn ván, Ho gà, Viêm gan B và bệnh nhiễm khuẩn do *Haemophilus influenza* týp b)
Hỗn dịch tiêm bắp LẮC KỸ TRƯỚC KHI DÙNG
**Thành phần:** Mỗi liều đơn vắc xin (0,5 ml) chứa:

| | |
|---|---|
| Giải độc tố bạch hầu tinh chế | 25 Lf (≥30 IU) |
| Giải độc tố uốn ván tinh chế | 5,5 Lf (≥60 IU) |
| Kháng nguyên ho gà (toàn tế bào) | 16 IOU (≥4 IU) |
| Kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B tinh chế (r-HBsAg) | 12,5 µg |
| Polysaccharide của *Haemophilus influenza* type b (PRP), liên hợp với giải độc tố uốn ván (20-36,7 µg) | 11 µg |

**Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định, các thông tin khác**: đề nghị xem trong tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo
**Số lô SX, NSX, HD**: xem "Batch No.", "Mfg. Date" và "Exp. Date" trên bao bì
*Ngày hết hạn là ngày cuối cùng của tháng hết hạn*
**SĐK:**
**Bảo quản**: 2-8 °C, không để đông đá
**Sản xuất tại**: **BIOLOGICAL E. LIMITED** Plot No. 1, S.P Biotechnology Park, Phase II, Kolthur Village, Shameerpet Mandal, Ranga Reddy District- 500 078, Telangana, Ấn Độ.
**DNNK** : CTCPYT Đức Minh, số 51 ngõ 205, ngách 323/83 Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
***Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.***

**NHÃN PHỤ ComBE Five (Liquid)**

**Hộp 48 lọ vắc xin 0.5 ml**

*Rx - Thuốc bán theo đơn* **ComBe Five (liquid)** Hộp 48 lọ vắc xin 0,5 ml
(Vắc xin phòng bệnh Bạch hầu, Uốn ván, Ho gà, Viêm gan B và bệnh nhiễm khuẩn do *Haemophilus influenza* týp b)
Hỗn dịch tiêm bắp LẮC KỸ TRƯỚC KHI DÙNG
**Thành phần:** Mỗi liều đơn vắc xin (0,5 ml) chứa:

| | |
|---|---|
| Giải độc tố bạch hầu tinh chế | 25 Lf (≥30 IU) |
| Giải độc tố uốn ván tinh chế | 5,5 Lf (≥60 IU) |
| Kháng nguyên ho gà (toàn tế bào) | 16 IOU (≥4 IU) |
| Kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B tinh chế (r-HBsAg) | 12,5 µg |
| Polysaccharide của *Haemophilus influenza* type b (PRP), liên hợp với giải độc tố uốn ván (20-36,7 µg) | 11 µg |

**Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định, các thông tin khác**: đề nghị xem trong tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo
**Số lô SX, NSX, HD**: xem "Batch No.", "Mfg. Date" và "Exp. Date" trên bao bì
*Ngày hết hạn là ngày cuối cùng của tháng hết hạn*
**SĐK:**
**Bảo quản**: 2-8 °C, không để đông đá
**Sản xuất tại**: **BIOLOGICAL E. LIMITED** Plot No. 1, S.P Biotechnology Park, Phase II, Kolthur Village, Shameerpet Mandal, Ranga Reddy District- 500 078, Telangana, Ấn Độ
**DNNK** : CTCPYT Đức Minh, số 51 ngõ 205, ngách 323/83 Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
***Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.***

*Rx- Thuốc bán theo đơn*

# ComBE Five (liquid)

(Vắc xin phòng bệnh Bạch hầu, Uốn ván, Ho gà, Viêm gan B và bệnh nhiễm khuẩn do *Haemophilus influenza* týp b)

## 1. Mô tả

ComBE Five (liquid) là vắc xin kết hợp 5 thành phần kháng nguyên Bạch hầu, Uốn ván, Ho gà, Viêm gan B tái tổ hợp, *Haemophilus influenza* týp b (DTwP – rHepB – Hib) dạng lỏng

## 2. Thành phần

Mỗi liều 0,5 ml có chứa:

| | |
|---|---|
| Giải độc tố bạch hầu tinh chế | 25 Lf (≥30 IU) |
| Giải độc tố uốn ván tinh chế | 5,5 Lf (≥60 IU) |
| Kháng nguyên ho gà (toàn tế bào) | 16 IOU (≥4 IU) |
| Kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B tinh chế (r-HBsAg) | 12,5 µg |
| Polysaccharide của *Haemophilus influenza* týp b (PRP), liên hợp với giải độc tố uốn ván (20-36,7 µg) | 11 µg |
| $Al^{+++}$ (AlPO4) | ≤ 1,25 mg |
| Thiomersal BP/ Ph.Eur | 0,01 % w/v |

## 3. Dạng bào chế:

Hỗn dịch tiêm

## 4. Qui cách đóng gói:

Lọ vắc xin 0,5 mL / 1 liều đơn, hộp chứa 1 lọ ; 10 lọ; 48 lọ

## 5. Chỉ định

Vắc xin được chỉ định để phòng các bệnh: bạch hầu, uốn ván, ho gà, viêm gan B và các bệnh nhiễm khuẩn do vi khuẩn *Haemophilus influenza* týp b ở trẻ em từ 6 tuần tuổi trở lên.

## 6. Liều dùng và cách dùng

**Lịch tiêm ngừa**

Lịch tiêm ngừa cơ bản cho trẻ em từ 6 tuần tuổi trở lên (năm đầu đời) gồm 3 liều, mỗi liều 0,5 ml tiêm bắp cách nhau ít nhất 4 tuần.

Tùy theo lịch tiêm chủng vắc xin của Quốc gia mà có thể áp dụng lịch tiêm ở 6-10-14 tuần; 2-3-4 tháng; 3-4-5 tháng hoặc 2-4-6 tháng ( theo khuyến cáo của WHO)

**Cách dùng:**

Lắc đều lọ vắc xin để tạo thành hỗn dịch đồng nhất trước khi sử dụng.

Vắc xin được dùng để tiêm bắp. Tốt nhất nên tiêm vắc xin ở mặt trước bên của đùi.

Không được trộn lẫn vắc xin này cùng với bất kỳ vắc xin nào khác trong cùng một lọ hoặc cùng một xy lanh

Không được tiêm vắc xin vào tĩnh mạch

## 7. Chống chỉ định

Không được dùng vắc xin trong trường hợp:

- Trẻ có dị ứng với bất kỳ thành phần nào của vắc xin hoặc có phản ứng nghiêm trọng sau lần tiêm vắc xin kết hợp Bạch hầu-Uốn ván-Ho gà-Viêm gan B-Hib trước.
- Trẻ đang bị sốt cao cấp tính hay bị bệnh cấp tính ( phải hoãn việc tiêm ngừa lại)
- Chống chỉ định tiêm vắc xin có chứa thành phần ho gà ở những trẻ bị co giật, động kinh hoặc có dấu hiệu bất thường trong não ở giai đoạn sơ sinh hoặc bất thường nghiêm trọng khác về thần kinh. Trong trường hợp này không dùng vắc xin ở dạng phối hợp, dùng vắc xin Bạch hầu – uốn ván thay thế vắc xin Bạch hầu – uốn ván – Ho gà, vắc xin viêm gan B và vắc xin Hib được dùng tách rời nhau. Vắc xin này không gây hại đến cá nhân đang hoặc trước đó đã bị nhiễm virus viêm gan B.

## 8. Cảnh báo đặc biệt và thận trọng khi dùng

Trước khi tiêm vắc xin, để tránh phản ứng không mong muốn, cần thực hiện biện pháp phòng ngừa. Biện pháp phòng ngừa bao gồm: xem xét tiền sử y khoa, phản ứng quá mẫn ở lần tiêm trước với bất kỳ thành phần nào của vắc xin, xem xét tình trạng sức khỏe gần đây và sau những mũi tiêm trước bởi cán bộ y tế chuyên trách.

Việc tiêm liều tiếp theo của vắc xin có chứa thành phần ho gà toàn tế bào phải được cân nhắc hết sức cẩn thận nếu quan sát thấy một hoặc nhiều dấu hiệu sau xuất hiện nhất thời và có liên quan đến việc tiêm chủng bằng vắc xin chứa thành phần ho gà:

- Sốt $\geq 40^0$C trong 48 giờ sau tiêm (mà không phải do một nguyên nhân xác định nào khác)
- Trụy mạch hay tình trạng giống như sốc với giai đoạn giảm trương lực – giảm đáp ứng ( suy nhược) trong vòng 48 giờ sau khi tiêm ngừa.
- Quấy khóc dai dẳng, khó dỗ kéo dài $\geq 3$ giờ, xảy ra trong vòng 48 giờ sau khi tiêm ngừa
- Co giật kèm theo hoặc không kèm theo sốt, xảy ra trong vòng 3 ngày sau khi tiêm ngừa

Một số trường hợp có nguy cơ mắc bệnh ho gà cao, cần cân nhắc giữa lợi ích và rủi ro có thể gây ra bởi vắc xin.

Không chống chỉ định dùng vắc xin này khi có tiền sử co giật do sốt, tiền sử gia đình về co giật, Hội chứng tử vong đột ngột ở nhũ nhi (SIDS) hoặc tiền sử gia đình có ghi nhận phản ứng bất lợi sau khi dùng vắc xin DTwP-HepB-Hib.

Suy giảm miễn dịch mắc phải do virus (HIV) không được xem là chống chỉ định với việc tiêm ngừa vắc xin DTwP-HepB-Hib. Bệnh nhân rối loạn hay suy giảm miễn dịch hoặc đang điều trị với thuốc ức chế miễn dịch có thể bị giảm khả năng đáp ứng miễn dịch của vắc xin.

Trẻ em bị giảm tiểu cầu hoặc có rối loạn đông máu phải rất thận trọng khi tiêm ngừa do nguy cơ bị chảy máu sau khi tiêm bắp.

Tương tự như tất cả vắc xin tiêm ngừa khác, trẻ sau khi tiêm vắc xin cần được theo dõi phản ứng bất lợi và điều trị thích hợp. Adrenalin 1/1000 phải luôn có sẵn để xử lý khi có phản ứng bất lợi xảy ra. Vì lý do này nên cần theo dõi trẻ tối thiểu 30 phút sau khi tiêm ngừa.

Hoãn tiêm vắc xin 5 trong 1 cho trẻ có biểu hiện sốt cao cấp tính. Tuy nhiên các trường hợp nhiễm khuẩn nhẹ không cần thiết phải hoãn việc tiêm ngừa.

Vắc xin này không có tác dụng điều trị các bệnh bạch hầu, uốn ván, ho gà, viêm gan B, nhiễm khuẩn do Hib.

**9. Tương tác thuốc**

Sử dụng thận trọng trên các bệnh nhân đang điều trị thuốc chống đông máu (do tiêm bắp). Liệu pháp ức chế miễn dịch bao gồm hóa trị liệu, xạ trị, sử dụng thuốc corticosteroid toàn thân kéo dài có thể làm giảm đáp ứng miễn dịch của cơ thể với vắc xin.

**10. Phụ nữ có thai và cho con bú**

Không áp dụng do vắc xin này chỉ dùng cho trẻ nhỏ

**11. Lái xe hoặc vận hành máy móc:** không áp dụng

**12. Tác dụng không mong muốn**

Các phản ứng bất lợi nghiêm trọng và tần suất gặp phải không khác biệt đáng kể so với khi dùng các vắc xin DPT, HepB và Hib riêng biệt.

Trong một TNLS giai đoạn III, có 35% đối tượng ghi nhận ít nhất một phản ứng bất lợi, trong đó các phản ứng tại chỗ thường gặp là đau (13%), sưng (4%) và phản ứng toàn thân là sốt (28%).

Đối với vắc xin này, hầu hết các phản ứng tại chỗ và toàn thân ở mức độ nhẹ. Phản ứng sưng, đỏ, đau tại vị trí tiêm cùng với sốt có thể gặp ở một số trường hợp. Các phản ứng nặng như sốt cao, khó chịu, quấy khóc ít gặp và thường xuất hiện trong vòng 24 giờ sau khi dùng vắc xin tương tự như các vắc xin DTwP-HepB-Hib khác. Sốc (giai đoạn nhược trương-giảm đáp ứng) đã được báo cáo. Sốt cao co giật được báo cáo với tỷ lệ 1/12.500 liều vắc xin được sử dụng. Sử dụng acetaminophen tại thời điểm đó và 4-8 tiếng sau khi tiêm làm giảm tỷ lệ các phản ứng sốt tiếp theo.

**13. Quá liều và cách xử trí**

Không có báo cáo về sử dụng quá liều

**14. Hạn dùng**

24 tháng kể từ ngày sản xuất

**15. Bảo quản**

Vắc xin phải được bảo quản và vận chuyển ở nhiệt độ 2-8$^0$C,

Không được để đông đá. Loại bỏ lọ vắc xin nếu bị đông đá

**16. Nhà sản xuất**

**BIOLOGICAL E. LIMITED**

Plot No. 1, S.P Biotechnology Park, Phase II, Kolthur Village, Shameerpet Mandal, Ranga Reddy District- 500 078, Telangana, Ấn Độ

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

TUQ CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Thu Thủy