
01 IPL 1/QD 556/A39

Biological E. Limited	Japanese Encephalitis Inactivated Vaccine (Human) (Purified Inactivated Vaccine – (Adsorbed)) JEEV® Presentation: 3 mcg/0.5 mL

SPECIMEN ARTWORKS

Vial Label – Single Pediatric dose (0.5 mL)

Actual Size



BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
Lần đầu: 18/11/2020

Magnified Size

P 4505 CVC P 161 CVC P Relfex Blue C Black 50 x 15 mm

Each 0.5 ml contains:
Purified Inactivated Japanese Encephalitis Virus Vaccine Strain (SA_{14}-14-2): 3 µg
Aluminium as Aluminium Hydroxide 0.1% w/v
Phosphate Buffer Saline q.s.

Dose: 0.5 ml for Intramuscular Injection

Store between 2°C to 8°C

Shake well before use

DO NOT FREEZE

M. L. No.: 01/RR/AP/2006/V/R

5xxx.xx ENG

JAPANESE ENCEPHALITIS
INACTIVATED VACCINE (HUMAN)
(PURIFIED INACTIVATED VACCINE - ADSORBED)

JEEV®

Single pediatric dose (3 µg - 0.5 ml)

BE


Batch No.:
Mfg. Date:
Expiry Date:

Unvarnished area
14.122 mm x 12.085 mm

Manufactured by: ***Biological E. Limited***
Plot No. 1, Biotech Park, Phase II, Kolthur Village - 500 078,
Shameerpet Mandal, Medchal-Malkajgiri District, Telangana State, INDIA.


SPECIMEN ARTWORKS

Mono Carton – Single Pediatric dose (0.5 mL)



SPECIMEN ARTWORKS

Outer Carton – Single Pediatric dose (0.5 mL)




Biological E. Limited	Japanese Encephalitis Inactivated Vaccine (Human) (Purified Inactivated Vaccine – (Adsorbed)) JEEV® Presentation: 3 mcg/0.5 mL

SPECIMEN ARTWORKS

Vial Label – Single Pediatric dose (0.5 mL)

Actual Size



Magnified Size

P 273 C P Reflex Blue C Black 50x15mm

Each dose of 0.5mL contains:
Purified Inactivated Japanese Encephalitis Virus Vaccine Strain (SA_{14}-14-2).....3 µg
Aluminium as Aluminium Hydroxide.....0.1% w/v
Phosphate Buffer Saline..... q.s.
Dosage form and Administration:
Suspension for Intramuscular Injection
Before use, read the enclosed package insert
Store between 2°C to 8°C
DO NOT FREEZE, Shake well before use
M. L. No.: 01/RR/AP/2006/V/R xxxx.xx ENG

Japanese Encephalitis Inactivated Vaccine (Human)
(Purified Inactivated Vaccine - Adsorbed)

JEEV®
0.5 mL (Single Pediatric Dose)

Unvarnished area

Batch No. :
Mfg. Date :
Expiry Date :

Manufactured by: ***Biological E. Limited***
Plot No. 1, Biotech Park, Phase II, Kolthur Village - 500 078,
Shameerpet Mandal, Medchal-Malkajgiri District, Telangana State, INDIA.


Biological E. Limited	**Japanese Encephalitis Inactivated Vaccine (Human) (Purified Inactivated Vaccine – (Adsorbed)) JEEV® Presentation: 3 mcg/0.5 mL**

SPECIMEN ARTWORKS

Carton Front Label – Single Pediatric dose (0.5 mL)

P 273 C P Reflex Blue C Black


125 x 35 mm



Carton Top Label – Single Pediatric dose (0.5 mL)

P 273 C P Reflex Blue C Black

125 x 90 mm



NHÃN PHỤ JEEV

(dán mặt bên của hộp)

Hộp 48 lọ vắc xin 0.5 ml

Rx - Thuốc bán theo đơn **JEEV(vắc xin viêm não Nhật Bản)** Hộp 48 lọ vắc xin 0,5 ml

Hỗn dịch tiêm bắp LẮC KỸ TRƯỚC KHI DÙNG

Thành phần: Mỗi lọ vắc xin (0,5 ml) chứa:

Virus viêm não Nhật bản bất hoạt, tinh khiết (chủng SA 14-14-2) 3mcg

Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định, các thông tin khác: đề nghị xem trong tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo

Số lô SX, NSX, HD: xem "Batch No.", "Mfg. Date" và "Exp. Date" trên bao bì

Ngày hết hạn là ngày cuối cùng của tháng hết hạn

SĐK:

Bảo quản: 2-8 °C, không để đông đá, tránh ánh sáng. **Tiêu chuẩn:** TCCS

Sản xuất tại: **BIOLOGICAL E. LIMITED** Plot No. 1, Biotech Park, Phase II, Kolthur Village-500 078, Shameerpet Mandal, Medchal-Malkajgiri District, Telangana State, Ấn Độ

DNNK : CTCPYT Đức Minh, số 51 ngõ 205, ngách 323/83 Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

NN 29607
BS1 - 23/10/18

Rx

JEEV (JAPANESE ENCEPHALITIS INACTIVATED VACCINE (Human))

(Vắc xin viêm não Nhật bản)

"Để xa tầm tay trẻ em"
"Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng"
" Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc"

1. **Mô tả**

Vắc xin viêm não Nhật bản JEEV là vắc xin tinh khiết, bất hoạt chứa virus viêm não Nhật bản (*Japanese encephalitis)* chủng SA 14-14-2, được nuôi cấy trên tế bào vero và bất hoạt bằng formalin.

3. **Thành phần**

Mỗi lọ vắc xin 0,5 ml chứa:

JEEV 6 mcg/0.5 ml	**JEEV 3 mcg/0.5 ml**
Thành phần dược chất	
Virus viêm não Nhật bản tinh khiết, bất hoạt qua nuôi cấy tế bào Vero (chủng SA14-14-2) 6 mcg	Virus viêm não Nhật bản tinh khiết, bất hoạt qua nuôi cấy tế bào Vero (chủng SA14-14-2) 3 mcg
Thành phần tá dược	
Aluminium Hydroxide 0.1% w/v	Aluminium Hydroxide 0.1% w/v
Đệm muối phosphate vđ 0.5 ml	Đệm muối phosphate vđ 0.5 ml

4. **Dạng bào chế:**

Hỗn dịch tiêm

5. **Chỉ định**

Vắc xin được sử dụng để tạo miễn dịch chủ động nhằm dự phòng bệnh viễm não Nhật Bản cho mọi đối tượng người lớn và trẻ em từ 1 tuổi tới 49 tuổi (từ **≥ 1 tới ≤ 49 tuổi).**

Vắc xin nên được sử dụng cho những đối tượng có nguy cơ tiếp xúc cao như đi vào vùng có dịch bệnh hoặc sống trong vùng đang có dịch bệnh lưu hành.

6. **Liều dùng và cách dùng**

Đường tiêm: tiêm bắp.

Với trẻ từ ≥ 1 tới ≤ 3 tuổi nên tiêm vào vùng trước bên đùi của trẻ hoặc tiêm vào vùng cơ delta cánh tay với trẻ ≥ 3 tuổi và người lớn.

Liều tiêm: từ ≥ 1 tuổi đến ≤ 3 tuổi tiêm liều 3mcg/0.5 ml

Từ > 3 tuổi và người lớn ≤ 49 tuổi tiêm liều 6mcg/0.5 ml

Lịch tiêm: 2 liều cơ bản tiêm

Liều thứ 1: ngày 0

Liều thứ 2: sau liều thứ nhất 28 ngày

Khuyến cáo: nếu đã tiêm mũi 1 với vắc xin JEEV thì nên tiêm mũi hai với cùng loại vắc xin này

Với người lớn (từ ≥ 18 tới ≤ 49 tuổi): nên tiêm một mũi nhắc lại sau liệu trình tiêm 2 mũi cơ bản. Mũi nhắc lại được tiêm sau mũi 2 từ 12- 14 tháng.

Đặc biệt những người có nguy cơ cao (người làm việc trong phòng thí nghiệm hoặc người sống trong vùng dịch bệnh VNNB lưu hành) nên tiêm mũi nhắc lại lúc 12 tháng sau khi tiêm mũi 2.

Cách dùng:

Lắc đều lọ vắc xin để tạo thành hỗn dịch đồng nhất trước khi sử dụng.

Vắc xin được dùng để tiêm bắp. Không được tiêm vắc xin vào tĩnh mạch.

Không được trộn lẫn vắc xin này cùng với bất kỳ vắc xin nào khác trong cùng một lọ hoặc cùng một xy lanh.

7. Chống chỉ định

Không được dùng vắc xin trong các trường hợp:

- Không tiêm vắc xin cho đối tượng dị ứng hoặc nghi ngờ dị ứng với các thành phần của vắc xin (bao gồm cả các tá dược và các chất tồn dư như protamine sulphate).

  Đối tượng tiêm chủng có các biểu hiện quá mẫn sau khi tiêm mũi 1 không nên nhận thêm mũi tiêm tiếp theo.
- Các đối tượng đang bị sốt cao cấp tính, việc tiêm ngừa cần được hoãn lại sau.
- Không tiêm vắc xin cho phụ nữ có thai và cho con bú.
- Không tiêm vắc xin cho người suy giảm miễn dịch bẩm sinh và mắc phải, nhiễm HIV.

8. Cảnh báo đặc biệt và thận trọng khi dùng

- Tương tự như tất cả vắc xin tiêm ngừa khác, đối tượng tiêm chủng sau khi tiêm vắc xin cần được theo dõi phản ứng bất lợi và điều trị thích hợp. Adrenalin 1/1000 phải luôn có sẵn để xử lý khi có phản ứng bất lợi xảy ra. Vì lý do này nên cần theo dõi trẻ tối thiểu 30 phút sau khi tiêm ngừa.
- Trong mọi trường hợp không được tiêm tĩnh mạch.
- Vắc xin này không có hiệu quả ngăn ngừa các bệnh viêm não do các vi khuẩn khác gây ra.
- Cũng như các vắc xin dùng đường tiêm bắp, không nên dùng cho trẻ em bị bệnh giảm tiểu cầu, bệnh máu khó đông hoặc rối loạn chảy máu khác.

9. Sử dụng cho phụ nữ có thai: Không nên dùng cho phụ nữ có thai vì không có đủ dữ liệu nghiên cứu về sử dụng thuốc cho đối tượng này.

Phụ nữ cho con bú: không nên dùng thuốc cho phụ nữ đang cho con bú.

10. Lái xe hoặc vận hành máy móc: Người lớn nếu gặp phải tác dụng phụ như nhức đầu, buồn ngủ thì không nên lái xe hoặc vận hành máy móc.

11. Tương tác thuốc

JEEV có thể dùng đồng thời với các vắc xin khác nhưng phải tiêm tại các vị trí khác nhau và không được trộn lẫn trong cùng một xylanh.

12. Tác dụng không mong muốn

Trong một TNLS có kiểm soát, đánh giá tính an toàn của vắc xin JEEV ở trẻ em trong độ tuổi từ ≥ 1 đến ≤ 3 tuổi, có 21% đối tượng ghi nhận ít nhất một phản ứng bất lợi. Các phản ứng này thường xảy ra trong vòng 3 ngày đầu sau khi tiêm, các phản ứng gặp phải thường ở mức độ nhẹ,

trung bình và sẽ biến mất trong vòng một vài ngày. Không có sự gia tăng các phản ứng bất lợi giữa liều đầu tiên và liều thứ 2.

Các phản ứng tại chỗ thường gặp là đau (8.5%), nhạy cảm đau (4.6%) và phản ứng toàn thân là sốt (11.1%). Một vài phản ứng khác như là sưng (3.29%), đỏ chỗ tiêm (2.63%), giảm sự thèm ăn (1,32%), buồn ngủ (1,64%), ban đỏ (1.32%).

Trong một TNLS có kiểm soát, đánh giá tính an toàn của vắc xin JEEV ở người lớn trong độ tuổi từ ≥ 18 đến ≤ 49 tuổi, có 28.7% đối tượng ghi nhận ít nhất một phản ứng bất lợi. Các phản ứng này thường xảy ra trong vòng 3 ngày đầu sau khi tiêm, các phản ứng gặp phải thường ở mức độ nhẹ, trung bình và sẽ biến mất trong vòng một vài ngày. Không có sự gia tăng các phản ứng bất lợi giữa liều đầu tiên và liều thứ 2.

Các phản ứng tại chỗ thường gặp là đau tại chỗ tiêm (13.9%), sưng (2.8%), ngứa (3.7%), ban đỏ (1.9%) và phản ứng toàn thân là sốt (7.4%), nhức đầu (0.9%).

Tổng hợp các kết quả nghiên cứu lâm sàng ghi nhận một số tác dụng phụ trên hệ cơ quan như sau:

- Phản ứng tại chỗ: đau, ngứa, sưng chỗ tiêm, quầng đỏ (0,50 – 44,44%).
- Phản ứng toàn thân: sốt (2,08 – 15,5%), đau cơ (0,1- 12,04%), đau nhức cơ thể (0,1 - < 5%).
- Hệ thần kinh trung ương và ngoại vi: chóng mặt, đau đầu, buồn ngủ, ngủ lơ mơ (0,1 - < 5%)
- Dạ dày, ruột: viêm dạ dày, nôn mửa, tiêu chảy, buồn nôn, táo bón (0,1 - < 5%)

13. Quá liều và cách xử trí

Không có báo cáo về sử dụng quá liều

14. Các dấu hiệu cần lưu ý và khuyến cáo

Lắc kỹ trước khi dùng

15. Đặc tính dược lực học :

Nhóm điều trị: vắc xin

ATC code: J07BA02

Viêm não Nhật bản là bệnh gây ra do virus viêm não Nhật bản, bệnh lây truyền sang người qua muỗi đốt. Muỗi hút máu động vật bị nhiễm virus rồi đốt người và truyền bệnh cho người. JEEV là vắc xin tinh khiết, bất hoạt qua nuôi cấy tế bào vero. Vắc xin giúp cơ thể tạo ra kháng thể trung hòa virus viêm não Nhật bản (VNNB).

Cơ chế tác dụng: cơ chế tác dụng của vắc xin chưa được biết một cách đầy đủ. Nghiên cứu trên động vật chỉ ra rằng: vắc xin kích hoạt hệ thống miễn dịch sản sinh ra kháng thể chống lại virus VNNB.

Nghiên cứu lâm sàng:

Trong một nghiên cứu pha I, tính an toàn của JEEV đã được thiết lập trên người tình nguyện khỏe mạnh và tiếp tục đi đến các nghiên cứu pha II/III. Nghiên cứu pha II đã xác định tính an toàn liều đơn trên đối tượng trẻ em Ấn Độ từ ≥ 1 tuổi đến < 3 tuổi.

Trong một nghiên cứu nhãn mở, đa trung tâm, song song, ngẫu nhiên pha II/III, đánh giá tính sinh miễn dịch của vắc xin trên trẻ em Ấn độ khỏe mạnh, cả hai giới, tuổi từ ≥ 1 đến < 3 tuổi. Đối tượng được đánh giá tính an toàn và tính sinh miễn dịch của vắc xin VNNB với liệu trình

tiêm bắp 2 liều vào ngày 0 và ngày 28 so sánh với một vắc xin VNNB bất hoạt, nuôi cấy trên não chuột, liệu trình tiêm dưới da 3 liều (ngày 0, 7, ngày 28).

Các tiêu chí nghiên cứu chính là đánh giá tỷ lệ chuyển đổi huyết thanh (PRNT 50 $\geq$ 1:10) ở cả 2 nhóm vào ngày 56 và đánh giá JEEV có hiệu quả tương đương hay không so với một vắc xin VNNB đã được cấp phép. Các kết quả nghiên cứu cho thấy GMT gia tăng từ 9.7 ở mức cơ bản tới 217.9 vào ngày 56, và đã chứng minh rằng JEEV không thua kém vắc xin đối chiếu đã được cấp phép.

Trong một nghiên cứu pha I khác, tính an toàn của JEEV đã được thiết lập ở nam giới tình nguyện khỏe mạnh. Tính sinh miễn dịch của vắc xin được tiếp tục nghiên cứu trong một nghiên cứu đa trung tâm, nhãn mở, ngẫu nhiên có kiểm soát trên đối tượng người Ấn Độ khỏe mạnh từ $\geq$ 18 đến $\leq$ 49 tuổi, nghiên cứu so sánh cùng với một vắc xin VNNB đã được cấp phép, vắc xin Ixiaro (JEEV là vắc xin được chuyển giao công nghệ từ Ixiaro). Mục tiêu của nghiên cứu là để chứng minh JEEV không thua kém so với Ixiaro. Cả 2 vắc xin đã được tiêm bắp cho đối tượng với liệu trình 2 liều (6 mcg/0.5 mL) cách nhau 28 ngày.

Các tiêu chí chính là đánh giá tỷ lệ chuyển đổi huyết thanh dựa vào số lượng và tỷ lệ phần trăm của các đối tượng có kháng thể trung hòa virus VNNB (PRNT 50 $\geq$ 1:10) tại ngày 56.

Tỷ lệ chuyển đổi huyết thanh là tương tự giữa các nhóm (99,07% với JEEV và 98,15% với Ixiaro®) và JEEV đã được chứng minh là không thua kém khi so sánh với vắc xin đã được cấp phép. Các kết quả nghiên cứu cho thấy GMT tăng từ mức cơ bản lên đến 197,29 vào ngày 56.

16. Đặc tính dược động học: Không áp dụng

17. Qui cách đóng gói:

Lọ vắc xin 0,5 mL/1 lọ, hộp chứa 1 lọ ; 10 lọ; hộp 48 lọ.

18. Điều kiện bảo quản, hạn dùng của thuốc, tiêu chuẩn chất lượng

Bảo quản

Vắc xin phải được bảo quản và vận chuyển ở nhiệt độ 2-8^{0}C,

Không được để đông đá. Loại bỏ lọ vắc xin nếu bị đông đá. Tránh ánh sáng mặt trời.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

Tiêu chuẩn: TCCS

19. Nhà sản xuất

BIOLOGICAL E. LIMITED

Plot No. 1, Biotech Park, Phase II, Kolthur Village - 500 078, Shameerpet Mandal, Medchal-Malkajgiri District, Telangana State, Ấn Độ.

CỘNG HOÀ X.H.C.N VIỆT NAM
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
BỘ Y TẾ

TL. CỤC TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Ngọc Anh