
Product: **INDIRAB®**	Name of the artwork: **Vial Label**	Market: **Export**
Artwork code: **62ANVLE.01**	Change control No:	Item code:

02/QĐ285/Đ33

M.S.D.N: 0102756236-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ AMVGROUP
BẮC TỪ LIÊM - T.P HÀ NỘI

INDIRAB® 0.5mL IM / ID Vial Label Artwork

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
Lần đầu: 26/7/2017



Vial Label Size : 50 mm x 18 mm

Composition: Each dose (0.5mL) of reconstituted vaccine contains: Vero Cell derived Purified BPL Inactivated Pitman Moore strain of Rabies Virus
Potency ..... ≥ 2.5 IU
Thiomersal BP ..... NMT 0.01% w/v
Maltose NF ..... Upto 1 immunizing dose
Human Albumin BP Upto 1 immunizing dose
Directions for Use: Reconstitute the lyophilized Vaccine with 0.5mL of the diluent supplied and Disposable syringe with needle. Use immediately after reconstitution.
Storage: Store at +2°C to +8°C,
Protect from Light. Do not Freeze.
Keep out of the reach of children.
Please read enclosed leaflet before use.
Shake well before use.

1 Dose IM / 5 Doses ID **0.5 mL**

Rabies Vaccine BP

Purified, Inactivated, Lyophilized
Rabies Vaccine, prepared on Vero Cells

INDIRAB®

Chromatographically purified for pre & post exposure immunization

For Human Use only
For Intramuscular / Intradermal use

M.L. No. 03/HD/AP/98/V/R
Manufactured & Marketed by:
Bharat Biotech International Ltd.,
Genome Valley, Shameerpet Mandal,
Ranga Reddy District - 500 078
Telangana, India.

62ANVLE.01

WARNING: To be sold by retail on the prescription of a Registered Medical Practitioner only.

B.No :
MFG :
EXP :

ZOOM

Product: **INDIRAB®**	Name of the artwork: **Mono Carton**	Market: **Export**
Artwork code: **62ANCAE.01**	Change control No:	Item code:

INDIRAB® 0.5mL IM / ID BP Mono Carton Artwork

62ANCAE.01

INDIRAB®

1 Dose IM / 5 Doses ID **0.5 mL**

Rabies Vaccine BP

Purified, Inactivated, Lyophilized
Rabies Vaccine, prepared on Vero Cells

INDIRAB®

Chromatographically purified for pre & post exposure immunization

For Human Use only
For Intramuscular / Intradermal use

Bharat Biotech
Lead Innovation

Directions for Use:
Reconstitute the lyophilized Vaccine with 0.5 mL of the diluent supplied and Disposable syringe with needle. Use immediately after reconstitution.
Storage: Store at +2°C to +8°C. Protect from Light. Do not Freeze.
Keep out of the reach of children. Please read enclosed leaflet before use.
Shake well before use.

WARNING: To be sold by retail on the prescription of a Registered Medical Practitioner only.

Composition:
Each dose (0.5mL) of reconstituted vaccine contains:
Vero Cell derived Purified BPL Inactivated Pitman Moore strain of Rabies Virus
Potency ..... ≥ 2.5 IU
Thimerosal BP ..... NMT 0.01% w/v
Marbofloxacin BP ..... Upto 1 immunizing dose
Human Albumin BP Upto 1 immunizing dose
Each 0.5 mL Diluent ampoule contains :
Sodium Chloride IP ..... 1.5 mg
Water for Injections IP ..... q.s to 0.5mL

Mono Carton Size : 70mm x 22mm x 90mm

1 Dose IM / 5 Doses ID **0.5 mL**

Rabies Vaccine BP

Purified, Inactivated, Lyophilized
Rabies Vaccine, prepared on Vero Cells

INDIRAB®

Chromatographically purified for pre & post exposure immunization

For Human Use only
For Intramuscular / Intradermal use

Bharat Biotech
Lead Innovation

FOR VACCINE
Batch No. :
Mfg. Date :
Exp. Date :

FOR DILUENT
Batch No. :
Mfg. Date :
Exp. Date :

M.L. No. 03HD/AP/96/VR
Manufactured & Marketed by
Bharat Biotech
Lead Innovation
Bharat Biotech International Ltd.,
Genome Valley, Shameerpet Mandal,
Ranga Reddy District - 500 078
Telangana State, INDIA

M.S.D.N: 0102756236 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ AMVGROUP
P. BẮC TỪ LIÊM - T.P HÀ NỘI

INDIRAB®

INDIRAB®

Multi Pack of
10 vials of INDIRAB &
10 Ampoules of 0.5 mL Diluent

Rabies Vaccine BP

Purified, Inactivated, Lyophilized Rabies Vaccine, prepared on Vero Cells

INDIRAB®

Chromatographically purified for pre & post exposure immunization

For Human Use only
For Intramuscular use

Bharat Biotech
Lead Innovation

Carton Size: 205mm x 24mm x 123mm; Side Tuck

INDIRAB®

INDIRAB®

Rabies Vaccine BP

M.L. No. 03/HD/AP/98/V/R

FOR DILUENT
Batch No.:
Mfg. Date:
Exp.Date :

FOR VACCINE
Batch No. :
Mfg. Date :
Exp. Date :

Composition:
On reconstitution each vial of (0.5 mL) lyophilized vaccine contains:
Purified BPL Inactivated Rabies virus
(Prepared on Vero cells, Pitman-Moore Strain of Rabies virus) ≥ 2.5 IU
Thiomersal (as preservative) BP : 0.01%
Maltose: up to 1 immunizing dose
Human Albumin BP: up to 1 immunizing dose

Diluent Composition:
Each 0.5ml Contains:
Sodium Chloride IP 1.5mg
Water for Injection IP qs to 0.5 mL.

Directions for Use and Administration:
Reconstitute the Lyophilized Vaccine with 0.5 mL of the Diluent supplied and Disposable Syringe with needle. Use immediately after reconstitution.
For Intramuscular Injection use entire Reconstituted Vaccine volume of 0.5 mL as Single Human Dose.

Storage: Store at +2C to +8C. Protect from Light. Do not Freeze.
Keep out of the reach of children. Please read enclosed leaflet before use.

WARNING: To be sold by retail on the prescription of a Registered Medical Practitioner only.

Manufactured & Marketed by
Bharat Biotech
Lead Innovation
Bharat Biotech International Ltd.,
Genome Valley, Shameerpet Mandal,
Ranga Reddy Distrct - 500 078
Telangana State, INDIA

62AM3PE00

INDIRAB®

Product: INDIRAB®	Name of the artwork:Diluent Label	Market: Domestic / Export
Artwork code: 62AZDL.04	Change control No:	Item code:

INDIRAB® 0.5mL Diluent Label Artwork



Composition
Each 0.5 mL contains:
Sodium Chloride I.P. .....1.5 mg
Water for Injections I.P. ..0.5 mL
Use as a Diluent for
Reconstitution of **INDIRAB®**
Injection
Do not use if any
Particulate matter is seen.
Do not Freeze.
Not for Sale as a Single Unit.

B.No. :
Mfg. Date :
Exp. Date :

0.5 mL

Diluent for
INDIRAB®
Injection

M.L No. DD/L/535
Manufactured by
Bharat Biotech
Lead Innovation
Bharat Biotech International Ltd.
Survey No. 46/1-4, Kadaiya Village,
Nani Daman-396210
Regd.off: Genome Valley,
Shameerpet Mandal,
Ranga Reddy District - 500 078,
Telangana, India.

62AZDL.04

Label Size : 32 mm x 20 mm

ZOOM

Date:	02-11-2016	INDIRAB® 0.5 mL Diluent Label Artwork							Colors CMYK/Pantone
Specs	Product	Size	Presentation	Paper	GSM	Sticker			100 % PANTONE 021 U 100% Pantone Cool Gray 9 C K100 100% Pantone 3275 C 100% Pantone 485 C 100% Pantone 641 C
	INDIRAB®	32 x 20 mm	0.5 mL	Super Chromo	80±10	Self Adhesive			
Approval	QA - RA	Corp comm	Packing Incharge	HOD - QC	HOD Production	Marketing (Domestic / Export)	MDA	HOD - QAO	
Signature									

NHÃN PHỤ INDIRAB

Hộp 10 lọ vắc xin đông khô kèm 10 ống dung môi hoàn nguyên

Rx - Thuốc bán theo đơn **INDIRAB - Vắc xin Dại bất hoạt tinh chế trên tế bào Vero**
Vắc xin đông khô dùng tiêm bắp/ tiêm trong da
Hộp 10 lọ vắc xin đông khô kèm 10 ống dung môi hoàn nguyên (0,5 ml)
Thành phần: vắc xin dại 1 liều

- Lọ vắc xin đông khô liều miễn dịch đơn (0,5 ml) có chứa:

Virus dại bất hoạt (chủng Pitman Moore được nhân giống trên tế bào Vero, bất hoạt bằng beta-propiolactone), hoạt lực ≥ 2.5 UI

- Dung môi hoàn nguyên vắc xin: Natri cloride 0.3% (w/v) 0,5 ml

Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định, các thông tin khác:
Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo
Số lô, NSX, HD: xem "Batch No.", "Mfg. Date" và "Exp. Date"
SĐK:
Bảo quản: 2-8 °C, không để đông đá, tránh ánh sáng.
Sản xuất bởi: BHARAT BIOTECH INTERNATIONAL LIMITED
Genome Valley, Shameerpet Mandal, Ranga Reddy District- 500 078, Telangana State, INDIA
DNNK : CTCPYT Đức Minh, số 51 ngõ 205, ngách 323/83 Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

NHÃN PHỤ INDIRAB

Hộp 1 lọ vắc xin đông khô + 1 ống dung môi hoàn nguyên, 1 xylanh

Rx - Thuốc bán theo đơn **INDIRAB - Vắc xin Dại bất hoạt tinh chế trên tế bào Vero**
Vắc xin đông khô dùng tiêm bắp/ tiêm trong da
Hộp 1 lọ vắc xin đông khô đơn liều, 1 ống dung môi hoàn nguyên vắc xin (0.5 ml), 1 xylanh
Thành phần: liều đơn vắc xin chứa virus Dại bất hoạt (chủng Pitman Moore được nhân giống trên tế bào Vero, bất hoạt bằng beta-propiolactone), hoạt lực ≥ 2.5 UI
Dung môi hoàn nguyên vắc xin: Natri cloride 0.3% (w/v) 0,5 ml
Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và các thông tin khác: xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng
Số lô, NSX, HD: xem "Batch No.", "Mfg. Date" và "Exp. Date"
Bảo quản: 2-8 °C, không để đông đá, tránh ánh sáng.
Sản xuất bởi: BHARAT BIOTECH INTERNATIONAL LIMITED
Genome Valley, Shameerpet Mandal, Ranga Reddy District- 500 078, Telangana State, India
DNNK : CTCPYT Đức Minh, số 51 ngõ 205, ngách 323/83 Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Rx

INDIRAB

VẮC XIN DẠI TẾ BÀO VERO TINH CHẾ

Thành phần trong mỗi liều đơn:

Vắc xin đông khô liều miễn dịch đơn có chứa hoạt tính bảo vệ tương đương hoặc lớn hơn 2.5 đơn vị Quốc tế (UI).

Virus dại (chủng Pitman Moore) bất hoạt bằng beta-propiolactone, được nhân giống trên tế bào Vero.

Thiomersal 0.01% có vai trò là chất bảo quản.

Maltose……vừa đủ cho mỗi liều miễn dịch

Human Serum Albumin…….vừa đủ cho mỗi liều miễn dịch

Thành phần trong ống dung môi hoàn nguyên:

Natri cloride 0.3% (w/v) .....0,5 ml

Dạng bào chế: bột đông khô pha tiêm

Chỉ định:

- Tạo miễn dịch chủ động chống lại virus dại để dự phòng và điều trị sau khi phơi nhiễm cho người ở tất cả các lứa tuổi.
- Để tạo miễn dịch chủ động chống lại virus dại sau khi phơi nhiễm (sau khi tiếp xúc với con vật bị dại hoặc nghi ngờ bị dại). Xem bảng 1 theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới.
- Để tạo miễn dịch dự phòng của những nhóm đối tượng có nguy cơ cao như bác sỹ thú y, nhân viên y tế, nhân viên làm việc trong rừng hoặc sở thú, thợ săn, nhân viên phòng thí nghiệm có tiếp xúc với nguyên liệu có nghi ngờ mang virus dại, người có vật nuôi trong nhà, người đến vùng có dịch bệnh dại của súc vật.

Cách dùng và liều dùng:

Cách dùng: Hoàn nguyên vắc xin bằng cách bơm dung dịch pha loãng vào lọ bột và lắc thật kỹ đến khi bột trong lọ tan hoàn toàn. Dung dịch sau khi hoàn nguyên phải đồng nhất, trong và không có cặn. Rút dung dịch này vào xylanh.

Phải tiêm vắc xin ngay sau khi hoàn nguyên và phải hủy xylanh, kim tiêm sau khi sử dụng.

Đường tiêm:

Tiêm bắp (IM): người lớn tiêm ở vùng cơ Delta cánh tay, trẻ em tiêm ở mặt trước bên đùi. Không tiêm vào vùng mông.

Tiêm trong da (ID): tiêm ở cẳng tay hoặc cánh tay.

Liều dùng:

Một liều tiêm bắp (IM) là 0,5mL vắc xin đã hoàn nguyên.

Một liều tiêm trong da (ID) là 0,1mL vắc xin đã hoàn nguyên, nghĩa là bằng 1/5 liều tiêm bắp.

Phác đồ tiêm vắc xin nên được áp dụng theo tình huống tiêm vắc xin và tình trạng miễn dịch đối với bệnh dại của người tiêm.

Tiêm dự phòng hay tiêm trước phơi nhiễm:

- Tiêm ngừa cơ bản: tiêm bắp 3 liều (0,5mL/ liều) vào Ngày 0, Ngày 7, Ngày 28.
- Tiêm nhắc: 1 năm sau.
- Các mũi tiêm nhắc sau: cách 5 năm.

Tiêm vắc xin "điều trị" (dự phòng bệnh dại sau khi xác định hay theo dõi phơi nhiễm):

Sau khi được xác định hoặc nghi ngờ tiếp xúc, việc tiêm vắc xin phải được tiến hành ngay. Việc điều trị được tiến hành tùy theo tình trạng của vết thương, vết tiếp xúc và tình trạng của động vật

Điều trị sơ cấp cứu:

Việc điều trị vết thương rất quan trọng và phải được thực hiện ngay sau khi bị cắn. Đầu tiên, phải rửa vết thương với thật nhiều nước và xà phòng hay thuốc làm sạch vết thương, sau đó bôi cồn 70° hoặc cồn iod.

Vắc xin điều trị phải được thực hiện dưới sự giám sát y khoa.

Phác đồ tiêm bắp:

Tiêm vắc xin ở người chưa tiêm dự phòng:

Người lớn và trẻ em dùng cùng 1 liều: tiêm 5 mũi, mỗi mũi tiêm 0,5mL vào Ngày 0, Ngày 3, Ngày 7, Ngày 14, Ngày 28

Trong trường hợp phơi nhiễm độ III (xem Bảng 1), phải tiêm Immunoglobulin dại, kết hợp với vắc xin. Tạo miễn dịch thụ động bổ xung vào Ngày 0 được yêu cầu với:

- Immunoglobulin dại có nguồn gốc từ người (HRI): 20 IU/ kg cân nặng cơ thể.
- Immunoglobulin dại có nguồn gốc từ ngựa: 40 IU/ kg cân nặng cơ thể.

Tiêm vắc xin và immunoglobulin kháng dại bằng hai bơm tiêm riêng rẽ và tiêm ở các vị trí khác nhau.

Trong vùng có dịch bệnh ở súc vật, độ nặng của một vài trường hợp phơi nhiễm tuỳ thuộc vào độ nặng của vết thương và/ hoặc vị trí vết thương (gần hệ thần kinh trung ương), đến khám trễ hay tình trạng suy giảm miễn dịch của cá nhân, mà có thể thay đổi, tuỳ trường hợp, tiêm 2 mũi vào Ngày 0.

Tiêm vắc xin ở người đã tiêm dự phòng (và có sổ tiêm ngừa để biết chắc chắn lịch tiêm ngừa trước đây):

Tiêm vắc xin trong vòng 5 năm trở lại đây (vắc xin dại loại nuôi cấy trên tế bào): 2 mũi tiêm vào Ngày 0 và Ngày 3.

Tiêm vắc xin đã hơn 5 năm hay tiêm không đầy đủ, bệnh nhân được xem như trường hợp không chắc chắn có chủng ngừa.

Phác đồ tiêm trong da:

Đối với tiêm ngừa sau phơi nhiễm, Tổ chức Y tế Thế Giới công nhận hiệu lực của việc tiêm vắc xin dại bằng đường tiêm trong da (ID). Nếu Indirab được tiêm trong da, các hướng dẫn và thận trọng sau cần được tôn trọng triệt để.

Một liều tiêm trong da là 0,1 ml vắc xin hoàn nguyên, nghĩa là bằng 1/5 liều tiêm bắp.

Tiêm vắc xin ở người chưa tiêm dự phòng:

Phác đồ "2-2-2-0-2" được khuyên dùng:

- Hai mũi tiêm trong da, mỗi mũi 0,1 ml tại hai vị trí khác nhau vào Ngày 0, Ngày 3, Ngày 7, Ngày 28.

Tiêm vắc xin ở người đã tiêm dự phòng:

Tiêm nhắc khẩn cấp: 0,1 ml vào Ngày 0 và Ngày 3.

Chống chỉ định:

Trường hợp trước phơi nhiễm:

+ Sốt nhiễm trùng nặng, bệnh cấp tính, đợt tiến triển của bệnh mạn tính.

+ Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của vắc xin.

Trường hợp sau phơi nhiễm:

Bệnh dại là bệnh rất nguy hiểm, do vậy không có chống chỉ định nào trong trường hợp điều trị sau phơi nhiễm.

Tương tác:

Không có sự tương tác với các chế phẩm khác. Tuy nhiên không sử dụng đồng thời các thuốc ức chế miễn dịch như corticosteroid vì những thuốc này có thể cản trở quá trình sinh kháng thể bảo vệ, làm mất tác dụng của vắc xin.

Tác dụng phụ:

Các tác dụng phụ nhẹ tại chỗ tiêm và toàn thân như: đau tại chỗ tiêm, ngứa, sốt, chóng mặt đau đầu, đau khớp, đau cơ, các rối loạn dạ dày, ruột non (nôn, đau bụng)… nói chung ít gặp. Hiếm hơn nữa là các phản ứng sốc phản vệ, mày đay.

Các kết quả nghiên cứu lâm sàng ghi nhận, một số tác dụng phụ trên hệ cơ quan như sau:

- Phản ứng tại chỗ: đau, ngứa chỗ tiêm, quầng đỏ (2,60 – 27.94%)
- Phản ứng toàn thân: sốt (1,4 – 9,0%), đau cơ, đau khớp (0,1 - < 5%)
- Hệ thần kinh trung ương và ngoại vi: chóng mặt, đau đầu (0,1 - < 5%)
- Dạ dày, ruột: viêm dạ dày, nôn mửa, tiêu chảy, buồn nôn (0,1 - < 5%)

Quá liều và cách xử trí:

Chưa có báo cáo về quá liều. Trong trường hợp tiếp xúc với mắt, lập tức rửa mắt với nhiều nước trong ít nhất 15 phút và tới ngay cơ sở y tế.

Thời kỳ mang thai và cho con bú:

Hiện chưa có đầy đủ dữ liệu về việc sử dụng ở phụ nữ có thai và cho con bú và chưa có nghiên cứu đầy đủ về ảnh hưởng của vắc xin trên khả năng sinh sản. Khuyến cáo hoãn việc tiêm phòng ngừa trước khi phơi nhiễm. Đối với việc tiêm vắc xin sau khi phơi nhiễm, do bệnh dại là bệnh nguy hiểm nên thời kỳ mang thai không phải là một trường hợp chống chỉ định.

Trong thời kỳ mang thai và cho con bú, nên hỏi ý kiến bác sĩ của bạn trước khi sử dụng vắc xin.

Tác dụng đối với khả năng lái xe và vận hành máy móc:

Nếu đối tượng tiêm chủng gặp phải tác dụng phụ như đau đầu, chóng mặt thì không nên lái xe hoặc vận hành máy móc.

Thận trọng:

1. Không sử dụng đồng thời các thuốc ức chế miễn dịch như corticosteroid vì những thuốc này có thể cản trở quá trình sinh kháng thể bảo vệ.
2. Trì hoãn việc bắt đầu điều trị sau phơi nhiễm, điều trị không triệt để hay không thường xuyên có thể làm cho việc bảo vệ bị thất bại.

Chú ý đặc biệt:

Việc tiêm trong da phải do nhân viên y tế đã được đào tạo về kỹ thuật tiêm này thực hiện để đảm bảo vắc xin được tiêm trong da, không phải tiêm dưới da. Tiêm trong da đúng kỹ thuật sẽ tạo nên một "nốt phồng da cam". Nếu vắc xin được tiêm sâu quá thì sẽ không thấy nốt sần này, phải rút kim ra và tiêm lại ở một vị trí gần đó.

Không tiêm vào mạch máu, phải chắc chắn mũi kim không đâm vào mạch máu.

Thông tin bổ sung

Vết thương không nên khâu trong vòng 7 ngày nhưng trong bất kỳ trường hợp nào, nên dùng immunoglobulin kháng dại trước khi khâu vết thương. Có thể sử dụng kháng sinh để chống nhiễm trùng và tiêm phòng uốn ván nếu cần thiết. Trong trường hợp vết thương nặng (mức độ III), tiêm nửa liều immunoglobulin kháng dại vào vùng cơ mông và nửa liều còn lại nên tiêm sâu vào vết thương và vùng xung quanh vết thương. Phải xác định tính nhạy cảm với immunoglobulin (nguồn gốc từ ngựa) trước khi tiêm. Immunoglobulin kháng dại không được tiêm nhiều hơn một lần hoặc tiêm nhiều hơn liều chỉ định vì có thể dẫn tới sự cản trở sản sinh kháng thể sau khi tiêm.

Bảo quản:

Bảo quản ở nhiệt độ 2-8 ^{o}C, tránh đông đá, tránh ánh sáng.

Hạn dùng: vắc xin đông khô: 3 năm kể từ ngày sản xuất

ống dung môi hoàn nguyên: 4 năm kể từ ngày sản xuất

Quy cách đóng gói:

- Hộp 1 lọ vắc xin đông khô kèm 1 ống dung môi hoàn nguyên và 1 xylanh vô trùng.
- Hộp 10 lọ vắc xin đông khô + 10 ống dung môi hoàn nguyên

Nhà sản xuất: Bharat Biotech International Limited

Genome Valley, Shameerpet Mandal, Ranga Reddy District – 500 078, Telangana State, India.

Bảng 1. Hướng dẫn điều trị sau khi phơi nhiễm (Khuyến cáo của Tổ chức y tế Thế giới WHO)

Phân loại	Loại tiếp xúc với con vật nghi ngờ bị dại hoặc đã xác định là bị bệnh dại	Điều trị nên áp dụng
I	Tiếp xúc hoặc cho súc vật ăn. Súc vật liếm trên da lành.	Không điều trị nếu có bệnh sử đáng tin cậy
II	Gặm vùng da trần, bị xước nhẹ hoặc xước không bị chảy máu, liếm trên vùng da bị trầy xước.	Tiêm vắc xin ngay lập tức. Ngưng điều trị nếu súc vật vẫn khoẻ mạnh trong thời gian 10 ngày hoặc bị giết và có âm tính với virus dại khi xét nghiệm bằng phương pháp thích hợp
III	Một hoặc nhiều vết cắn qua da hoặc vết xước bị nhiễm nước dãi (liếm)	Sử dụng Globulins miễn dịch và tiêm vắc xin ngay lập tức. Ngưng điều trị nếu như súc vật vẫn khoẻ mạnh khi được quan sát trong 10 ngày hoặc nếu súc vật bị giết và âm tính với virus dại khi xét nghiệm bằng kỹ thuật thích hợp.

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

TUQ CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Thu Thủy