
SĐT:01/464/18-QLD;/GLVX-1047-17/ĐĐ1 24
24/10/2017

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
Lần đầu: 24../..10..../..2017...




Thời điểm/Specifications: TCCS/Manufacturer's
SĐK (Reg.No):
8.4 cm
3.5 cm
VẮC XIN THƯƠNG HÀN Vi POLYSACCHARIDE
Vắc xin phòng bệnh Thương hàn cho người lớn và trẻ em trên 2 tuổi
Dung dịch tiêm bắp hoặc dưới da. Lắc đều trước khi tiêm.
Bảo quản: 2°C - 8°C. Không làm đông băng.
Để xa tầm với của trẻ em.
Các thông tin khác xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.
0,5 ml/lọ - 1 liều
10 lọ/hộp - 10 liều
CÔNG TY TNHH MTV VẮC XIN PASTEUR ĐÀ LẠT
18 Lê Hồng Phong, Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
ĐT: (063) 3836613 - Fax: (063) 3827773
Website: www.davac.com.vn
0,5 ml/liều
Một liều tiêm 0,5ml chứa:
- Vi Polysaccharide tinh khiết (từ chủng Salmonella typhi Ty2) 0,025mg
- Phenol ..... tối đa 1,25mg
- Sodium chloride 4,15mg
- Disodium hydrogen photphate 0,0515mg
- Sodium dihydrogen photphate dihydrate..... 0,023mg
- Nước pha tiêm vô khuẩn ..... vừa đủ 0,5ml
Số lô sản xuất (Lot):
Ngày SX (Mfd.) :
Hạn dùng (Exp.) :
M.S.D.N: 5800578624 - C.T.T.N.H.H
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VẮC XIN PASTEUR ĐÀ LẠT
ĐÀ LẠT - T. LÂM ĐỒNG
TYPHOID Vi POLYSACCHARIDE VACCI
To prevent Typhoid fever in adults and in the children over 2 years of age
Intramuscular or subcutaneous route. Shake well before use
Store at: 2°C - 8°C. Do not freeze
Keep out of the reach of children
See enclosed leaflet
0,5 ml/vial - 1 dose
10 vials/box - 10 doses
VACCINE COMPANY LIMITED OF DALAT PASTEUR
18 Le Hong Phong St., Da Lat, Lam Dong, Viet Nam
Tel: (+84-63) 3836613 - Fax: (+84-63) 3827773
Website: www.davac.com.vn
0,5 ml/dose
Each dose 0.5 ml contains:
- Purified Vi Polysaccharide (from Salmonella typhi Ty2 strain) 0,025mg
- Phenol ..... maximum 1,25mg
- Sodium chloride 4,15mg
- Disodium hydrogen phosphate 0,0515mg
- Sodium dihydrogen phosphate dihydrate 0,023mg
- WFI ..... q.s.p 0,5ml

68 mm

25 mm

DAVAC

Typhoid Vi Polysaccharide vaccine
Vial: 10 ml; 1 dose - 0.5 ml
Intramuscular or subcutaneous route
Store at: 2°C - 8°C
Do not freeze
Keep out of the reach of children
See enclosed leaflet

Vắc xin thương hàn Vi Polysaccharide
Vi Polysaccharide tinh khiết (từ chủng *Salmonella typhi* Ty2).....0,025mg
Phenol.....tối đa 1,25mg
Dung dịch đệm đẳng trương.....vừa đủ 0,5ml
Lọ: 10ml; 1 liều - 0,5ml
Dung dịch tiêm bắp hoặc dưới da
Bảo quản: 2°C - 8°C. Không làm đông băng
Để xa tầm với của trẻ em
Các thông tin khác xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo

Số lô sản xuất (Lot.): .. .. ..
Ngày SX (Mfd.)
Hạn dùng (Exp.)
SĐK (Reg.No)

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VẮC XIN PASTEUR ĐÀ LẠT - T. LÂM ĐỒNG * M.S.D.N: 5800578624 - C.T.T.N.H.H * P. ĐA LẠT - T. LÂM ĐỒNG

51 mm

18 mm

DAVAC

Typhoid Vi Polysaccharide vaccine
Vial: 0.5 ml - 1 dose
Intramuscular or subcutaneous route
Store at: 2°C - 8°C
Do not freeze
Keep out of the reach of children
See enclosed leaflet.

Vắc xin thương hàn Vi Polysaccharide
Vi Polysaccharide tinh khiết (từ chủng *Salmonella typhi* Ty2).....0,025mg
Phenol .....tối đa 1,25mg
Dung dịch đệm đẳng trương.....vừa đủ 0,5ml
Lọ: 0,5ml - 1 liều
Dung dịch tiêm bắp hoặc dưới da
Bảo quản: 2°C - 8°C. Không làm đông băng
Để xa tầm với của trẻ em
Các thông tin khác xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo

Số lô sản xuất (Lot.): .. .. ..
Ngày SX (Mfd.)
Hạn dùng (Exp.)
SĐK (Reg.No)

10 cm

18.5 cm

DAVAC
GMP - WHO
ISO 9001:2008

CÔNG TY TNHH MTV VẮC XIN PASTEUR ĐÀ LẠT
18 Lê Hồng Phong, Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
ĐT: (063) 3836613 - Fax: (063) 3827773
Website: www.davac.com.vn

M.S.D.N: 5800578824 - C.T.T.N.H.H
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VẮC XIN PASTEUR ĐÀ LẠT
ĐÀ LẠT - T. LÂM

DAVAC
GMP - WHO
ISO 9001:2008

LIMITED COMPANY LIMITED OF DALAT PASTEUR
Tel: (063) 3836613 - Fax: (063) 3827773
Website: www.davac.com.vn

VẮC XIN THƯƠNG HÀN Vi POLYSACCHARIDE

GIỚI THIỆU

Vắc xin Thương hàn Vi Polysaccharide được sản xuất trên dây chuyền công nghệ sinh học, tinh chế từ vỏ vi khuẩn Thương hàn Salmonella typhi Ty2, có độ tinh khiết cao và được bảo quản bằng phênol.

THÀNH PHẦN Một liều tiêm 0,5ml chứa:

- Vi Polysaccharide tinh khiết (từ chủng *Salmonella typhi* Ty2) 0,025mg
- Phenol ..... tối đa 1,25mg
- Sodium chloride..... 4,15mg
- Disodium hydrogen phosphate 0,0515mg
- Sodium dihydrogen phosphate dihydrate 0,023mg
- Nước pha tiêm vô khuẩn ..... vừa đủ 0,5ml

CHỈ ĐỊNH

- Vắc xin dùng để gây miễn dịch chủ động phòng bệnh Thương hàn cho người lớn và trẻ em trên 2 tuổi.
- Vắc xin này cũng được khuyến dùng cho những người đi du lịch vào vùng có bệnh lưu hành, nhân viên y tế phải lấy bệnh phẩm nghi ngờ nhiễm bệnh, nhân viên chăm sóc sức khỏe, những người di trú và nhân viên quân đội.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Không dùng vắc xin này cho những trường hợp có tiền sử dị ứng với một trong các thành phần của vắc xin.
- Trường hợp sốt, bệnh cấp tính hay đợt cấp của bệnh mãn tính nên hoãn việc tiêm vắc xin lại.
- Nếu có thắc mắc phải hỏi ý kiến bác sĩ hay dược sĩ.

THẬN TRỌNG KHI SỬ DỤNG

- Vắc xin này không được tiêm trực tiếp vào mạch máu.
- Vắc xin này bảo vệ cơ thể chống lại vi khuẩn Thương hàn *Salmonella typhi* nhưng không chống lại vi khuẩn *Salmonella paratyphi* A hay B.
- Vắc xin này không chỉ định dùng cho trẻ em dưới 2 tuổi vì không có hiệu quả bảo vệ.
- Trong khi mang thai hay cho con bú, chỉ được sử dụng vắc xin này khi có ý kiến bác sĩ.

TƯƠNG TÁC THUỐC VÀ TƯƠNG TÁC KHÁC

- Để tránh các phản ứng có thể có giữa các loại dược phẩm, cần báo với bác sĩ hay dược sĩ về các điều trị mà mình đang sử dụng.
- Vắc xin này có thể được tiêm cùng lúc với các vắc xin khác (viêm gan siêu vi A, B, sốt vàng, bạch hầu, uốn ván, bại liệt, dại, viêm màng não do não mô cầu nhóm A và C) trong cùng một đợt chủng ngừa.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

- Tiêm một liều duy nhất 0,5ml.
- Việc tiêm nhắc lại cần được thực hiện mỗi 3 năm nếu đối tượng tiếp tục có nguy cơ nhiễm bệnh.
- Trẻ em và người lớn áp dụng cùng một lịch tiêm.

CÁCH TIÊM VÀ ĐƯỜNG TIÊM

- Tiêm bắp hoặc tiêm dưới da.
- Việc chiết một hay nhiều liều vắc xin từ một lọ đa liều phụ thuộc chủ yếu vào kỹ thuật.
- Lắc kỹ lọ thuốc trước khi sử dụng, tránh tạo bọt nhưng đủ để đạt được một hỗn dịch đồng nhất.
- Tẩy trùng nắp lọ vắc xin trước, dùng bơm và kim tiêm vô trùng rút 1 liều từ lọ đa liều. Thực hiện thao tác tương tự với các liều còn lại. Trong bất cứ trường hợp nào, giữa các lần ngưng thao tác chiết thuốc ra trong vòng 5 phút sau lần chiết thuốc sau cùng, lọ thuốc phải được giữ ở nhiệt độ bảo quản +20C đến +80C. (Không được để trong ngăn đông lạnh).
- Trách nhiệm pháp lý của nhà sản xuất là phải đảm bảo sản phẩm cho đến khi nó được sử dụng.
- Kỹ thuật của người thao tác chiết từng liều vắc xin có thể ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm đóng gói dạng lọ đa liều.

Vì lý do này, nhà sản xuất không chịu trách nhiệm cho các sản phẩm đã quá 24 giờ kể từ khi thao tác chiết liều đầu tiên, trừ khi lọ thuốc được bảo quản đúng theo những yêu cầu của nhà sản xuất.

TÁC DỤNG PHỤ

- Các phản ứng phụ sau khi tiêm vắc xin thường nhẹ và tồn tại trong thời gian ngắn. Chủ yếu là phản ứng phụ tại nơi tiêm vắc xin (đau, sưng, quầng đỏ). Phản ứng toàn thân sốt, nhức đầu, ngất, đau cơ, đau khớp, buồn nôn đau bụng hiếm gặp hơn.
- Rất hiếm trường hợp có phản ứng kiểu dị ứng (ngứa, ban đỏ, mày đay).
- Hãy báo ngay với bác sĩ hay dược sĩ về bất cứ một ảnh hưởng không mong đợi hay khó chịu nào chưa được đề cập đến trong tờ hướng dẫn sử dụng này.

CHÚ Ý Không dùng vắc xin quá thời hạn sử dụng đã ghi rõ trên hộp thuốc. Để ngoài tầm tay trẻ em.

ĐÓNG GÓI Mỗi hộp chứa 10 lọ (1 liều/lọ, 2 liều/lọ, 5 liều/lọ, 10 liều/lọ, 20 liều/lọ).

BẢO QUẢN Ở nhiệt độ từ +2°C đến +8°C, không làm đông băng.

HẠN DÙNG 36 tháng.

TYPHOID Vi POLYSACCHARIDE VACCINE

INTRODUCTION

Typhoid Vi polysaccharide vaccine is prepared using a bio - technological chain. This vaccine is based on a constituent (capsular antigen) of Salmonella typhi Ty2. It has high purity and is preserved with phenol.

COMPOSITION Each 0,5ml immunizing dose contains:

- Purified Vi Polysaccharide (from *Salmonella typhi* Ty2 strain) 0,025mg
- Phenol ..... maximum 1,25mg
- Sodium chloride..... 4,15mg
- Disodium hydrogen phosphate 0,0515mg
- Sodium dihydrogen phosphate dihydrate 0,023mg
- WFI ..... q.s.p 0,5ml

INDICATION

- This vaccine is a vaccine indicated in the prevention of Typhoid fever in adults and in children over 2 years of age.
- This vaccine is also specially advised using for travelers going to endemic areas, medical persons in close contact with a bacterial carrier, health care professionals, migrants and military personnel.

CONTRA-INDICATION

Do not use:

- If adults and children are allergic to any ingredient of the vaccine.
- In the case of suffering from fever, an acute disease, a progressive chronic disease, the vaccination should be postponed.
- Ask the doctor or pharmacist for advice before taking any medicine.

TAKE SPECIAL CARE WITH VACCINE

- This vaccine must not be injected by the intravascular route: Make sure the needle dose not penetrate ablood vessel.
- This vaccine protects against Typhoid fever bacterium (*Salmonella typhi*), but not against related to bacteria (*Salmonella paratyphi* A or B).
- This vaccine is not indicated for children under 2 years of age because efficacy is not adequate in this age group.
- This vaccine should be used during pregnancy or breast-feeding only when so advised by doctor.

MEDICINE INTERACTIONS

- Please inform your doctor or pharmacist if you are taking or have recently taken any other medicines, even if they were not prescribed.
- Vaccine may be administered with other vaccines (hepatitis A, hepatitis B, yellow fever, diphtheria, tetanus, poliomyelitis, rabies, meningitis A + C) during the same vaccination session.

DOSAGE AND HOW TO USE

- A single injection of 0,5ml ensure protection.
- Revaccination should be performed every 3 years if the risk of exposure continues.
- The vaccination schedule is the same for children and for adults.

METHOD AND ROUTE OF ADMINISTRATION

- Intramuscular or subcutaneous routes.
- Withdrawing 1 or many doses of vaccine from multidose vial depend on mainly the skill.
- Shaking carefully the vaccine vial before use, avoid creating bubble but have homogeneous mixture.
- Using a sterile syringe fitted with a sterile needle, a single dose is withdrawn from the multidose vial, after disinfecting the outer surface of the vial stopper. For the subsequent dose, the same operation should be repeated [illegible] more than five minutes after the last dose [illegible] (Never keep in frozen)
- Manufacturer's legal responsibility is to ensure the product until it is used.
- The quality of the handling performed by the user to withdraw vaccine, doses can affect the quality of a product packaged in a multidose vial. For this reason, the manufacturer cannot assume responsibility for the product over 24 hours after the first extraction operation unless the vial has been stored in compliance with the manufacturer's recommendations.

SIDE EFFECTS

- The effects after vaccination are usually moderate and of short duration.
- Local injection site reactions (pain, tiredness, headache, malaise, joint and muscle pain, nausea, abdominal pain).
- Isolated case of serum sickness and serious allergic reactions (anaphylactic reaction).
- Please inform your doctor or pharmacist if you notice any side effects not mention in this leaflet.

NOTE Do not use vaccine after the expiry date stated on the label and box. Keep out of the reach of children.

PACKAGE Each box contains of 10 vials (1 dose/vial, 2 doses/vial, 5 doses/vial, 10 doses/vial, 20 doses/vial).

STORAGE +2°C to +8°C, do not freeze.

EXPIRY 36 months.

TUQ CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Thu Thủy