BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 8851 /QLD-ĐK

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2018

V/v thay đổi chủng cúm mùa Nam bán cầu năm 2018

Kính gửi: Sanofi Pasteur S.A.

Địa chỉ: 2 avenue Pont Pasteur, 69007 Lyon – Pháp
(VPĐD số 10 Hàm Nghi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh)

Cục Quản lý Dược nhận được văn thư đề ngày 26/04/2018 của công ty về việc bổ sung hồ sơ (hồ sơ 25, ngày 07/02/2018) theo yêu cầu tại công văn số 5697/QLD-ĐK ngày 03/04/2018 của Cục Quản lý Dược liên quan việc thay đổi chủng cúm mùa Nam bán cầu năm 2018 đối với vắc xin cúm đã được cấp số đăng ký lưu hành.

Căn cứ Thông tư số 44/2014/TT-BYT ngày 25/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đăng ký thuốc; Thông tư số 06/2016/TT-BYT ngày 08/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn ghi nhãn thuốc; Căn cứ công văn số 1890/QLD-ĐK ngày 25/01/2018 của Cục Quản lý Dược về việc gia hạn số đăng ký;

Căn cứ Biên bản thẩm định hồ sơ đăng ký thay đổi/bổ sung của công ty, Cục Quản lý Dược có ý kiến như sau:

Đồng ý để công ty được thay đổi chủng cúm mùa Nam bán cầu năm 2018 đối với vắc xin VAXIGRIP (0,5ml), số đăng ký QLVX-0646-13.

Mẫu nhãn và tờ hướng dẫn sử dụng được cập nhật chủng cúm mùa Nam bán cầu năm 2018 được đóng dấu xác nhận của Cục Quản lý Dược kèm theo Công văn này.

Ngoài nội dung được thay đổi trên, tất cả các nội dung khác giữ nguyên như hồ sơ đăng ký thuốc lưu tại Cục Quản lý Dược.

Công ty đăng ký, nhà sản xuất phải chịu trách nhiệm về chất lượng đối với thuốc lưu hành trên thị trường và có trách nhiệm thông báo sự thay đổi này đến các cơ quan liên quan và khách hàng.

Sau 06 tháng kể từ ngày ký công văn này, công ty không được nhập khẩu thuốc trên với chủng cúm mùa, mẫu nhãn và tờ hướng dẫn sử dụng cũ của thuốc.

Cục Quản lý Dược thông báo để công ty biết và thực hiện đúng các quy định của Việt Nam về lưu hành thuốc./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Viện Kiểm định Quốc gia VX và SPYT;
- Lưu: VT, ĐK (Hy).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Đỗ Văn Đông

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
TĐ/BS ngày 21 tháng 5 năm 2018
(theo công văn 8851/QLD-ĐK)

V3	30/11/2017 - AN/IC/CT
Code article	Sanofi Pasteur
694257	XFAE
Etui - Format : 31,5 x 22,5 x 128,5 mm	
3 Réf. Pantone Coated : Reflex blue 285 185	
☐ Présence de tramé	
Tracé Vernis avec réserve	

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

VAXIGRIP
1 seringue/syringe/jeringa

VAXIGRIP
VAC-XIN CÚM (HẠT VIRION ĐƯỢC TÁCH RA, BẤT HOẠT)
Hỗn dịch tiêm. Hộp 1 bơm tiêm 1 liều (0,5 ml).
Vắc-xin cúm gồm các chủng virus theo khuyến cáo của Tổ Chức Y Tế Thế Giới (W.H.O) cho mùa cúm 2018 ở Nam bán cầu.
Hoạt chất trong một liều 0,5 ml: các chủng virus cúm
A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09 - sử dụng chủng tương đương (A/Michigan/45/2015, NYMC X-275): 15 microgam HA
A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2) - sử dụng chủng tương đương (A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016, NIB-104): 15mcg HA
B/Phuket/3073/2013 - sử dụng chủng tương đương (B/Phuket/3073/2013, chủng hoang dại): 15 mcg HA
Tiêm bắp hay tiêm dưới da sâu. Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và các thông tin khác đề nghị xem trong tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.
Đọc kỹ tờ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Để xa tầm tay trẻ em. Bảo quản trong tủ lạnh (từ +2°c đến +8°C). Tránh ánh sáng. Không để đông băng.
Tiêu chuẩn: TCCS. Số lô SX, NSX và HD: xem LOT, MANUF, và EXP trên bao bì.
Hạn dùng là ngày cuối cùng của tháng hết hạn (EXP.) trên bao bì.
SX bởi SANOFI PASTEUR S.A. tại Campus Mérieux, 1541 avenue Marcel Mérieux, 69280 Marcy l'Etoile – Pháp (địa điểm 1) / Parc Industriel d'Incarville, 27100 Val de Reuil – Pháp (địa điểm 2).
DNNK:
SANOFI PASTEUR SA
2, avenue Pont Pasteur
69007 LYON - FRANCE/FRANCIA
MANUF.:
LOT/
LOTE:
EXP./
CAD.:
SDK QLVX-0646-13

Virus de la grippe (inactivé, fragmenté) des souches suivantes* :
A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09 - souche analogue
A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2) - souche analogue
B/Phuket/3073/2013 - souche analogue
15 µg d'hémagglutinine par souche pour une dose de 0,5 ml.
* cultivées sur œufs

Excipients : solution tampon contenant du chlorure de sodium, du phosphate disodique dihydraté, du phosphate monopotassique, du chlorure de potassium, de l'eau pour préparations injectables.
Lire la notice avant utilisation.

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.
A conserver au réfrigérateur (entre 2°C et 8°C). Ne pas congeler.
Conserver la seringue dans l'emballage extérieur à l'abri de la lumière.
Indiqué dans la prévention de la grippe.

Ce vaccin est conforme aux recommandations de l'OMS (dans l'Hémisphère Sud) pour la saison 2018.

VAXIGRIP Suspension injectable en seringue préremplie/Suspension for injection in prefilled syringe/ Suspensión inyectable en jeringa precargada

Vaccin grippal (inactivé, à virion fragmenté)/Influenza vaccine (split virion, inactivated)/ Vacuna antigripal (inactivada, de virus fraccionados)

SOUCHES
STRAINS
CEPAS
2018

1 seringue préremplie (0,5 ml) avec aiguille attachée
1 prefilled syringe (0.5 ml) with attached needle
1 jeringa precargada (0,5 ml) con aguja acoplada

Voie intramusculaire ou sous-cutanée profonde/Intramuscular or deep subcutaneous use/ Vía intramuscular o subcutánea profunda

SANOFI PASTEUR

Influenza virus (inactivated, split) of the following strains*:
A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09 - like strain
A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2) - like strain
B/Phuket/3073/2013 - like strain
15 µg haemagglutinin per strain per 0.5-ml dose.
* propagated in eggs

Excipients: buffer solution containing sodium chloride, disodium phosphate dihydrate, potassium dihydrogen phosphate, potassium chloride, water for injections.
Read the package leaflet before use.

Keep out of the sight and reach of children.
Store in a refrigerator (2°C – 8°C). Do not freeze.
Keep the syringe in the outer carton in order to protect from light.
Indicated in the prevention of influenza.

This vaccine complies with the WHO recommendations (Southern Hemisphere) for the 2018 season.

0694 71
694257 314

V3	30/11/2017 - AN/IC/CT
Code article	Sanofi Pasteur
694257	XFAE
Etui - Format : 31,5 x 22,5 x 128,5 mm	
3 Réf. Pantone Coated : Reflex blue 285 185	
☐ Présence de tramé	
Tracé Vernis avec réserve	

SANOFI PASTEUR S.A. CÔNG TY
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

VAXIGRIP 1 seringue/syringe/jeringa

MANUF.:
LOT/
LOTE:
EXP./
CAD.:

SANOFI PASTEUR SA
2, Avenue Pont Pasteur
69007 LYON - FRANCE/FRANCIA

Virus de la grippe (inactivado, fraccionado) de las cepas siguientes*:
A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09 - cepa análoga
A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2) - cepa análoga
B/Phuket/3073/2013 - cepa análoga
15 µg de hemaglutinina por cepa para una dosis de 0,5 ml.
* cultivadas en huevos

Esta vacuna cumple con las recomendaciones de la OMS (en el hemisferio sur) para la temporada 2018.

Excipientes: solución tamponada que contiene cloruro de sodio, fosfato disódico dihidratado, fosfato monopotásico, cloruro de potasio, agua para inyectables.

Leer el prospecto antes de utilizar esta vacuna.

Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños.

Conservar en refrigerador (entre 2°C y 8°C). No congelar.

Conservar la jeringa en el embalaje exterior para protegerla de la luz.

Indicada para prevenir la gripe.

VAXIGRIP 1 seringue/syringe/jeringa

Virus de la grippe (inactivé, fragmenté) des souches suivantes* :
A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09 - souche analogue
A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2) - souche analogue
B/Phuket/3073/2013 - souche analogue
15 µg d'hémagglutinine par souche pour une dose de 0,5 ml.
* cultivées sur œufs

Excipients : solution tampon contenant du chlorure de sodium, du phosphate disodique dihydraté, du phosphate monopotassique, du chlorure de potassium, de l'eau pour préparations injectables.

Lire la notice avant utilisation.

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.
A conserver au réfrigérateur (entre 2°C et 8°C). Ne pas congeler.
Conserver la seringue dans l'emballage extérieur à l'abri de la lumière.
Indiqué dans la prévention de la grippe.

Ce vaccin est conforme aux recommandations de l'OMS (dans l'Hémisphère Sud) pour la saison 2018.

VAXIGRIP

Suspension injectable en seringue préremplie/Suspension for injection in prefilled syringe/
Suspensión inyectable en jeringa precargada

**Vaccin grippal (inactivé, à virion fragmenté)/Influenza vaccine (split virion, inactivated)/
Vacuna antigripal (inactivada, de virus fraccionados)**

SOUCHES
STRAINS
CEPAS
2018

1 seringue préremplie (0,5 ml) avec aiguille attachée
1 prefilled syringe (0.5 ml) with attached needle
1 jeringa precargada (0,5 ml) con aguja acoplada

**Voie intramusculaire ou sous-cutanée profonde/Intramuscular or deep subcutaneous use/
Vía intramuscular o subcutánea profunda**

SANOFI PASTEUR

Influenza virus (inactivated, split) of the following strains*:
A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09 - like strain
A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2) - like strain
B/Phuket/3073/2013 - like strain
15 µg haemagglutinin per strain per 0.5-ml dose.
* propagated in eggs

Excipients: buffer solution containing sodium chloride, disodium phosphate dihydrate, potassium dihydrogen phosphate, potassium chloride, water for injections.

Read the package leaflet before use.

Keep out of the sight and reach of children.
Store in a refrigerator (2°C – 8°C). Do not freeze.
Keep the syringe in the outer carton in order to protect from light.
Indicated in the prevention of influenza.

This vaccine complies with the WHO recommendations (Southern Hemisphere) for the 2018 season.

VAXIGRIP

Vaccin grippal
Influenza vaccine
Vacuna antigripal
Souches/Strains/Cepas 2018
0,5 ml/0.5 ml
Voie IM ou SC profonde
IM or deep SC use
Vía IM o SC profunda
Sanofi Pasteur

Manuf.:

Lot/
Lote:

Exp./
Cad.: 314 694255

SANOFI PASTEUR S.A. CÔNG TY
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

VI	14/11/2017 - AN
Code article 694255	Sanofi Pasteur XFAE
SPECIFICITE(S) MLE	SPECIFICITE(S) VDR
Etiquette - Format : 19 x 38 mm	
■ seringue ☐ flacon ☐ ampoule	
3 Réf. Pantone Coated : Black 285 185	
Tracé	



Vaxigrip hộp 1 bơm tiêm 1 liều 0,5 ml – nội dung nhãn phụ

℞ **Thuốc kê đơn**

VAXIGRIP

VẮC-XIN CÚM (HẠT VIRION ĐƯỢC TÁCH RA, BẤT HOẠT)

Hỗn dịch tiêm. Hộp 1 bơm tiêm 1 liều (0,5 ml).

Vắc-xin cúm gồm các chủng virus theo khuyến cáo của Tổ Chức Y Tế Thế Giới (W.H.O) cho mùa cúm 2018 ở Nam bán cầu.

Hoạt chất trong một liều 0,5 ml: các chủng virus cúm
A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09 - sử dụng chủng tương đương (A/Michigan/45/2015, NYMC X-275): 15 mcg HA,
A/Singapore//INFIMH-16-0019/2016 (H3N2) - sử dụng chủng tương đương (A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016, NIB-104) : 15mcg HA,
B/Phuket/3073/2013 - sử dụng chủng tương đương (B/Phuket/3073/2013, chủng hoang dại): 15 mcg HA.

Tiêm bắp hay tiêm dưới da sâu. Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và các thông tin khác đề nghị xem trong tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.

Đọc kỹ tờ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.


Để xa tầm tay trẻ em. Bảo quản trong tủ lạnh (từ +2°C đến +8°C). Tránh ánh sáng. Không để đông băng.

Tiêu chuẩn: TCCS. Số lô SX, NSX và HD: xem LOT, MANUF. và EXP. trên bao bì. Hạn dùng là ngày cuối cùng của tháng hết hạn (EXP.) trên bao bì.

SX bởi SANOFI PASTEUR S.A. tại Campus Mérieux, 1541 avenue Marcel Mérieux, 69280 Marcy l'Etoile – Pháp (địa điểm 1) / Parc Industriel d'Incarville, 27100 Val de Reuil – Pháp (địa điểm 2).

DNNK: SĐK: QLVX-0646-13

Vaxigrip 0,5 ml – mùa 2018 ở Nam bán cầu
Hộp 1 bơm tiêm nạp sẵn 0,5ml vắc-xin
Kích thước nhãn phụ 31 x 76 (mm)



℞ Thuốc kê đơn
VAXIGRIP
VẮC-XIN CÚM (HẠT VIRION ĐƯỢC TÁCH RA, BẤT HOẠT)
Hỗn dịch tiêm. Hộp 1 bơm tiêm 1 liều (0,5 ml).
Vắc-xin cúm gồm các chủng virus theo khuyến cáo của Tổ Chức Y Tế Thế Giới (W.H.O) cho mùa cúm 2018 ở Nam bán cầu
Hoạt chất trong một liều 0,5 ml: các chủng virus cúm
A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09 - sử dụng chủng tương đương (A/Michigan/45/2015, NYMC X-275): 15 mcg HA,
A/Singapore//INFIMH-16-0019/2016 (H3N2) - sử dụng chủng tương đương (A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016, NIB-104) : 15mcg HA,
B/Phuket/3073/2013 - sử dụng chủng tương đương (B/Phuket/3073/2013, chủng hoang dại): 15 mcg HA.
Tiêm bắp hay tiêm dưới da sâu. Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và các thông tin khác đề nghị xem trong tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.
Đọc kỹ tờ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Để xa tầm tay trẻ em. Bảo quản trong tủ lạnh (từ +2°C đến +8°C). Tránh ánh sáng. Không để đông băng
Tiêu chuẩn: TCCS. Số lô SX, NSX và HD: xem LOT, MANUF. và EXP. trên bao bì. Hạn dùng là ngày cuối cùng của tháng hết hạn (EXP.) trên bao bì.
SX bởi SANOFI PASTEUR S.A. tại Campus Mérieux, 1541 avenue Marcel Mérieux, 69280 Marcy l'Etoile – Pháp (địa điểm 1) / Parc Industriel d'Incarville, 27100 Val de Reuil – Pháp (địa điểm 2)
DNNK: SĐK: QLVX-0646-13

CÔNG TY SANOFI PASTEUR S.A
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

℞ **Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc**

VAXIGRIP

VẮC-XIN CÚM (HẠT VIRION ĐƯỢC TÁCH RA, BẤT HOẠT)

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Để xa tầm tay trẻ em
Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

Vắc-xin cúm gồm các chủng virus theo khuyến cáo của Tổ Chức Y Tế Thế Giới (W.H.O.) cho mùa cúm 2018 ở Nam bán cầu.

THÀNH PHẦN

Thành phần hoạt chất:

Virus Cúm, các chủng sau* (hạt virion được tách ra, bất hoạt):

- A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09 - sử dụng chủng tương đương (A/Michigan/45/2015, NYMC X-275)..... 15 mcg HA**
- A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2) - sử dụng chủng tương đương (A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016, NIB-104) ..... 15 mcg HA**
- B/Phuket/3073/2013 - sử dụng chủng tương đương ((B/Phuket/3073/2013, chủng hoang dại) . ..... 15 mcg HA**

trong một liều 0,5 ml

* cấy trên trứng gà có phôi, có nguồn gốc từ đàn gà khỏe mạnh
** ngưng kết tố hồng cầu

Vắc-xin này tuân theo các khuyến cáo của Tổ Chức Y Tế Thế Giới (W.H.O.) cho mùa cúm 2018 ở Nam bán cầu.

Thành phần tá dược:

Dung dịch đệm:

- sodium chloride
- potassium chloride
- disodium phosphate dihydrate
- potassium dihydrogen phosphate
- nước pha tiêm.

VAXIGRIP có thể chứa một lượng rất nhỏ (vết) của trứng như ovalbumin và neomycin, formaldehyde, và octoxinol-9, những chất được sử dụng trong quá trình sản xuất (xem thêm mục "CHỐNG CHỈ ĐỊNH").

DẠNG BÀO CHẾ

Hỗn dịch tiêm được nạp sẵn trong bơm tiêm.

Sau khi lắc nhẹ, VAXIGRIP là một chất lỏng hơi trắng hoặc trắng đục.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

- Hộp 1 bơm tiêm nạp sẵn 0,5 ml vắc-xin.
- Hộp 20 bơm tiêm, mỗi bơm tiêm nạp sẵn 0,5 ml vắc-xin.

ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC

Phân nhóm dược điều trị: vắc-xin cúm, mã ATC: J07BB02

Đáp ứng miễn dịch kháng thể được hình thành dần trong 2-3 tuần. Thời gian duy trì miễn dịch sau khi tiêm vắc-xin có thể thay đổi nhưng thường tồn tại 6 – 12 tháng.

ĐẶC TÍNH DƯỢC ĐỘNG HỌC

Không áp dụng.

CHỈ ĐỊNH

VAXIGRIP được chỉ định để phòng ngừa bệnh Cúm mùa do virus Cúm thuộc các chủng H1N1, H3N2 và B có trong thành phần của vắc-xin cho trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên và người lớn.

VAXIGRIP không bảo vệ cơ thể phòng bệnh đối với các chủng virus Cúm khác. Nên dùng VAXIGRIP theo khuyến cáo chính thức.

Bệnh Cúm do nhiều týp virus gây nên và có thể lây truyền nhanh chóng; các chủng virus gây bệnh cúm có thể thay đổi hàng năm. Đó là lý do tại sao cần phải tiêm ngừa mỗi năm. Thời điểm dễ nhiễm bệnh Cúm nhất là những tháng lạnh nhất. Những người chưa tiêm ngừa lúc mùa thu thì đến mùa xuân vẫn có thể tiêm ngừa vì đến thời điểm đó vẫn còn có thể bị nhiễm bệnh cúm.

Bệnh Cúm ủ bệnh trong vài ngày, vì vậy nếu như đã nhiễm bệnh Cúm ngay trước hay ngay sau khi tiêm vắc-xin thì vẫn có thể phát bệnh.

Vắc-xin không bảo vệ cho người đã tiêm chủng phòng ngừa cảm lạnh, dù là các triệu chứng này tương tự như bệnh cúm.

LIỀU DÙNG

***Người lớn*:** 0,5 ml

Trẻ em:

Trẻ em từ 36 tháng tuổi trở lên: tiêm 0,5 ml.

Trẻ em từ 6 đến dưới 36 tháng tuổi: 0,25 ml. Dữ liệu lâm sàng còn hạn chế. Xem thêm thông tin về việc dùng liều 0,25 ml ở mục " Hướng dẫn về chuẩn bị thuốc trước khi dùng".

Nếu cơ quan chức năng có quy định thì có thể dùng liều 0,5 ml.

Các trẻ dưới 9 tuổi trước đây chưa được tiêm ngừa Cúm, phải tiêm liều thứ hai cách liều đầu tiên ít nhất là 4 tuần.

Trẻ dưới 6 tháng tuổi: chưa xác định được độ an toàn và tính hiệu lực của VAXIGRIP khi dùng ở trẻ dưới 6 tháng tuổi. Hiện không có dữ liệu.

CÁCH DÙNG

Tiêm bắp hay tiêm dưới da sâu.

Người lớn và trẻ từ 36 tháng tuổi trở lên: vị trí thích hợp để tiêm bắp là cơ Delta.

Trẻ từ 12 tháng tuổi đến dưới 36 tháng tuổi: vị trí thích hợp để tiêm bắp là mặt trước-bên của đùi (hay ở cơ Delta nếu khối cơ thích hợp để tiêm bắp).

Trẻ từ 6 tháng tuổi đến 11 tháng tuổi: vị trí thích hợp để tiêm bắp là mặt trước-bên của đùi.

Thận trọng trước khi thao tác hay dùng thuốc

Hướng dẫn về chuẩn bị thuốc trước khi dùng:

Phải để vắc xin về nhiệt độ phòng trước khi dùng.
Lắc trước khi dùng.
Quan sát hình thức cảm quan bằng mắt thường trước khi dùng.
Không được dùng vắc-xin khi thấy có phần tử lạ trong hỗn dịch.

Hướng dẫn tiêm liều 0,25 ml cho các trẻ từ 6 đến dưới 36 tháng tuổi:

Khi có chỉ định dùng liều 0,25 ml, để bỏ một nửa thể tích trong bơm tiêm 0,5 ml: giữ bơm tiêm thẳng đứng và đẩy nút chặn piston đến vạch mảnh màu đen trên thân bơm tiêm. Tiêm cho trẻ 0,25 ml vắc-xin còn lại trong bơm tiêm.

Các sản phẩm không còn sử dụng hay thải bỏ cần phải được xử lý theo qui định hiện hành.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Quá mẫn cảm với các hoạt chất, với bất kỳ tá dược liệt kê trong mục "THÀNH PHẦN" hay với bất kỳ chất nào có thể có trong thành phần dù với một lượng rất nhỏ còn sót lại (vết) như trứng (ovalbumin, protein của gà), neomycin, formaldehyde và octoxinol-9.

Phải hoãn việc tiêm vắc-xin khi bị bệnh có sốt vừa hay sốt cao hay bị bệnh cấp tính.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG

Như khi dùng các vắc-xin bằng đường tiêm khác, luôn phải chuẩn bị sẵn đầy đủ phương tiện điều trị nội khoa và theo dõi tình hình sức khỏe sau khi tiêm vắc-xin và để xử trí ngay khi người được tiêm bị sốc phản vệ sau khi tiêm vắc-xin.

Không được tiêm VAXIGRIP vào mạch máu trong bất kỳ trường hợp nào.

Như khi dùng các vắc-xin khác bằng đường tiêm bắp, phải tiêm một cách thận trọng ở người bị giảm tiểu cầu hay bị rối loạn chảy máu vì những người này có thể bị chảy máu khi tiêm bắp.

Như các vắc-xin khác, tiêm chủng với VAXIGRIP không bảo vệ được 100% những người dễ bị tổn thương.

Đáp ứng miễn dịch ở bệnh nhân suy giảm miễn dịch bẩm sinh hay mắc phải có thể không đầy đủ.

Ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm huyết thanh

Xem mục "Tương tác với các thuốc khác và các dạng tương tác".

Khả năng sinh sản, có thai và cho con bú sữa mẹ

Có thai:

Có thể tiêm vắc-xin cúm bất hoạt vào bất kỳ giai đoạn nào của thai kỳ. Dữ liệu về tính an toàn khi dùng vắc-xin này vào 3 tháng giữa hay 3 tháng cuối thai kỳ nhiều hơn dữ liệu về tính an toàn khi dùng vắc-xin này trong 3 tháng đầu thai kỳ; tuy nhiên các dữ liệu toàn cầu cho thấy không có biến cố bất lợi cho phôi thai và kết quả thai kỳ do chủng ngừa vắc-xin cúm bất hoạt gây ra.

Cho con bú sữa mẹ:

Có thể dùng VAXIGRIP khi đang cho con bú sữa mẹ.

Khả năng sinh sản:

Không có dữ liệu về khả năng sinh sản.

Ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc

VAXIGRIP không ảnh hưởng hay ảnh hưởng không đáng kể đến khả năng lái xe hay vận hành máy móc.

Tương tác với các thuốc khác và các dạng tương tác

VAXIGRIP có thể tiêm cùng lúc với các vắc-xin khác. Tuy nhiên, phải tiêm ở các chi khác nhau. Cần lưu ý rằng tác dụng không mong muốn có thể nhiều hơn khi tiêm cùng lúc nhiều vắc-xin.

Đáp ứng miễn dịch có thể giảm khi tiêm cho bệnh nhân đang điều trị ức chế miễn dịch.

Sau khi chủng ngừa Cúm, kết quả xét nghiệm huyết thanh bằng phương pháp ELISA để tìm kháng thể kháng HIV1, viêm gan C, và đặc biệt là HTLV1 có thể bị dương tính giả. Thử lại bằng kĩ thuật Western-Blot giúp chứng minh đây là kết quả dương tính giả. Kết quả dương tính giả tạm thời có thể là do đáp ứng IgM khi chủng ngừa.

Tương kỵ

Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của vắc-xin, không trộn lẫn vắc-xin này với các vắc-xin hoặc thuốc khác.

Các chất có thể ảnh hưởng

Vaxigrip chứa potassium và sodium.
Có ít hơn 1 mmol potassium (39 mg) và sodium (23 mg) trong mỗi liều Vaxigrip, tức là bản chất 'không có potassium' và 'không có sodium'.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CÓ THỂ GẶP KHI TIÊM VẮC-XIN

a. Tóm tắt về độ an toàn

Trong các nghiên cứu lâm sàng gần đây, khoảng 10.000 đối tượng từ 6 tháng tuổi đã được tiêm VAXIGRIP.

Tùy vào tiền sử tiêm chủng và tuổi của đứa trẻ mà liều và số liều tiêm khác nhau (xem thêm Trẻ em trong mục b. Bảng danh sách các Tác dụng không mong muốn).

Các phản ứng trong dự kiến thường gặp trong vòng 3 ngày đầu sau khi tiêm VAXIGRIP, tự khỏi trong 1 đến 3 ngày kể từ khi khởi phát triệu chứng. Phần lớn các phản ứng trong dự kiến ở mức độ nhẹ đến vừa.

Các phản ứng trong dự kiến thường được báo cáo nhất trong vòng 7 ngày sau khi tiêm VAXIGRIP là đau tại chỗ tiêm ở tất cả mọi đối tượng tham gia thử nghiệm lâm sàng ngoại trừ các trẻ từ 6 tháng đến dưới 36 tháng tuổi, cáu kỉnh được báo cáo nhiều nhất cho nhóm tuổi này.

Các phản ứng trong dự kiến toàn thân thường được báo cáo nhất trong vòng 7 ngày sau khi tiêm VAXIGRIP là đau đầu ở người lớn, người cao tuổi và trẻ em từ 9 đến 17 tuổi và khó chịu ở trẻ từ 3 đến 8 tuổi.

Các phản ứng trong dự kiến thường ít gặp ở nhóm người cao tuổi so với ở nhóm người lớn.

b. Bảng danh sách các tác dụng không mong muốn

Các dữ liệu sau đây tóm tắt tần số các tác dụng không mong muốn được ghi nhận sau khi chủng ngừa với VAXIGRIP trong các thử nghiệm lâm sàng và trong quá trình lưu hành sản phẩm trên toàn cầu.

Các tác dụng không mong muốn được xếp theo tần số theo các qui ước:
Rất thường gặp (≥ 1/10);
Thường gặp (≥ 1/100 đến < 1/10);
Không thường gặp (≥ 1/1.000 đến < 1/100);
Hiếm gặp (≥ 1/10.000 đến < 1/1.000);
Rất hiếm gặp (< 1/10.000),
Không rõ: không thể đánh giá từ các dữ liệu hiện có

Người lớn và người cao tuổi

Độ an toàn trình bày sau đây được dựa trên dữ liệu từ hơn 4.300 người lớn và 5.000 người cao tuổi trên 60 tuổi.

Tác dụng không mong muốn	Tần số
Rối loạn máu và hệ bạch huyết	
Sưng hạch [1]	Không thường gặp
Giảm tiểu cầu thoáng qua	Không rõ
Rối loạn hệ miễn dịch	
Các phản ứng dị ứng: sưng mặt [6], mày đay [6], ngứa, ngứa toàn thân [6], ban đỏ, ban đỏ toàn thân [6], phát ban	Hiếm gặp
Các phản ứng dị ứng nặng như khó thở, phù Quincke, sốc	Không rõ

Tác dụng không mong muốn	Tần số
Rối loạn hệ thần kinh	
Đau đầu	Rất thường gặp
Chóng mặt [3], buồn ngủ [2]	Không thường gặp
Giảm cảm nhận xúc giác [2], dị cảm (cảm giác nóng rát, kiến bò), đau dọc theo dây thần kinh [5], viêm rễ thần kinh cánh tay [3]	Hiếm gặp
Co giật, rối loạn hệ thần kinh như viêm não-tủy, viêm thần kinh, hội chứng Guillain-Barré	Không rõ
Rối loạn mạch máu	
Viêm mạch máu như ban xuất huyết Schonlein-Henoch, một vài trường hợp bị viêm mạch máu thận thoáng qua	Không rõ
Rối loạn dạ dày-ruột	
Tiêu chảy, nôn [2]	Không rõ
Rối loạn da và mô dưới da	
Tăng đổ mồ hôi	Thường gặp
Rối loạn cơ xương và mô liên kết	
Đau cơ	Rất thường gặp
Đau khớp	Thường gặp
Các rối loạn toàn thân và tình trạng tại nơi tiêm	
Đau/nhạy đau chỗ tiêm, đỏ chỗ tiêm, sưng chỗ tiêm, cứng chỗ tiêm, khó chịu [4], suy nhược [4], ngứa chỗ tiêm [4]	Rất thường gặp
Sốt, run rẩy/rét run, thâm tím/bầm chỗ tiêm	Thường gặp
Hội chứng giống cúm [2], nóng chỗ tiêm [2], khó chịu tại chỗ tiêm [2]	Không thường gặp

(1) Hiếm gặp ở người cao tuổi
(2) Được báo cáo trong các thử nghiệm lâm sàng ở người lớn
(3) Được báo cáo trong các thử nghiệm lâm sàng ở người cao tuổi
(4) Thường gặp ở người cao tuổi
(5) Không rõ ở nhóm người lớn
(6) Không rõ ở nhóm người cao tuổi

Trẻ em

Tùy vào lịch sử tiêm chủng, trẻ từ 6 tháng tuổi đến 8 tuổi được tiêm một hoặc hai liều VAXIGRIP. Trẻ em từ 6 tháng tuổi đến dưới 36 tháng tuổi được tiêm với liều 0,25 ml, và trẻ từ 3 tuổi được tiêm với liều 0,5 ml.

- ***Trẻ em và thanh thiếu niên từ 3 tuổi đến 17 tuổi***:

Độ an toàn trình bày dưới đây dựa trên dữ liệu từ hơn 300 trẻ từ 3 đến 8 tuổi và khoảng 70 trẻ em / thanh thiếu niên từ 9 đến 17 tuổi.

Ở trẻ từ 3 đến 8 tuổi, các phản ứng trong dự kiến thường được báo cáo nhất trong vòng 7 ngày sau khi tiêm VAXIGRIP là đau tại chỗ tiêm/cứng (56,3%), khó chịu (27,3%), đau cơ (25,5%) và đỏ tại chỗ tiêm (23,4%).

Ở trẻ em/thanh thiếu niên từ 9 đến 17 tuổi, các phản ứng trong dự kiến thường được báo cáo nhất trong vòng 7 ngày sau khi tiêm VAXIGRIP là đau/cứng tại chỗ tiêm (54,5 đến 70,6%), đau đầu (22,4% đến 23,6%), đau cơ (12,7% đến 17,6%) và đỏ tại chỗ tiêm (5,5% đến 17,6%).

Các dữ liệu sau đây tóm tắt tần số xuất hiện của các tác dụng không mong muốn được ghi nhận ở trẻ em/thanh thiếu niên từ 3 đến 17 tuổi sau khi được tiêm VAXIGRIP trong các thử nghiệm lâm sàng và trong quá trình lưu hành trên toàn cầu.

Tác dụng không mong muốn	Tần số
Rối loạn máu và hệ bạch huyết	
Sưng hạch [5]	Không thường gặp
Giảm tiểu cầu thoáng qua	Không rõ
Rối loạn hệ miễn dịch	
Mày đay [5]	Không thường gặp
Các phản ứng dị ứng: ngứa, phát ban, ban đỏ, khó thở, phù Quincke, sốc	Không rõ
Rối loạn hệ thần kinh	
Đau đầu	Rất thường gặp
Chóng mặt [2]	Thường gặp
Đau dọc theo dây thần kinh, dị cảm, co giật, rối loạn hệ thần kinh, như viêm não-tủy, viêm dây thần kinh và hội chứng Guillain Barré	Không rõ
Rối loạn mạch máu	
Viêm mạch máu như ban xuất huyết Schonlein-Henoch, một vài trường hợp ảnh hưởng đến thận thoáng qua	Không rõ
Rối loạn dạ dày-ruột	
Tiêu chảy [1]	Không thường gặp
Rối loạn cơ xương và mô liên kết	
Đau cơ	Rất thường gặp
Các rối loạn toàn thân và tình trạng tại nơi tiêm	
Đau/nhạy đau chỗ tiêm, đỏ chỗ tiêm, sưng chỗ tiêm, cứng chỗ tiêm [3], khó chịu	Rất thường gặp
Sốt, run rẩy/rét run [4], thâm tím/bầm chỗ tiêm, khó chịu tại chỗ tiêm [2], ngứa chỗ tiêm	Thường gặp
Nóng chỗ tiêm [3], chảy máu chỗ tiêm [1]	Không thường gặp

(1) được báo cáo trong các thử nghiệm lâm sàng ở trẻ 3 đến 8 tuổi
(2) Được báo cáo trong các thử nghiệm lâm sàng ở trẻ em/thanh thiếu niên từ 9 đến 17 tuổi
(3) Thường gặp ở trẻ em/thanh thiếu niên từ 9 đến 17 tuổi
(4) Rất thường gặp ở trẻ em/thanh thiếu niên từ 9 đến 17 tuổi
(5) Không rõ ở trẻ em/thanh thiếu niên từ 9 đến 17 tuổi

- ***Trẻ em từ 6 đến dưới 36 tháng tuổi***

Độ an toàn trình bày dưới đây dựa trên dữ liệu từ khoảng 50 trẻ em từ 6 tháng đến dưới 36 tháng tuổi.

Trong một thử nghiệm lâm sàng, các phản ứng trong dự kiến trong vòng 3 ngày sau khi tiêm VAXIGRIP là đau tại chỗ tiêm (23,5%), cáu kỉnh (23,5%), sốt (20,6%) và quấy khóc bất thường (20,6%).

Trong một thử nghiệm lâm sàng khác, các phản ứng trong dự kiến thường được báo cáo nhất trong vòng 7 ngày sau khi tiêm VAXIGRIP là cáu kỉnh (60%), sốt (50%), chán ăn (35%) và quấy khóc bất thường (30%).

Các dữ liệu sau đây tóm tắt tần số xuất hiện của các tác dụng không mong muốn được ghi nhận ở trẻ từ 6 đến dưới 36 tháng tuổi trong vòng 3 đến 7 ngày sau khi được tiêm một hay hai liều 0,25 ml VAXIGRIP trong hai thử nghiệm lâm sàng và trong quá trình lưu hành trên toàn cầu:

Tác dụng không mong muốn	Tần số
Rối loạn máu và hệ bạch huyết	
Giảm tiểu cầu thoáng qua, sưng hạch	Không rõ
Rối loạn hệ miễn dịch	
Mày đay	Không rõ
Các phản ứng dị ứng: ngứa, phát ban, ban đỏ, khó thở, phù Quincke, sốc	Không rõ
Rối loạn chuyển hóa và dinh dưỡng	
Giảm sự thèm ăn, chán ăn [(1)]	Rất thường gặp
Rối loạn tâm thần	
Quấy khóc bất thường, cáu kỉnh	Rất thường gặp
Mất ngủ [(1)]	Thường gặp
Rối loạn hệ thần kinh	
Buồn ngủ	Rất thường gặp
Dị cảm, co giật, rối loạn hệ thần kinh như bị viêm não-tủy	Không rõ
Rối loạn mạch máu	
Viêm mạch máu như ban xuất huyết Schonlein-Henoch, một vài trường hợp ảnh hưởng đến thận thoáng qua	Không rõ
Rối loạn dạ dày – ruột	

Tác dụng không mong muốn	Tần số
Tiêu chảy [1]	Rất thường gặp
Nôn	Thường gặp
Rối loạn toàn thân và tình trạng tại nơi tiêm	
Đau/nhạy đau chỗ tiêm, đỏ chỗ tiêm, sưng chỗ tiêm, cứng chỗ tiêm, sốt	Rất thường gặp
Ngứa chỗ tiêm [1], thâm tím chỗ tiêm [1]	Thường gặp

(1) Báo cáo trong vòng 3 ngày sau khi tiêm VAXIGRIP

c. Các nhóm đối tượng khác

Mặc dù chỉ thu tuyển một số lượng hạn chế những người có cùng tình hình bệnh tật, các nghiên cứu được thực hiện ở những người ghép thận, người bị hen suyễn, hay trẻ em từ 6 tháng tuổi đến 3 tuổi tình hình sức khỏe thuộc nhóm có nguy cơ đặc biệt cao bị nhiễm bệnh cúm kèm biến chứng cho thấy không có sự khác biệt lớn về phương diện độ an toàn của VAXIGRIP ở những đối tượng này.

Quá liều và cách xử trí

Các trường hợp sử dụng quá liều khuyến cáo đã được báo cáo đối với VAXIGRIP. Báo cáo về tác dụng không mong muốn trong các trường hợp sử dụng quá liều phù hợp với thông tin về độ an toàn của VAXIGRIP trình bày trong mục "Tác dụng không mong muốn có thể gặp khi tiêm vắc-xin".

Tích cực theo dõi để có biến pháp xử trí kịp thời.

Báo cáo các phản ứng bất lợi đáng ngờ

Việc báo cáo các phản ứng bất lợi đáng ngờ sau khi sản phẩm thuốc được cấp phép lưu hành là rất quan trọng. Điều này cho phép tiếp tục theo dõi cân bằng lợi ích/nguy cơ của sản phẩm thuốc. Nhân viên y tế được yêu cầu báo cáo mọi phản ứng bất lợi đáng ngờ qua hệ thống báo cáo quốc gia đến Trung tâm Quốc gia về thông tin thuốc và theo dõi phản ứng có hại của thuốc theo địa chỉ email : di.pvcenter@gmail.com

BẢO QUẢN

Để xa tầm tay và tầm nhìn của trẻ em.
Bảo quản trong tủ lạnh (+2°C đến +8°C). Không được để đông băng. Đặt bơm tiêm chứa vắc-xin trong hộp giấy để tránh ánh sáng.

TUỔI THỌ: 12 tháng kể từ ngày sản xuất.

Hạn dùng: Xem ngày hết hạn sử dụng "EXP." trên bao bì.
Không sử dụng sau hạn dùng được ghi trên bao bì.

NHÀ SẢN XUẤT / ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH

SANOFI PASTEUR S.A.
Trụ sở chính: 2 avenue Pont Pasteur, 69007 Lyon – Pháp.

Sản xuất bởi SANOFI PASTEUR S.A. tại Campus Mérieux, 1541 avenue Marcel Mérieux, 69280 Marcy l'Etoile – Pháp (địa điểm 1) / Parc Industriel d'Incarville, 27100 Val de Reuil – Pháp (địa điểm 2).

TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT: Tiêu chuẩn cơ sở

PHIÊN BẢN: 10/2017

SANOFI PASTEUR