


Artwork (actual size)

Artwork (300% scaled size)

SPEEDA™

PRODUCT LICENCE: S20043090

FOR HUMAN USE

RABIES VACCINE FREEZE-DRIED

(Vero Cell)

COMPOSITION

Purified Rabies Virus Antigen ≥ 2.5 IU
(Rabies virus-L. Pasteur PV-2061 propagate on Vero cell and inactivated with β-propiolactone).

0.5ml after reconstitution, ≥2.5IU

LIAONING CHENG DA BIOTECHNOLOGY CO.,LTD.

Lot No.:

Exp Date: dd/mm/yy

S.Đ.K.K.D: 051035 - C.T.T.N.H.H
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM BIỂN LOAN
Q.THỦ ĐỨC - TP. HỒ CHÍ MINH

DILUENT

Water for Injection

0.5ml/ampoule

Lot No.:

Exp Date: dd/mm/yy

Nhãn phụ

Rx – Thuốc bán theo đơn

SPEEDA™

Mỗi lọ vắc xin đông khô chứa: Kháng nguyên virus dại tinh chế (Virus dại L-Pasteur PV-2061 nhân giống trên tế bào Vero và bất hoạt bằng β - propiolactone) ≥ 2.5* IU.

Tá dược: Dextran 40 18mg; Human Serum Albumin ≥ 5.0 mg; Thimerosal ≤ 0.08 mg/ml; Đệm PBS pH 7.2 – 7.8 (Natri dihydro phosphat 0,15mg; Dinatri hydro phosphat 0,54mg; Natri chlorid 4,25mg); nước pha tiêm 0,5ml.

Đóng gói: Hộp chứa 5 lọ vắc xin dạng bột đông khô và 5 ống dung mối 0,5 ml để hoàn nguyên, 1 liều/lọ.

Dạng bào chế: bột vắc xin đông khô hoàn nguyên trong dung môi trước khi tiêm.

Đường dùng: TIÊM BẮP

Chỉ định, Cách dùng và liều dùng, chống chỉ định, thận trọng, phản ứng phụ, và các thông tin khác: *Vui lòng xem tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.*

Bảo quản: 2-8^{0}C, không để đông. Tránh ánh sáng.

Tiêu chuẩn chất lượng: Tiêu chuẩn nhà sản xuất

Số lô SX, NSX, HD: Xem "Lot No.", "Mfg. date", "Exp. date" trên bao bì

Số đăng ký:

Lưu ý: Để thuốc tránh xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nhà sản xuất: LIAONING CHENG DA BIOTECHNOLOGY CO., LTD.

Địa chỉ: No.1 Xinfang Street, Hunnan New District, Shenyang City, Trung Quốc.

Đơn vị nhập khẩu:

(Real size)

SỞ Y TẾ: 051035 - C.T.T.N.H.H
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM BIẾN LOAN
Q.THỦ ĐỨC - TP HỒ CHÍ MINH

Rx – Thuốc bán theo đơn

SPEEDA™

Mỗi lọ vắc xin đông khô chứa: Kháng nguyên virus dại tinh chế (Virus dại L-Pasteur PV-2061 nhân giống trên tế bào Vero và bất hoạt bằng β - propiolactone) ≥ 2.5* IU.

Tá dược: Dextran 40 18mg; Human Serum Albumin ≥ 5.0 mg; Thimerosal ≤ 0.08 mg/ml; Đệm PBS pH 7.2 – 7.8 (Natri dihydro phosphat 0,15mg; Dinatri hydro phosphat 0,54mg; Natri chlorid 4,25mg); nước pha tiêm 0,5ml.

Đóng gói: Hộp chứa 5 lọ vắc xin dạng bột đông khô và 5 ống dung mối 0,5 ml để hoàn nguyên, 1 liều/lọ.

Dạng bào chế: bột vắc xin đông khô hoàn nguyên trong dung môi trước khi tiêm.

Đường dùng: TIÊM BẮP

Chỉ định, Cách dùng và liều dùng, chống chỉ định, thận trọng, phản ứng phụ, và các thông tin khác: *Vui lòng xem tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.*

Bảo quản: 2-8^{0}C, không để đông. Tránh ánh sáng.

Tiêu chuẩn chất lượng: Tiêu chuẩn nhà sản xuất

Số lô SX, NSX, HD: Xem "Lot No.", "Mfg. date", "Exp. date" trên bao bì

Số đăng ký:

Lưu ý: Để thuốc tránh xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nhà sản xuất: LIAONING CHENG DA BIOTECHNOLOGY CO., LTD.

Địa chỉ: No.1 Xinfang Street, Hunnan New District, Shenyang City, Trung Quốc.

Đơn vị nhập khẩu:

(200% real size)

SPEEDA™ Rabies Vaccine for Human Use, Freeze-dried (Vero cell)

THÀNH PHẦN

Mỗi hộp đóng gói gồm: 5 lọ vắc xin đông khô + 5 ống dung môi pha tiêm.

Mỗi liều duy nhất sau khi hoàn nguyên với dung môi pha tiêm (nước pha tiêm) chứa:

Kháng nguyên virus dại tinh chế ..... ≥ 2.5* IU

(Virus dại L-Pasteur PV-2061 nhân giống trên tế bào Vero và bất hoạt bằng β - propiolactone)

Dextran 40 ..... 18 mg

Human Serum Albumin ..... ≥ 5.0 mg

Thimerosal ..... ≤ 0.04 mg/ml

Đệm PBS (pH 7,2 – 7,8)..... 0,5 ml

Nước pha tiêm (Dung môi pha tiêm)..... 0,5 ml

* Công hiệu ≥ 2.5 IU trước và sau khi làm ấm ở 37^{0}C trong 4 tuần.

**Đệm PBS (pH 7,2 – 7,8) chứa Natri Dihydro Phosphat 0,15mg, Dinatri Hydro Phosphat 0,54mg, Natri chlorid 4,25mg.

ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC

Tiêm bắp vắc xin dại giúp tạo ra lymphocyte, sản xuất kháng thể trung hòa virus dại đủ để bảo vệ cơ thể chống lại virus dại. Purified Vero cell rabies vaccine (PVRV – vắc xin dại tinh chế trên tế bào Vero) hoặc RIG và các biện pháp điều trị tại chỗ đều có hiệu quả cao trong việc ngăn ngừa bệnh dại phát triển trên các đối tượng đã phơi nhiễm. Tiêm ngừa trước khi phơi nhiễm bằng các vắc xin dại sẽ giúp tạo ra các kháng thể trung hòa virus dại (virus-neutralizing antibodies – VNAs).

ĐẶC TÍNH DƯỢC ĐỘNG HỌC

Không áp dụng

CHỈ ĐỊNH

Vắc xin tạo miễn dịch phòng ngừa bệnh dại ở người.

1. ***Tiêm chủng trước khi phơi nhiễm:***

Những người có nguy cơ cao phải tiếp xúc với virus dại thì nên được tiêm ngừa trước phơi nhiễm, như nhân viên phòng thí nghiệm thường tiếp xúc với các vật liệu có nhiễm virus dại. Thử máu cần được tiến hành mỗi 6 tháng và nên tiêm liều bổ sung nếu nồng độ kháng thể trong huyết thanh ở dưới mức được cho là có tác dụng bảo vệ cơ thể: 0.5 IU/ml.

Vắc xin này cũng cần thiết được tiêm ngừa cho những Bác sĩ thú y và cộng sự, những người gác rừng, người đi săn, người làm việc ở lò mổ, người làm việc tại các hang động, hố tro, người nhồi bông thú. Trẻ em, người lớn và cả những người đi du lịch đi vào các khu vực đang có dịch trên súc vật cũng cần được tiêm ngừa.

2. ***Tiêm chủng sau khi phơi nhiễm:***

Những người bị chó dại hoặc súc vật bị bệnh dại cắn hay cào xước đều phải tiêm vắc xin ngừa dại, kể cả những người tiếp xúc với các đối tượng sau khi bị cắn nêu trên.

Việc điều trị tùy theo vết thương và tình trạng bệnh của súc vật.

LIỀU DÙNG

Tiêm bắp vào vùng cơ delta ở mặt trên cánh tay, hoặc đối với trẻ nhỏ có thể tiêm vào mặt trước bên đùi. Không được tiêm vào mông.

Vắc xin dạng bột đông khô phải được hoàn nguyên với ống dung môi pha tiêm 0,5 ml tạo thành dung dịch đồng nhất. Lọ vắc xin sau khi hoàn nguyên phải sử dụng ngay.

Lịch tiêm chủng trước phơi nhiễm:

- Tiêm chủng cơ bản: ba liều vào các ngày 0, 7 và 28. Lịch tiêm ngày 28 có thể thay bằng lịch tiêm vào ngày 21.
- Tiêm nhắc 1 năm sau đó.
- Các liều tiêm nhắc tiếp theo: mỗi 5 năm sau đó.

Lịch tiêm chủng sau phơi nhiễm:

1. Xử trí ban đầu:

Xử trí vết thương là rất quan trọng và phải được tiến hành ngay sau khi bị cắn. Việc đầu tiên là khuyến cáo rửa vết thương với thật nhiều nước xà phòng hoặc nước tẩy rửa, rồi thoa cồn 70%, tiếp đó bôi cồn iodine hoặc dung dịch ammoniac vào vết thương. Sau khi hoàn tất, đưa bệnh nhân đi tiêm chủng bệnh dại tại bệnh viện thích hợp, và việc tiêm chủng này phải được tiến hành dưới sự giám sát y khoa.

2. Tiêm chủng cho các đối tượng sau phơi nhiễm mà chưa từng được tiêm ngừa trước đó:

Liều dùng như nhau đối với người lớn và trẻ em: năm liều (mỗi liều 0,5 ml) vào các ngày 0, 3, 7, 14 và 28 (ngày "0" là ngày đầu tiên tiêm chủng). Trường hợp đối tượng thuộc phân loại III trong mức độ phơi nhiễm (xem bảng bên dưới), phải tiêm thêm globulin miễn dịch kháng dại song song với chủng ngừa bằng vắc xin. Đây là miễn dịch thụ động được thêm vào ngày 0 với liều Human Rabies immunoglobulin (HRI) là 20 IU/ kg cân nặng.

Nếu có thể nên tiêm globulin miễn dịch kháng dại ở vị trí đối diện với vị trí tiêm vắc xin.

Trong những trường hợp dưới đây thì phải tiêm liều vắc xin gấp đôi vào ngày 0 và ngày 3:

- Các bệnh nhân bị bệnh lao mạn tính hoặc xơ gan mạn tính đã được tiêm globulin miễn dịch hoặc kháng huyết thanh trước khi tiêm vắc xin dại không lâu.
- Bệnh nhân có vết thương gần với hệ thần kinh trung ương.
- Bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch bẩm sinh hay do bệnh.
- Người già
- Người chưa từng được tiêm chủng vắc xin dại sau khi phơi nhiễm.

3. Tiêm chủng cho các đối tượng sau phơi nhiễm nhưng đã từng được tiêm ngừa trước đó:

Đối với những người vừa tiêm chủng đủ theo phác đồ không quá 1 năm (bất kể là chủng ngừa trước hay sau phơi nhiễm): tiêm 1 liều vào ngày 0 và 3.

Đối với những người đã tiêm chủng đủ theo phác đồ cơ bản và đã tiêm nhắc 1 năm sau đó, liều tiêm nhắc không quá 3 năm thì khi bị phơi nhiễm cũng chỉ tiêm 1 liều vào ngày 0 và ngày 3.

Đối với những người đã tiêm chủng đủ theo phác đồ cơ bản nhưng chưa tiêm liều nhắc 1 năm sau đó, hoặc những người đã tiêm chủng đủ theo phác đồ sau phơi nhiễm nhưng đã quá 1 năm thì nên tiêm vắc xin theo phác đồ lại từ đầu (5 liều).

Tương tự đối với những người đã tiêm chủng đủ theo phác đồ cơ bản và đã tiêm nhắc 1 năm sau đó, nhưng liều tiêm nhắc đã quá 3 năm thì khi bị phơi nhiễm dại cũng nên tiêm lại phác đồ 5 mũi.

Điều trị sau phơi nhiễm được khuyến cáo như sau:

Mức độ nghiêm trọng	Loại tiếp xúc	Điều trị khuyến cáo
I	Chạm vào hay cho súc vật ăn. Vết liếm trên da lành.	Không, nếu có tiền sử đáng tin cậy.
II	Vết gặm trên vùng da hở. Có những vết xước nhẹ hoặc trầy nhưng không chảy máu. Vết liếm trên vùng da bị thương tổn.	Tiêm chủng ngay lập tức.
III	Một hay nhiều vết cắn trong da hoặc vết trầy xước. Có tiếp xúc giữa màng nhầy với nước bọt của súc vật (ví dụ: liếm)	Tiêm chủng ngay lập tức kèm theo globulin miễn dịch kháng dại.

Chú ý: Nếu quan sát thấy súc vật vẫn khỏe mạnh trong vòng 10 ngày, hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính với virus dại thì có thể ngừng liệu pháp điều trị.

CÁCH DÙNG VÀ ĐƯỜNG DÙNG

Hoàn nguyên vắc xin: Cho dung môi pha tiêm vào lọ bột vắc xin và lắc đều cẩn thận cho đến khi bột vắc xin tan hoàn toàn thành dung dịch. Dung dịch phải đồng nhất, trong suốt và không có tiểu phân lợn cợn. Rút dung dịch vắc xin vào bơm tiêm.

Vắc xin phải được tiêm ngay sau khi hoàn nguyên và bơm tiêm sau khi dùng phải hủy ngay.

Đường dùng: chỉ được tiêm bắp; ở người lớn tiêm vào vùng cơ delta, ở trẻ nhỏ có thể tiêm ở mặt trước bên đùi nếu cơ delta quá nhỏ.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Giống như mọi loại vắc xin, vắc xin dại có thể gây một số tác dụng không mong muốn trên một số người.

- Các phản ứng tại chỗ: đau, đỏ, phù, ngứa và tạo nốt cứng tại vị trí tiêm. Các triệu chứng này dần dần sẽ hết.
- Các phản ứng toàn thân: sốt nhẹ, ớn lạnh, ngạt, uể oải, chóng mặt, viêm khớp, đau cơ, rối loạn dạ dày - ruột.
- Các phản ứng phụ nghiêm trọng tương tự sốc phản vệ hiếm gặp như bệnh eczema, nổi mày đay có thể được điều trị khỏi theo hướng dẫn của bác sĩ.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

1. Đối với tiêm chủng sau phơi nhiễm: do bệnh dại là bệnh gây chết người, nên không có chống chỉ định tiêm vắc xin trong trường hợp này, kể cả phụ nữ mang thai.

Không được tiêm bắp cho người rối loạn chảy máu như hemophilli hoặc giảm tiểu cầu.

2. Đối với tiêm phòng trước khi phơi nhiễm:

Phụ nữ có thai hoặc người đang trong giai đoạn bệnh tiến triển bị sốt cấp tính thì nên hoãn tiêm.

Chống chỉ định trong các trường hợp sau:

- bệnh mạn tính nặng.

- các bệnh liên quan đến hệ thần kinh.
- được biết dị ứng với bất cứ thành phần nào của vắc xin.
- người có tiền sử dị ứng với kháng sinh hoặc các chế phẩm sinh học khác.
- Tiêm vào vùng mông.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Đối với tiêm chủng sau phơi nhiễm, vì tính nghiêm trọng của bệnh nên không chống chỉ định tiêm vắc xin dại cho phụ nữ có thai.

Đối với tiêm phòng trước phơi nhiễm, do không có đầy đủ dữ liệu nghiên cứu trên người nên khuyến cáo hoãn tiêm vắc xin dại.

CẢNH BÁO KHI DÙNG

- Không tiêm tĩnh mạch.
- Sau khi hoàn nguyên, dung dịch vắc xin phải được tiêm càng nhanh càng tốt.
- Sử dụng 2 bơm tiêm riêng biệt để tiêm vắc xin dại và immunoglobulin kháng dại, không tiêm cùng vị trí.

QUÁ LIỀU

Không áp dụng.

Thận trọng

Luôn phải có sẵn adrenalin khi tiêm chủng.

Để xa tầm tay trẻ em

TƯƠNG TÁC THUỐC

Corticosterois và các thuốc ức chế miễn dịch có thể ngăn cản sự tạo thành kháng thể và làm cho việc chủng ngừa thất bại. Do đó nên tiến hành định lượng kháng thể trung hòa 2-4 tuần sau khi tiêm liều sau cùng vắc xin.

ĐÓNG GÓI

Hộp chứa 5 lọ vắc xin dạng bột đông khô và 5 ống dung môi pha tiêm chứa 0,5 ml, 1 liều/lọ.

LƯU Ý

Vắc xin chỉ dùng theo đơn của bác sĩ

Đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng

Không dùng vắc xin đã quá hạn ghi trên bao bì

HẠN DÙNG:

- Vắc xin đông khô: năm kể từ ngày sản xuất.
- Dung môi: năm kể từ ngày sản xuất

BẢO QUẢN: Bảo quản ở 2-8°C, không để đông. Tránh ánh sáng.

Tiêu chuẩn : Nhà sản xuất

Sản xuất bởi: LIAONING CHENG DA BIOTECHNOLOGY CO., LTD.

No.1 Xinfang Street, Hunnan New District, Shenyang, Trung Quốc

TUQ CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Thu Thủy