IVAC
ISO 9001:2008
GMP

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
VẮC XIN UỐN VÁN BẠCH HẦU HẤP PHỤ (Td)

QA IVAC

GIỚI THIỆU: Vắc xin uốn ván bạch hầu (Td) là vắc xin phối hợp từ giải độc tố uốn ván, giải độc tố bạch hầu tinh chế và được hấp phụ bằng tá chất Aluminium phosphate.

THÀNH PHẦN: Trong 0,5 ml vắc xin
- Giải độc tố uốn ván tinh chế.....ít nhất 20 đvqt
- Giải độc tố bạch hầu tinh chế.....ít nhất 2 đvqt
- $AlPO_4$ .....cao nhất 3 mg
- Merthiolate (chất bảo quản).....0,005 – 0,02 %

DẠNG BÀO CHẾ: Dung dịch tiêm.

DƯỢC LÝ VÀ CƠ CHẾ TÁC DỤNG:
Sau khi tiêm bắp vắc xin Td, giải độc tố bạch hầu kích thích cơ thể sản sinh kháng thể IgG (kháng độc tố bạch hầu) và giải độc tố uốn ván kích thích cơ thể sản sinh kháng thể IgG (kháng độc tố uốn ván).

Hiệu quả bảo vệ
- Đối với bệnh bạch hầu: Hàm lượng kháng thể trong huyết thanh lớn hơn khoảng từ 0,01 đến 0,1 đơn vị trung hòa độc tố bạch hầu trong 1 ml thường được coi là có tác dụng bảo vệ.
- Đối với bệnh uốn ván: Hàm lượng kháng thể trong huyết thanh lớn hơn hoặc bằng 0,01 đơn vị trung hòa độc tố uốn ván trong 1 ml thường được coi là có tác dụng bảo vệ.

Thời gian bảo vệ
- Sau khi được gây miễn dịch cơ bản phòng bệnh bạch hầu và uốn ván đủ 10 năm, việc tiêm nhắc lại 1 liều vắc xin Td giúp bảo vệ trên 95 % số người được tiêm chống bệnh uốn ván kéo dài ít nhất là 10 năm.

CHỈ ĐỊNH: Dùng để gây miễn dịch nhằm phòng bệnh uốn ván và bạch hầu cho trẻ em lứa tuổi lớn (từ 7 tuổi trở lên) và người lớn.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
- Khi có biểu hiện dị ứng với kháng nguyên bạch hầu và uốn ván ở những lần tiêm trước.
- Tạm hoãn tiêm vắc xin Td trong những trường hợp có bệnh nhiễm trùng cấp tính, sốt chưa rõ nguyên nhân.
- Không tiêm bắp cho người có rối loạn chảy máu như Hemophilia hoặc giảm tiểu cầu.

CÁCH DÙNG VÀ LIỀU LƯỢNG:
- Đường tiêm: Tiêm bắp sâu.
- Liều tiêm 0,5 ml.
- Lịch tiêm:
  + Trường hợp A: Với đối tượng đã tiêm đủ liều miễn dịch cơ bản phòng bệnh bạch hầu và uốn ván thì tiêm nhắc lại 1 liều vắc xin Td vào lứa tuổi thứ 7 và sau đó cứ 10 năm sau tiêm nhắc lại 1 liều vắc xin Td.
  + Trường hợp B: Với trẻ em từ 7 tuổi trở lên mà trước đó chưa được tiêm vắc xin phòng bệnh bạch hầu và uốn ván thì tiêm miễn dịch cơ bản 2 liều, liều thứ hai cách liều thứ nhất 1 tháng, sau 6 tháng tiêm nhắc 1 liều; và sau đó cứ 10 năm sau tiêm nhắc lại 1 liều vắc xin Td.

TÁC DỤNG PHỤ:
- Phản ứng tại chỗ như đau, quầng đỏ, sưng nhẹ tại vị trí tiêm (từ 10% - 75% trường hợp).
- Đôi khi có sốt nhẹ 38 ^{0}C - 39 ^{0}C, vài ngày sau tự hết.
- Áp xe vô khuẩn khoảng 6 - 10 trường hợp/1 triệu liều.
- Có thể xuất hiện phản ứng phụ toàn thân như sốt, đau cơ cánh tay, đau đầu (khoảng 10% trường hợp).
- Các phản ứng phụ nói chung là nhẹ và tự khỏi.
- Có thể xuất hiện viêm dây thần kinh ngoại biên, hội chứng Guillain-Barré nhưng rất hiếm gặp.

VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ

THẬN TRỌNG VÀ CẢNH BÁO:
- Thăm khám trước khi tiêm để loại trừ những trường hợp chống chỉ định, bảo đảm an toàn và hạn chế các tác dụng bất lợi của vắc xin trong lúc tiêm chủng.
  Không tiêm quá liều vắc xin.
- Không tiêm vắc xin vào mạch máu, tránh sốc phản vệ.
- Đôi khi tại chỗ tiêm xuất hiện nốt cứng kéo dài 2 - 3 tuần rồi tự khỏi.
- Nếu tiêm cùng đợt với vắc xin khác hoặc huyết thanh miễn dịch thì tiêm vắc xin Td khác vị trí.
- Nếu tiêm nhầm vắc xin vào dưới da thì phản ứng phụ sẽ rất rầm rộ do vắc xin chứa tá chất nhôm.
- Lắc tan đều trước khi dùng.

Ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc: Chưa có nghiên cứu cho thấy tác dụng của thuốc ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc

Đối với phụ nữ có thai và cho con bú: Không chống chỉ định cho phụ nữ có thai và cho con bú.

Quá liều và cách xử lý: Thông báo cho bác sĩ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

TƯƠNG TÁC THUỐC: Các thuốc ức chế miễn dịch và liệu pháp phóng xạ, tùy theo liều lượng, có thể tương tác với vắc xin Td. Vì cơ chế phòng vệ bình thường bị ức chế, dùng các chất ức chế miễn dịch hoặc liệu pháp đồng vị phóng xạ đồng thời với vắc xin Td có thể làm giảm đáp ứng tạo kháng thể của người bệnh đối với vắc xin Td. Sự thận trọng này không áp dụng cho trường hợp dùng liệu pháp corticosteroid ngắn hạn (dưới 2 tuần) đường toàn thân hoặc đường sử dụng khác mà không gây ức chế miễn dịch.

ĐÓNG GÓI: Hộp 10 lọ, mỗi lọ chứa 5 ml – 10 liều.

BẢO QUẢN: Ở nhiệt độ từ +2 ^{0}C đến +8 ^{0}C, tránh đông đá.

HẠN DÙNG: 30 tháng kể từ ngày cơ sở sản xuất bắt đầu tiến hành thử nghiệm công hiệu cho kết quả có giá trị.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Vắc xin bán theo đơn.

Để xa tầm tay trẻ em.

BB2-Td10-05

NHÀ SẢN XUẤT: **VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ**
09 Pasteur, Nha Trang – Khánh Hòa – VIỆT NAM
Tel: (84 - 58) 3822408 Fax: (84 - 58) 3823815
E-mail: ivac@dng.vnn.vn - Website: www.ivac.com.vn

TUQ CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG