

TEXT SIZE CONTAINED IN THIS ARTWORK
Body text size: 8pt
Smallest text size: 6pt
Microtext: Yes



BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
Lần đầu: 27/03/2017
GLAXOSMITHKLINE PTE. LTD SINGAPORE
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI T.P HÀ NỘI

Biologicals Additional Information Panel
Material weight: Family 2
Removable parts n.: N/A
2D Pharmacode value: N/A


GLAXOSMITHKLINE PTE. LTD SINGAPORE
VĂN PHÒNG
ĐẠI DIỆN
TẠI T.P HÀ NỘI
LOT/MFD/EXP:
Hiberix™
Diluent
Diluant
Diluyente
1 dose/dosis (0.5 ml)
Sterile diluent for reconstitution of lyophilised vaccine
Diluant stérile pour reconstitution du vaccin lyophilisé
Diluyente estéril para reconstituir la vacuna liofilizada
Inj./Inyec.: I.M.
GSK Biologicals s.a. Rixensart-Belgium
467426



Hiberix™

Haemophilus influenzae type b vaccine (Hib)/Vaccin Haemophilus influenzae type b (Hib)/Vacuna Haemophilus influenzae tipo b (Hib)

460768

1 dose/dosis (0.5 ml)
1 dose for reconstitution
1 dose à reconstituer
1 dosis a reconstituir

Inj./Inyec.: I.M.
Storage/Cons.: +2°C/+8°C

GSK Biologicals s.a.
Rixensart-Belgium

LOT/MFD/EXP:

Tem doanh nghiệp nhập khẩu

DNNK: SAPHARCO
19-20 Nguyễn Trường Tộ, Q.4, TP.HCM
DNUTNK: CT TNHH ZUELLIG PHARMA VIETNAM TP.HCM

GLAXOLINE PTE. LTD SINGAPORE
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI T.P HÀ NỘI

NHÃN PHỤ

HIBERIX

GLAXOSMITHKLINE PTE. LTD SINGAPORE
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI T.P HÀ NỘI

7cm

3,5 cm

Rx Thuốc bán theo đơn

HIBERIX

Hộp chứa 1 lọ vắc-xin đông khô (Hib), 1 bơm tiêm đóng sẵn chứa dung dịch hồi chỉnh và 2 kim tiêm. **Hỗn dịch tiêm** sau khi hoàn nguyên chứa:10 µg polysaccharide vỏ tinh chế được liên kết đồng hóa trị với khoảng 25 µg giải độc tố uốn ván. **Đường dùng:** tiêm bắp. SĐK: QLVX-XXXX-XX. **Số lô SX:** xem LOT, **NSX:** xem MFD; **HD:** xem EXP. **Nhà sản xuất vắc xin:** GlaxoSmithKline Biologicals. Rue des Aulnois, 637-59230 Saint Amand Les Eaux, France. **Nhà sản xuất dung dịch pha tiêm:** Catalent Belgium SA, Font saint Landry, 10, 1120 Brussels, Belgium. ***Nhà xuất xưởng:*** GlaxoSmithKline Biologicals SA (89 Rue de l'Institut, 1330 Rixensart, Bỉ). **Bảo quản:** +2°C đến +8°C, không để đông đá. **Chỉ định, chống chỉ định, cách dùng và các thông tin khác**: xin xem tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo. Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

HIB/SVxxxx

GLAXOSMITHKLINE PTE. LTD SINGAPORE
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI T.P HÀ NỘI

Rx

Thuốc bán theo đơn

HIBERIX™

***Haemophilus influenzae* type b (Hib) vắc xin**

THÀNH PHẦN ĐỊNH TÍNH VÀ ĐỊNH LƯỢNG

Sau khi hoàn nguyên, 1 liều (0,5ml) có chứa:

Polysaccharide của *Haemophilus influenzae* type b	10 microgram
cộng hợp với giải độc tố uốn ván (có vai trò là protein chuyên chở)	xấp xỉ 25 microgram

Hiberix™ là bột màu trắng.

Nước hồi chỉnh là chất lỏng trong và không màu.

DẠNG BÀO CHẾ

Bột vắc xin và nước hồi chỉnh để pha tiêm.

Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ vắc xin và 1 bơm tiêm đóng sẵn chứa nước hồi chỉnh và 2 kim tiêm.

ĐẶC TÍNH LÂM SÀNG

Chỉ định điều trị

Hiberix™ được chỉ định để tạo miễn dịch chủ động phòng bệnh do Hib gây ra ở trẻ từ 6 tuần tuổi trở lên.

Hiberix™ không tạo sự bảo vệ chống lại bệnh do các tuýp *H. Influenzae* khác hoặc bệnh viêm màng não do các vi khuẩn khác gây ra.

Liều lượng

Lịch tiêm chủng cơ bản gồm 3 mũi tiêm trong vòng 6 tháng tuổi đầu tiên và có thể bắt đầu từ 6 tuần tuổi (chẳng hạn vào tháng 2, 3, 4; tháng 2, 4, 6 hoặc tháng 3, 4, 5) và có thể bắt đầu từ 6 tuần tuổi. Khi dùng kết hợp với các vắc xin DTPa phối hợp của GlaxoSmithKline, lịch tiêm chủng cơ bản của ***Hiberix***™ gồm 3 mũi tiêm liều 0,5ml (chẳng hạn vào tháng 2, 4, 6; tháng 3, 4, 5; tháng $1^{1/2}$, $3^{1/2}$,6 hoặc tháng 3, $4^{1/2}$, 6).

Để đảm bảo hiệu quả bảo vệ lâu dài, nên tiêm một mũi nhắc lại trong năm tuổi thứ 2.

Trẻ từ 6 đến 12 tháng tuổi chưa được tiêm vắc xin nên tiêm 2 mũi cách nhau một tháng, sau đó tiêm nhắc lại vào năm tuổi thứ 2. Trẻ từ 1 đến 5 tuổi chưa được tiêm vắc xin, chỉ cần tiêm một mũi vắc xin.

Do phác đồ tiêm chủng khác nhau ở từng nước, lịch tiêm chủng đối với mỗi quốc gia sẽ thay đổi tùy thuộc vào khuyến cáo của quốc gia đó.

Cách sử dụng

Vắc xin sau khi hoàn nguyên được dùng để **tiêm bắp**. Tuy nhiên, theo thực hành lâm sàng tốt, những bệnh nhân giảm tiểu cầu hoặc rối loạn chảy máu nên được tiêm dưới da.

Chống chỉ định

Chống chỉ định ***Hiberix***™ cho những người đã từng quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của vắc xin hoặc những người đã từng có các biểu hiện quá mẫn khi tiêm vắc xin Hib.

Những lưu ý và thận trọng đặc biệt

Cũng như các loại vắc xin khác, nên hoãn tiêm ***Hiberix***™ cho những người sốt cao cấp tính nghiêm trọng. Tuy nhiên, không chống chỉ định tiêm vắc xin với các trường hợp có biểu hiện nhiễm khuẩn nhẹ. Tương tự như các vắc xin tiêm khác, luôn chuẩn bị sẵn phương tiện y tế và theo dõi thích hợp đề phòng trường hợp sốc phản vệ (hiếm gặp) xảy ra sau khi tiêm vắc xin. Vì lý do này, người được tiêm vắc xin nên ở lại để theo dõi về y tế trong vòng 30 phút sau khi tiêm.

Nhiễm virus gây suy giảm miễn dịch ở người (HIV) không phải là chống chỉ định đối với tiêm ***Hiberix***™.

Mặc dù đáp ứng miễn dịch giới hạn đối với giải độc tố uốn ván có thể xảy ra, tiêm phòng ***Hiberix***™ đơn không thay thế được cho tiêm phòng uốn ván thường quy.

Bài tiết kháng nguyên vỏ polysaccharide qua nước tiểu đã được ghi nhận sau khi tiêm vắc xin Hib, do vậy việc phát hiện kháng nguyên này trong vòng 1-2 tuần sau khi tiêm vắc xin có thể không có giá trị chẩn đoán đối với các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh do Hib gây ra.

Không được tiêm tĩnh mạch *Hiberix*™ **trong bất kỳ trường hợp nào.**

Nguy cơ có thể bị ngừng thở và cần thiết theo dõi hô hấp trong 48-72 giờ khi tiêm loạt chủng ngừa cơ bản cho trẻ sinh rất non (sinh dưới 28 tuần) và đặc biệt cho trẻ có tiền sử chưa hoàn chỉnh về hô hấp. Do lợi ích của chủng ngừa đối với nhóm trẻ sơ sinh này cao, vì vậy không nên bỏ hoặc trì hoãn việc chủng ngừa cho trẻ.

Người được tiêm chủng có thể bị ngất xỉu sau hoặc thậm chí trước khi tiêm. Đây là một phản ứng tâm lý đối với mũi tiêm. Điều quan trọng là nên lựa chọn địa điểm thích hợp khi tiêm để tránh bị thương do ngất xỉu.

Tương tác thuốc và các dạng tương tác khác

Có thể tiêm ***Hiberix***™ đồng thời hoặc vào bất kỳ thời điểm nào trước hoặc sau khi tiêm một vắc xin bất hoạt hoặc vắc xin sống khác.

Có thể trộn ***Hiberix***^{TM} trong cùng một bơm tiêm với **Infanrix**^{TM} (vắc xin DTPa) của GlaxoSmithKline. Những vắc xin tiêm khác thường được tiêm ở những vị trí khác nhau.

Tương tự các vắc xin khác, đáp ứng miễn dịch có thể không đạt được đầy đủ ở những bệnh nhân đang thực hiện liệu trình điều trị ức chế miễn dịch hoặc bệnh nhân suy giảm miễn dịch.

Phụ nữ có thai và cho con bú

Do ***Hiberix***^{TM} không được sử dụng ở người lớn, chưa có dữ liệu về việc sử dụng vắc xin này ở phụ nữ có thai hoặc cho con bú và nghiên cứu về khả năng sinh sản trên động vật.

Ảnh hưởng lên khả năng lái xe và vận hành máy móc

Không áp dụng.

Tác dụng không mong muốn

Dữ liệu thử nghiệm lâm sàng

Các tần suất dưới đây dựa trên nghiên cứu phân tích của gần 3000 trẻ em trong nghiên cứu Hib-097 và gần 1200 trẻ trong nghiên cứu DTPa-HBV-IPV-011.

Các tác dụng không mong muốn được báo cáo được liệt kê theo tần suất như sau:

Rất phổ biến ≥ 1/10

Phổ biến ≥ 1/100 tới < 1/10

Không phổ biến ≥ 1/10000 tới < 1/1000

Rất hiếm < 1/10000

Rối loạn dinh dưỡng và chuyển hóa

Rất phổ biến: biếng ăn

Rối loạn tâm thần

Rất phổ biến: khóc, kích thích, mất ngủ

Rối loạn hệ thống thần kinh

Rất phổ biến: buồn ngủ

Hiếm: co giật (kể cả sốt co giật)

Rối loạn tiêu hóa

Rất phổ biến: ỉa chảy

Phổ biến: nôn

Rối loạn toàn thân và tại chỗ tiêm

Rất phổ biến: sốt, sưng, đau và đỏ ở vị trí tiêm

Dữ liệu hậu mại

Rối loạn hệ miễn dịch

Rất hiếm: phản ứng dị ứng (bao gồm phản vệ và tương tự như phản vệ), phù mạch

Rối loạn hệ thần kinh

Rất hiếm: Cơn giảm trương lực, giảm phản ứng, ngất hoặc các đáp ứng thần kinh phế vị đối với tiêm.

Các rối loạn về hô hấp, ngực và trung thất

Rất hiếm: ngưng thở [xem phần "Cảnh báo và Thận trọng" đối với trường hợp bị ngưng thở ở trẻ sinh non (≤ 28 tuần thai)]

Các rối loạn về da và mô dưới da

Rất hiếm: mày đay, phát ban

Rối loạn toàn thân và tại chỗ tiêm

Rất hiếm: sưng to tại vết tiêm, chai cứng tại chỗ tiêm

Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Quá liều

Nói chung phản ứng phụ được thông báo sau khi dùng quá liều là tương tự như liều được chỉ định của vắc xin ***Hiberix***™

ĐẶC TÍNH DƯỢC LÝ

Dược lực học

Nhóm dược lý-điều trị: vắc xin vi khuẩn, mã ATC J07AG01.

Tiêm mũi cơ bản

Bảng 1 thể hiện các kết quả tính sinh miễn dịch từ 4 thử nghiệm lâm sàng mà trẻ em ở Mỹ, Châu Âu, Nam Mỹ và Đông Nam Á đã nhận 3 liều cơ bản vắc xin ***Hiberix***™ trong 6 tháng đầu tiên bắt đầu từ 6 tuần tuổi. Các lịch tiêm chủng khác nhau đều được đánh giá và Hiberix được chỉ định cùng với các vắc xin khuyến cáo thường qui khác.

Hiberix™ sinh miễn dịch ở lịch tiêm 3 liều. Nồng độ kháng thể kháng-PRP ≥ 0.15 µg/ml (mức độ bảo vệ ngắn hạn) đạt được ở 96.6 - 99 % trẻ một tháng sau khi hoàn tất phác đồ tiêm chủng.

Bảng 1: Tỉ lệ phần trăm trẻ đạt nồng độ kháng thể ≥ 0.15 µg/ml một tháng sau tiêm ngừa cơ bản với *Hiberix*™.

Nghiên cứu	Tuổi lúc tiêm ngừa 3 mũi cơ bản	N	Vắc xin được chỉ định cùng lúc	% trẻ có kháng thể kháng PRP ≥ 0.15 µg/ml (95% CI)
Hib-097	2-4-6 tháng	1590	DTPa-HBV-IPV PCV13 HRV	96.6 (95.6;97.4)
DTPw-HBV-Hib-008 PRI	2-4-6 tháng	171	DTPw-HBV	99.4 (96.8;100)
DTPa-HBV-IPV-005	3-4-5 tháng	410	DTPa-HBV-IPV hoặc DTPa-HBV-IPV + OPV (lúc liều thứ 3)	99.0 (97.5;99.7)
DTPw-HBV=Hib Kft-001	6-10-14 tuần	175	DTPw-HBV	99.4 (96.9;100)

CI: Khoảng tin cậy
DTPw-HBV: vắc xin phối hợp bạch hầu, uốn ván, ho gà (toàn tế bào) và viêm gan B
DTPa-HBV-IPV: vắc xin phối hợp bạch hầu, uốn ván, ho gà (vô bào) viêm gan B và bại liệt
HRV: Vắc xin ngừa Rotavirus
N: tổng số trẻ theo đề cương (ATP) (ngoại trừ DTPw-HBV-Hib-008: Toàn bộ đoàn hệ được tiêm ngừa)
OPV: Vắc xin bại liệt uống
PCV13:Vắc xin phế cầu cộng hợp 13 giá
PRP: Polyribosylribitol phosphate

Ngoài ra ở những trẻ 22-26 tháng (trong nghiên cứu Hib-036) được nhận một liều đơn ***Hiberix***™ tiêm cùng lúc với DTPa, 100% trẻ (N=54, 95% CI (93.4; 100)) đạt nồng độ kháng thể khángPRP ≥ 1.0 µg/ml một tháng sau khi tiêm. Dữ liệu này hỗ trợ cho việc tiêm một liều đơn ***Hiberix***™ cho trẻ em từ 1 tuổi trở lên.

Tiêm mũi nhắc lại

Đáp ứng kháng thể đối với mũi nhắc lại vắc xin ***Hiberix***™ sau phác đồ 3 liều cơ bản được thể hiện trong bảng 2. Một tháng sau mũi nhắc lại, tất cả trẻ em có nồng độ kháng PRP ≥ 0.15 µg/ml và ít nhất 99.1% có nồng độ kháng PRP ≥ 1.0 µg/ml, nồng độ liên quan đến miễn dịch dài hạn đối với vi khuẩn Hib (Bảng 2)

Bảng 2: Phần trăm trẻ đạt nồng độ kháng thể ≥ 1.0 µg/ml một tháng sau mũi tiêm nhắc với *Hiberix*™

Nghiên cứu	N	Tuổi lúc tiêm ngừa 3 mũi cơ bản	Tuổi lúc tiêm mũi nhắc	Vắc xin được chỉ định cùng lúc	% trẻ có kháng thể kháng PRP ≥ 1.0 µg/ml (95% CI)
Hib-097	336	2-4-6 tháng	15-18 tháng	DTPa	99.1 (97.4;99.8)
DTPw-HBV-Hib-008 BST	161	2-4-6 tháng	18 tháng	DTPw-HBV	99.4 (96.6;100)
DTPw-HBV=Hib Kft-003	74	6-10-14 tuần	15-18 tháng	DTPw-HBV	100% (95.1;100)

CI: Khoảng tin cậy
N: số trẻ theo đề cương nghiên cứu (ATP)
DTPa: vắc xin phối hợp bạch hầu, uốn ván, ho gà (vô bào)
DTPw-HBV: vắc xin phối hợp bạch hầu, uốn ván, ho gà (toàn tế bào) và viêm gan B
PRP: Polyribosylribitol phosphate

Dược động học

Không yêu cầu đánh giá đặc tính dược động học đối với vắc xin

Nghiên cứu lâm sàng

Xem phần *"Dược động học"*

Dữ liệu an toàn tiền lâm sàng

Không áp dụng

ĐẶC ĐIỂM DƯỢC HỌC

Danh sách tá dược

Trong vắc xin Hib đông khô: đường lactose

Trong nước hồi chỉnh: dung dịch muối vô khuẩn

Tính tương kỵ

Có thể trộn ***Hiberix***^{TM} trong cùng một bơm tiêm với ***Infanrix***^{TM} (vắc xin DTPa) của GlaxoSmithKline. Những vắc xin tiêm khác thường được tiêm ở những vị trí khác nhau.

Không nên trộn ***Hiberix***^{TM} với các vắc xin khác trong cùng một bơm tiêm (trừ những trường hợp kết hợp được cho phép).

Hạn dùng

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Thận trọng đặc biệt khi bảo quản

Nên bảo quản vắc xin đông khô ở +2°C đến +8°C và tránh ánh sáng.

Vắc xin đông khô không bị ảnh hưởng bởi đông đá.

Nước hồi chỉnh có thể được bảo quản lạnh (+2°C đến +8°C) hoặc ở nhiệt độ phòng (đến 25°C) và không để đông đá.

Bản chất và thành phần bao bì

Vắc xin đông khô là bột màu trắng đựng trong lọ thủy tinh.

Nước hồi chỉnh vô khuẩn trong và không màu trong lọ thủy tinh (được sản xuất tại Mỹ) hoặc bơm tiêm đóng sẵn.

Lọ và bơm tiêm đóng sẵn được làm bằng thủy tinh trung tính loại I, phù hợp với yêu cầu của Dược điển Châu Âu.

Hướng dẫn sử dụng

Cách sử dụng ***Hiberix***^{TM}

Vắc xin ***Hiberix***^{TM} được trình bày dưới dạng lọ chứa một viên Hib màu trắng, dung môi pha tiêm trong suốt và không màu (nước muối) đựng trong lọ thứ hai hoặc bơm tiêm đóng sẵn.

Trước khi tiêm, nên kiểm tra dung môi và vắc xin đã hoàn nguyên bằng mắt thường để xem có tiểu phân lạ và/hoặc các thay đổi cảm quan nào hay không. Phải loại bỏ dung môi hoặc vắc xin đã hoàn nguyên nếu quan sát thấy những bất thường này.

Hướng dẫn hoàn nguyên vắc xin với nước hồi chỉnh trong lọ (được sản xuất tại Mỹ).

Vắc xin ***Hiberix***^{TM} được hoàn nguyên bằng cách cho toàn bộ dung môi có trong lọ vào lọ chứa vắc xin đông khô. Sau khi cho dung môi vào, lắc kỹ để vắc xin tan hoàn toàn trong dung môi.

Vắc xin sau khi hoàn nguyên là dung dịch không màu hoặc trắng đục

Khi sử dụng lọ vắc xin đa liều, mỗi liều phải được lấy bằng một bơm và kim tiêm vô khuẩn riêng. Cũng như các vắc xin khác, mỗi liều vắc xin nên được lấy ra trong điều kiện vô khuẩn nghiêm ngặt và cần thận trọng để tránh nhiễm khuẩn cho phần vắc xin còn lại trong lọ.

Nên tiêm vắc xin ngay sau khi hoàn nguyên.


Nên dùng một kim tiêm mới để tiêm vắc xin.

Rút toàn bộ vắc xin trong lọ.

Hướng dẫn hoàn nguyên vắc xin với nước hồi chỉnh trong bơm tiêm.


Vắc xin ***Hiberix***^{TM} được hoàn nguyên bằng cách cho toàn bộ dung môi có trong bơm tiêm vào lọ chứa vắc xin đông khô

Để gắn kim tiêm vào bơm tiêm, tham khảo hình vẽ dưới đây. Tuy nhiên bơm tiêm được cung cấp với vắc xin ***Hiberix***^{TM} có thể khác với bơm tiêm mô tả trong hình vẽ:




Nắp bảo vệ kim tiêm bơm tiêm

Piton



Nắp bơm tiêm

Thân



1. Giữ thân bơm tiêm bằng một tay (tránh cầm vào piton). Mở nắp đậy bơm tiêm bằng cách xoay ngược chiều kim đồng hồ.
2. Gắn kim vào bơm tiêm, vặn kim theo chiều kim đồng hồ cho tới khi nó được gắn chặt.
3. Gỡ bỏ nắp bảo vệ kim tiêm, một số trường hợp sẽ hơi chặt.

Vắc xin được hoàn nguyên bằng cách cho toàn bộ dung môi có trong bơm tiêm vào lọ chứa viên vắc xin đông khô.

Sau khi cho dung môi vào, lắc kỹ để viên vắc xin tan hoàn toàn trong dung môi.

Vắc xin sau khi hoàn nguyên là dung dịch không màu hoặc trắng đục

Nên tiêm vắc xin ngay sau khi hoàn nguyên.

Nên dùng một kim tiêm mới để tiêm vắc xin.

Rút toàn bộ vắc xin trong lọ.

Cách trộn Hiberix™ với Infanrix™

Vắc xin ***Hiberix***^{TM} có thể hoàn nguyên với ***Infanrix***^{TM} để sử dụng cùng lúc trong một mũi tiêm.

Infanrix^{TM} được trình bày ở dạng hỗn dịch. Trong quá trình bảo quản có thể quan sát thấy lớp tủa trắng với phần nước nổi trong bên trên. Trước khi tiêm, phải lắc kỹ vắc xin để có được hỗn dịch trắng đục đồng nhất và phải quan sát xem có tiểu phân lạ và/hoặc những thay đổi cảm quan nào hay không. Nếu có thì phải loại bỏ vắc xin.

Loại bỏ nước hồi chỉnh vô khuẩn được cung cấp kèm theo ***Hiberix***^{TM}.

Vắc xin kết hợp DTPa-Hib được hoàn nguyên bằng cách bơm toàn bộ phần chứa trong lọ đơn liều ***Infanrix***^{TM} vào lọ đơn liều đựng bột vắc xin ***Hiberix***^{TM} màu trắng. Sau khi thêm ***Infanrix***^{TM} vào bột ***Hiberix***^{TM}, hỗn hợp này phải được lắc kỹ cho đến khi viên ***Hiberix***^{TM} tan hoàn toàn trong huyền dịch ***Infanrix***^{TM}

Trước khi tiêm, vắc xin phối hợp sau khi hoàn nguyên cần được kiểm tra bằng mắt thường xem có tiểu thể lạ và/hoặc thay đổi cảm quan nào hay không. Nếu có phải bỏ lọ vắc xin vừa hoàn nguyên.

Nên tiêm vắc xin ngay sau khi hoàn nguyên.

Nên dùng một kim tiêm mới để tiêm vắc xin. Rút toàn bộ phần vắc xin chứa trong lọ để tiêm.

Sản phẩm hoặc nguyên vật liệu không được sử dụng nên được hủy bỏ theo quy định của địa phương.

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SỸ.

Không phải tất cả các dạng trình bày đều có ở mọi quốc gia.

Nhà sản xuất vắc xin:

GlaxoSmithKline Biologicals
Rue des Aulnois, 637

59230 Saint Amand Les Eaux, France

Nhà sản xuất dung dịch pha tiêm :

Catalent Belgium SA
Font saint Landry, 10, 1120 Brussels, Belgium

Nhà xuất xưởng:

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

89 Rue de L'Institute,1330 Rixensart, Belgium.

***Hiberix*, *Infanrix* là nhãn hiệu thương mại của GSK Group of companies**

Dựa trên IPI phiên bản 07 (23/06/2015)

HIB 1215-IPI07/230615

Ngày xem xét sửa đổi, cập nhật lại nội dung hướng dẫn sử dụng vắc xin: 18/06/2016

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

TUQ CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Thu Thủy