BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
Lần đầu: 17/03/2017

SANOFI
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

℞ **Thuốc bán theo đơn**

POLYSACCHARIDE MENINGOCOCCAL A+C VACCINE
Vắc-xin Não Mô Cầu nhóm A và nhóm C polysaccharide

Đọc kỹ tờ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Để xa tầm tay trẻ em.
Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

THÀNH PHẦN

Trong mỗi liều vắc-xin đông khô:

- Polysaccharide của *Neisseria meningitidis* nhóm A ..... 50 mcg
- Polysaccharide của *Neisseria meningitidis* nhóm C ..... 50 mcg
- Lactose ..... 2,0 mg

Trong mỗi liều 0,5 ml dung môi

- Sodium chloride ..... 4,15 mg
- Disodium phosphate dihydrate ..... 0,065 mg
- Sodium dihydrogen phosphate dihydrate ..... 0,023 mg
- Nước pha tiêm ..... đến 0,5 ml

DẠNG BÀO CHẾ

Vắc-xin bột đông khô và dung môi được nạp sẵn trong bơm tiêm, hoàn nguyên thành hỗn dịch tiêm.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

Hộp 1 lọ 1 liều vắc-xin bột đông khô và 1 bơm tiêm nạp sẵn 0,5 ml dung môi.

ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC

Vắc-xin này được điều chế từ polysaccharide tinh chế của vi khuẩn Não mô cầu *Neisseria meningitidis* nhóm huyết thanh A và C.

Vắc-xin tạo ra kháng thể ở mức độ bảo vệ đối với 2 nhóm huyết thanh này từ ngày thứ 7 sau khi tiêm.

ĐẶC TÍNH DƯỢC ĐỘNG HỌC

Không áp dụng.

CHỈ ĐỊNH

Vắc-xin này được chỉ định để tạo miễn dịch chủ động phòng các bệnh nhiễm khuẩn xâm lấn do Não Mô Cầu (*Neisseria meningitidis*) nhóm huyết thanh A và C ở người lớn và trẻ em từ 2 tuổi trở lên (xem thêm "CÁC CẢNH BÁO VÀ TRƯỜNG HỢP THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC").

Việc sử dụng POLYSACCHARIDE MENINGOCOCCAL A+C VACCINE phải dựa trên các khuyến cáo chính thức.

LIỀU DÙNG

Người lớn và trẻ em từ hai tuổi trở lên: một liều (0,5 ml) vắc-xin đã hoàn nguyên.

Có thể tính đến việc tái chủng sau 2 đến 4 năm (trung bình là 3 năm) sau liều cơ bản, nhưng không được sớm hơn 1 năm kể từ khi tiêm liều cơ bản.

Xem xét việc tái chủng khi đối tượng có tăng nguy cơ phơi nhiễm dựa trên dữ liệu về tình hình dịch tễ của địa phương, tuổi của đối tượng và bệnh nền sẵn có. Cần tái chủng sớm nếu:

- Đối tượng được tiêm mũi đầu tiên khi chưa đến 4 tuổi, hay
- Còn có nguy cơ xảy ra dịch Não Mô Cầu, hay
- Đối tượng có khả năng phơi nhiễm với Não Mô Cầu nhóm C

Khi có 2 yếu tố này trở lên thì đối tượng đang có nguy cơ cao và cần phải tái chủng.

Có thể cần thiết phải tái chủng vắc xin này nhiều lần nếu đối tượng vẫn còn có nguy cơ cao bị nhiễm bệnh do Não Mô Cầu nhóm A hoặc nhóm C gây ra.

CÁCH DÙNG

Tiêm bắp hoặc tiêm dưới da.

Thường tiêm ở mặt trước-bên của đùi đối với trẻ em dưới 12 tháng tuổi và ở vùng cơ Delta đối với những người lớn hơn 12 tháng tuổi.

(xem thêm "CÁC CẢNH BÁO VÀ TRƯỜNG HỢP THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC")

Vắc-xin phải được để ở nhiệt độ phòng trong vài phút trước khi tiêm.

Chỉ hoàn nguyên vắc-xin với dung môi kèm theo:

- Hòa tan vắc-xin bột đông khô trong lọ bằng dung môi kèm theo. Sự hòa tan diễn ra ngay tức thì.
- Sau khi hoàn nguyên, vắc-xin là chất lỏng không màu, trong suốt hay hơi đục.
- Dùng ngay sau khi hoàn nguyên

Các sản phẩm không còn sử dụng hay thải bỏ cần phải được xử lý theo quy định hiện hành.

Trong mọi trường hợp, không được trộn lẫn vắc-xin này với các vắc-xin khác hay dược phẩm khác. (xem thêm "**Tương tác thuốc / Sử dụng cùng với các vắc-xin khác**").

Nếu tiêm cùng lúc với vắc-xin hay dược phẩm khác thì phải dùng bơm kim tiêm khác và tiêm tại vị trí khác nhau.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không được dùng POLYSACCHARIDE MENINGOCOCCAL A+C VACCINE nếu:

- Bị dị ứng với bất kỳ một thành phần nào của vắc-xin,

- Trước đây đã từng bị phản ứng nghiêm trọng khi tiêm vắc-xin này

CÁC CẢNH BÁO VÀ TRƯỜNG HỢP THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC

Trường hợp bị sốt cao hoặc bị bệnh cấp tính: nên hoãn tiêm vắc-xin.

Không được tiêm vào mạch máu: phải chắc chắn rằng kim tiêm không đâm vào mạch máu.

Không được tiêm trong da.

Như khi dùng các vắc-xin bằng đường tiêm khác, phải chú ý theo dõi để xử trí ngay khi bị phản ứng phản vệ xảy ra sau khi tiêm vắc-xin mặc dù hiếm gặp. Phải chuẩn bị sẵn các phương tiện điều trị nội khoa thích hợp

Vắc-xin này không bảo vệ phòng bệnh do Não Mô Cầu nhóm B hoặc do các týp huyết thanh khác của *Neisseria meningitidis* (Não Mô Cầu), các vi khuẩn gây bệnh viêm màng não khác (*Haemophilus influenzae* týp b, *Streptococcus pneumoniae,* ...).

Đối với Não Mô Cầu nhóm A: trong trường hợp có dịch hay nguy cơ có dịch, vắc-xin này có thể dùng ở trẻ từ sáu tháng tuổi trở lên nếu cần thiết phải bảo vệ phòng ngừa viêm màng não do Não Mô Cầu nhóm A,

Đối với Não Mô Cầu nhóm C: nên dùng vắc-xin phòng Não mô cầu nhóm C dạng cộng hợp (conjugated) ở trẻ dưới 2 tuổi.

Dùng thuốc cho phụ nữ có thai hay đang cho con bú sữa mẹ

Phụ nữ có thai

Chưa xác định được tính an toàn của POLYSACCHARIDE MENINGOCOCCAL A+C VACCINE trên phụ nữ mang thai.

Tuy nhiên, không chống chỉ định tiêm vắc-xin này ở phụ nữ mang thai sau 3 tháng đầu tiên của thai kỳ và có thể tiêm trong trường hợp có nguy cơ bị lây nhiễm bệnh cao.

Cho con bú sữa mẹ

Chưa đánh giá được tác động của việc tiêm vắc-xin lên sữa mẹ.

Ảnh hưởng của thuốc đối với việc vận hành máy móc, lái tàu xe

Hiếm gặp co giật sau khi tiêm ngừa. Co giật ảnh hưởng tạm thời đến khả năng lái xe và sử dụng máy móc.

TƯƠNG TÁC CỦA THUỐC

POLYSACCHARIDE MENINGOCOCCAL A+C VACCINE có thể dùng cùng lúc với vắc-xin uốn ván, bạch hầu, bại liệt bất hoạt, thương hàn dạng polysaccharide, hay BCG với điều kiện phải dùng bơm kim tiêm khác nhau và tiêm tại một vị trí khác (nên tiêm tại một chi khác).

Trong mọi trường hợp, không được trộn chung với các vắc-xin dùng đường tiêm khác hay các thuốc khác.

Trường hợp phải tiêm cùng lúc, thì phải dùng bơm kim tiêm khác và tiêm ở vị trí khác.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Các tác dụng không mong muốn được xếp theo nhóm và tần số xuất hiện và áp dụng quy ước sau: .

Rất thường gặp: ≥ 10%
Thường gặp: ≥ 1% và < 10%
Không thường gặp: ≥ 0,1% và < 1%
Hiếm gặp: ≥ 0,01% và < 0,1%
Rất hiếm gặp: < 0,01%, bao gồm cả những báo cáo riêng lẽ.

Các tác dụng không mong muốn được báo cáo trong các thử nghiệm lâm sàng và trong quá trình lưu hành sản phẩm.

Các dữ liệu được phân loại theo qui ước MedDRA và theo tần số giảm dần.

Dữ liệu từ các thử nghiệm lâm sàng

Rối loạn dạ dày – ruột
Thường gặp: tiêu chảy.

Rối loạn hệ thần kinh
Rất thường gặp: đau đầu.

Rối loạn toàn thân và tại nơi tiêm
Rất thường gặp: các phản ứng tại nơi tiêm (đau thoáng qua, đôi khi kèm với sưng, đỏ), suy nhược, dễ bị kích thích.
Thường gặp: tăng thân nhiệt (≥ 38°C).

Trong quá trình lưu hành sản phẩm

Ngoài các tác dụng không mong muốn kể trên, trong quá trình lưu hành sản phẩm các tác dụng không mong muốn sau đây được báo cáo với tần số rất hiếm. Không thể tính toán chính xác tỉ lệ mắc vì các tác dụng không mong muốn này được báo cáo một cách tự phát từ một quần thể không xác định được số lượng.

Rối loạn hệ miễn dịch
Các phản ứng kiểu dị ứng (phát ban, mày đay, ban đỏ) hay các phản ứng phản vệ.

Rối loạn chuyển hóa và dinh dưỡng
Biếng ăn.

Rối loạn dạ dày – ruột
Nôn.

Rối loạn hệ thần kinh
Chứng kích thích màng não, co giật, dị cảm.

Rối loạn cơ – xương và mô liên kết
Đau cơ, đau khớp.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ

Không có tài liệu.

BÁO CÁO CÁC PHẢN ỨNG BẤT LỢI ĐÁNG NGỜ

Việc báo cáo các phản ứng bất lợi đáng ngờ sau khi sản phẩm thuốc được cấp phép lưu hành là rất quan trọng. Điều này cho phép tiếp tục theo dõi cân bằng lợi ích/nguy cơ của sản phẩm thuốc, Nhân viên y tế được yêu cầu báo cáo mọi phản ứng bất lợi nghi ngờ qua hệ thống báo cáo

quốc gia đến Trung tâm Quốc gia về thông tin thuốc và theo dõi phản ứng có hại của thuốc theo địa chỉ email : di.pvcenter@gmail.com

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN

Để xa tầm tay và tầm mắt của trẻ em.

Bảo quản ở nhiệt độ từ +2°C đến +8°C (trong tủ lạnh).

Không được để đông băng.

Bảo quản trong hộp để tránh ánh sáng chiếu trực tiếp vào vắc-xin.

TUỔI THỌ - HẠN DÙNG

Tuổi thọ: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Xem ngày hết hạn dùng "EXP" trên bao bì. Không sử dụng sau hạn dùng được ghi trên bao bì.

Vắc-xin phải được dùng ngay sau khi hoàn nguyên.

TÊN VÀ ĐỊA CHỈ CƠ SỞ SẢN XUẤT

SANOFI PASTEUR S.A.

Trụ sở chính: 2 avenue Pont Pasteur, 69007 Lyon – Pháp.

Sản xuất bởi SANOFI PASTEUR S.A. tại 1541 avenue Marcel Mérieux, 69280 Marcy l'Etoile – Pháp (địa điểm 1) / Parc Industriel d'Incarville, 27100 Val de Reuil – Pháp (địa điểm 2).

NGÀY PHÊ DUYỆT:

MENINGOCOCCAL A+C POLYSACCHARIDE VACCINE

Nội dung nhãn phụ

℞ **Thuốc bán theo đơn**

POLYSACCHARIDE MENINGOCOCCAL A+C VACCINE
VẮC-XIN NÃO MÔ CẦU TÝP A VÀ TÝP C POLYSACCHARIDE

Hộp 1 lọ 1 liều vắc-xin dạng bột + 1 bơm tiêm nạp sẵn 0,5 ml dung môi.

Hoạt chất: một liều 0,5 ml vắc-xin đã hoàn nguyên chứa:

- 50 mcg polysaccharide của *Neisseria meningitidis* týp A.
- 50 mcg polysaccharide của *Neisseria meningitidis* týp C.

Tiêm bắp hay tiêm dưới da. Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và các thông tin khác: xem trong tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Để xa tầm tay trẻ em. Bảo quản trong tủ lạnh (+2^{0}C đến +8^{0}C). Không được để đông băng. Để trong hộp giấy, tránh ánh sáng.

Tiêu chuẩn SX:TCCS.

Số lô SX, NSX và HD: xem LOT, MANUF và EXP trên bao bì. Ngày hết hạn là ngày cuối cùng của tháng hạn dùng (EXP.) trên bao bì.

SX bởi SANOFI PASTEUR S.A. tại 1541 avenue Marcel Mérieux, 69280 Marcy l'Etoile – Pháp (địa điểm 1) / Parc Industriel d'Incarville, 27100 Val de Reuil – Pháp (địa điểm 2).

DNNK: Số ĐK:

CÔNG TY SANOFI PASTEUR S.A. VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


MENINGOCOCCAL A+C POLYSACCHARIDE VACCINE

Nhãn phụ kích thước 22 x 140 mm

℞ Thuốc bán theo đơn
POLYSACCHARIDE MENINGOCOCCAL A+C VACCINE
VẮC-XIN NÃO MÔ CẦU TÝP A VÀ TÝP C POLYSACCHARIDE
Hộp 1 lọ 1 liều vắc-xin dạng bột + 1 bơm tiêm nạp sẵn 0,5 ml dung môi.
Hoạt chất: một liều 0,5 ml vắc-xin đã hoàn nguyên chứa:
- 50 mcg polysaccharide của *Neisseria meningitidis* týp A.
- 50 mcg polysaccharide của *Neisseria meningitidis* týp C.

Tiêm bắp hay tiêm dưới da. Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và các thông tin khác: xem trong tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo. **Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Để xa tầm tay trẻ em. Bảo quản trong tủ lạnh (+2^{0}C đến +8^{0}C). Không được để đông băng. Để trong hộp giấy, tránh ánh sáng.** Tiêu chuẩn SX: TCCS. Số lô SX, NSX và HD: xem LOT, MANUF và EXP trên bao bì. Ngày hết hạn là ngày cuối cùng của tháng hạn dùng (EXP.) trên bao bì. SX bởi SANOFI PASTEUR S.A. tại 1541 avenue Marcel Mérieux, 69280 Marcy l'Etoile – Pháp (địa điểm 1) / Parc Industriel d'Incarville, 27100 Val de Reuil – Pháp (địa điểm 2).

DNNK: Số ĐK:



VI 18/09/2012 - CF

Code article : 965340

Sanofi Pasteur F/A

09653405

Repères d'arêtes n° : 33 - 12

Etui - A/111 - Dim. int. : 48,5 x 22,5 x 141,5

3 REF. PANTONE :

Reflex Blue C (texte + RA + Logo)

(Demi-soleil) Tracé

2577 C (Dégradé)

Pantone 355 C

VACCIN
MENINGOCOCCIQUE
A+C POLYOSIDIQUE
1 flacon 1 dose + 1 seringue solvant

EXP:

LOT:

MANUF:

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
Lire attentivement la notice avant utilisation.
A conserver entre + 2°C et + 8°C (au réfrigérateur).
Ne pas congeler.
A conserver dans l'emballage extérieur à l'abri de la lumière.
Après reconstitution, une utilisation immédiate est recommandée. Tout produit non utilisé ou déchet doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur.

Keep out of the reach and sight of children.
Read the leaflet carefully before use.
Store in a refrigerator (2°C - 8°C). Do not freeze.
Store in the outer carton. Protect from light.
The vaccine should be used immediately after reconstitution. Any unused product or waste material should be disposed of in accordance with local requirements.

SANOFI PASTEUR SA
2, avenue Pont Pasteur
69007 Lyon - France

POLYSACCHARIDE MENINGOCOCCAL A+C VACCINE
1 vial 1 dose + 1 syringe of diluent

SANOFI PASTEUR S.A.
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Composition en substances actives :
Une dose (0,5 ml) de vaccin reconstitué contient :
– polyoside de *Neisseria Meningitidis* groupe A ..... 50 microgrammes
– polyoside de *Neisseria Meningitidis* groupe C ..... 50 microgrammes

Liste des excipients :
Solvant : chlorure de sodium, phosphate disodique dihydraté, phosphate monosodique, eau pour préparations injectables.
Poudre : lactose monohydraté.

049 965340

VACCIN MENINGOCOCCIQUE A+C POLYOSIDIQUE
POLYSACCHARIDE MENINGOCOCCAL A+C VACCINE

Poudre et solvant pour suspension injectable en seringue préremplie
Powder and diluent for suspension for injection in a prefilled syringe

1 flacon 1 dose + 1 seringue solvant
1 vial 1 dose + 1 syringe of diluent
Voie intramusculaire ou sous-cutanée
Intramuscular or subcutaneous route

SANOFI PASTEUR

Composition of active substances:
One dose (0.5 ml) of reconstituted vaccine contains:
– polysaccharide of *Neisseria Meningitidis* group A ..... 50 micrograms
– polysaccharide of *Neisseria Meningitidis* group C ..... 50 micrograms

List of excipients:
Diluent: sodium chloride, disodium phosphate dihydrate, monosodium phosphate, water for injection.
Powder: monohydrate lactose.

VI 18/09/2012 - CF

Code article : **965340**

Sanofi Pasteur
F/A

09653405

Repères d'arêtes n° : 33 - 12

Etui - A/111 - Dim. int. : 48,5 x 22,5 x 141,5

3 REF. PANTONE :
Reflex Blue C (texte + RA + Logo)
2577 C (Dégradé)
Pantone 355 C
(Demi-soleil)
Tracé

049 966930

Exp.

Lot :

Manuf. :


VACCIN MENINGOCOCCIQUE A+C POLYOSIDIQUE/ POLYSACCHARIDE MENINGOCOCCAL A+C VACCINE

Poudre pour suspension injectable
Powder for suspension for injection
1 dose
Voie intramusculaire ou sous-cutanée
Intramuscular or subcutaneous route
Sanofi Pasteur


SANOFI PASTEUR S.A. CÔNG TY
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

GAB SPE 22x44 FL
version 1 du 16/12/2008

1100 + 1300 - SSA

VI	21/01/2013 - CT
Code article : 966930	Sanofi Pasteur XFA
Etiquette : ☐ seringue ■ flacon ☐ ampoule	
Dimension : 22 x 44 mm	
SPECIFICITE(S) MLE	
SPECIFICITE(S) VDR * Laque laser VDR	

3 REF. PANTONE :
Black C (Texte)
355C (Bandeau supérieur)
2577C (Bandeau inférieur)
* Laque laser VDR



SOLVANT/DILUENT
pour/for 0,5 ml
VACCIN MENINGOCOCCIQUE A+C POLYOSIDIQUE
POLYSACCHARIDE MENINGOCOCCAL A+C VACCINE

Suspension injectable
Suspension for injection
Sanofi Pasteur

Lot :

EXP :

070 966940

CÔNG TY SANOFI PASTEUR S.A.
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

TUQ CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Thu Thủy

VI	21/01/2013 - CT
Code article 966940	Sanofi Pasteur XFA
SPECIFICITE(S) MLE	SPECIFICITE(S) VDR * Laque laser VDR
Dim. int. : 19 x 38 mm	
■ seringue ☐ flacon ☐ ampoule	
3 Ref. Pantone C : Black C (Textes) 2577C (Bandeau Sup.) Cyan C (Bandeau Inf.) Tracé * Laque laser VDR	

