BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
Lần đầu: 27/3/2017

VI	11/09/2012 - CF
Code article : **965170**	Sanofi Pasteur **F/A/E**
09651708	Repères d'arêtes n° : **4-9**
Dim. int. : 31,5 x 22,5 x 128,5 mm	
2 REF. PANTONE : Reflex Blue C (Textes + RA + Logo) Green C (Dégradé + Demi-soleil) Tracé	

CÔNG TY SANOFI PASTEUR
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TETAVAX
1 seringue/syringe/jeringa - 0,5 ml
1 dose/dosis

SANOFI PASTEUR SA - 2, avenue Pont Pasteur - 69007 Lyon – France/Francia

MANUF.:
LOT:
EXP.:

℞ Thuốc bán theo đơn
TETAVAX (VẮC-XIN UỐN VÁN HẤP PHỤ)
Hỗn dịch tiêm. Hộp 1 bơm tiêm nạp sẵn 1 liều (0,5 ml).
Hoạt chất trong mỗi liều 0,5 ml: Giải độc tố uốn ván ≥ 40 I.U. **Tiêm bắp hay tiêm dưới da sâu.** Chỉ định, chống chỉ định, cách dùng và các thông tin khác: đề nghị xem trong tờ hướng dẫn sử dụng.
Đọc kỹ tờ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Bảo quản ở nhiệt độ từ +2°C đến +8°C (trong tủ lạnh).

Không để đông băng. Để xa tầm tay và tầm nhìn của trẻ em.
Tiêu chuẩn SX: TCCS. Số lô SX, NSX, và HD: xem LOT, MANUF. và EXP. trên bao bì. Ngày hết hạn là ngày 01 của tháng HD (EXP.) in trên bao bì.
SX bởi SANOFI PASTEUR S.A. tại Campus Mérieux, 1541 avenue Marcel Mérieux, 69280 Marcy l'Etoile – Pháp (địa điểm 1) / Parc Industriel d'Incarville, 27100 Val de Reuil – Pháp (địa điểm 2).
DNNK: Số ĐK:

TETAVAX
1 seringue/syringe/jeringa - 0,5 ml
1 dose/dosis

Composition en substances actives :
Une dose (0,5 ml) contient :
Anatoxine tétanique ..... ≥ 40 U.I.
adsorbée sur hydroxyde d'aluminium hydraté ..... 0,6 mg Al
Liste des excipients :
- Excipients à effet notoire : Potassium (phosphate monopotassique)
- Autres excipients : solution tampon contenant du chlorure de sodium, du phosphate disodique dihydraté, et de l'eau pour préparations injectables.

Lire attentivement la notice avant utilisation.
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
Agiter avant emploi.
A conserver au réfrigérateur (entre 2°C et 8°C). Ne pas congeler.
Ce vaccin est préconisé dans la prévention du tétanos.

344 965170

TETAVAX

VACCIN TÉTANIQUE ADSORBÉ
ADSORBED TETANUS VACCINE
VACUNA ANTITETÁNICA ADSORBIDA

Suspension injectable en seringue préremplie de 0,5 ml. Boîte de 1. Voie intramusculaire ou sous-cutanée profonde
Suspension for injection in prefilled syringe of 0.5 ml. Box of 1. Intramuscular or deep subcutaneous route
Suspensión inyectable en jeringa precargada de 0,5 ml. Caja de 1. Vía intramuscular o subcutánea profunda

SANOFI PASTEUR

Statement of active substances:
One dose (0.5 ml) contains:
Tetanus toxoid ..... ≥ 40 I.U.
adsorbed on hydrated aluminium hydroxide ..... 0.6 mg Al
List of excipients:
- Excipients with recognised effect: Potassium (monopotassium phosphate)
- Other excipients: buffer solution containing sodium chloride, disodium dihydrate phosphate, and water for injections.

Read the package insert before use.
Keep out of the reach and sight of children.
Shake before use.
Store in a refrigerator (2°C - 8°C). Do not freeze.
This vaccine is indicated in the prevention of tetanus.

VI	11/09/2012 - CF
Code article : **965170**	Sanofi Pasteur **F/A/E**
09651708	Repères d'arêtes n° : **4-9**
Dim. int. : 31,5 x 22,5 x 128,5 mm	
2 REF. PANTONE : **Reflex Blue C (Textes + RA + Logo)** **Green C (Dégradé + Demi-soleil)** **Tracé**	

CÔNG TY SANOFI PASTEUR S.A.
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TETAVAX
1 seringue/syringe/jeringa - 0,5 ml
1 dose/dosis

SANOFI PASTEUR SA - 2, avenue Pont Pasteur - 69007 Lyon – France/Francia

EXP.:
LOT:
MANUF.:

Principios activos :
Una dosis (0,5 ml) contiene :
Toxoide tetánico ..... ≥ 40 U.I.
adsorbido en hidróxido de aluminio hidratado ..... 0,6 mg Al
Lista de excipientes :
- Excipientes con efecto conocido: Potasio (fosfato monopotásico)
- Otros excipientes: solución tampón compuesta por cloruro de sodio, fosfato disódico dihidratado, y agua para inyectables.

Leer el prospecto antes de utilizar.
Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños.
Agitar antes de utilizar.
Conservar en el refrigerador (entre 2°C y 8°C). No congelar.
Esta vacuna está recomendada en la prevención del tétanos.

TETAVAX
1 seringue/syringe/jeringa - 0,5 ml
1 dose/dosis

Composition en substances actives :
Une dose (0,5 ml) contient :
Anatoxine tétanique ..... ≥ 40 U.I.
adsorbée sur hydroxyde d'aluminium hydraté ..... 0,6 mg Al
Liste des excipients :
- Excipients à effet notoire : Potassium (phosphate monopotassique)
- Autres excipients : solution tampon contenant du chlorure de sodium, du phosphate disodique dihydraté, et de l'eau pour préparations injectables.

Lire attentivement la notice avant utilisation.
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
Agiter avant emploi.
A conserver au réfrigérateur (entre 2°C et 8°C). Ne pas congeler.
Ce vaccin est préconisé dans la prévention du tétanos.

344 965170

TETAVAX


VACCIN TÉTANIQUE ADSORBÉ
ADSORBED TETANUS VACCINE
VACUNA ANTITETÁNICA ADSORBIDA

Suspension injectable en seringue préremplie de 0,5 ml. Boîte de 1. Voie intramusculaire ou sous-cutanée profonde
Suspension for injection in prefilled syringe of 0.5 ml. Box of 1. Intramuscular or deep subcutaneous route
Suspensión inyectable en jeringa precargada de 0,5 ml. Caja de 1. Vía intramuscular o subcutánea profunda

SANOFI PASTEUR


Statement of active substances:
One dose (0.5 ml) contains:
Tetanus toxoid ..... ≥ 40 I.U.
adsorbed on hydrated aluminium hydroxide ..... 0.6 mg Al
List of excipients:
- Excipients with recognised effect: Potassium (monopotassium phosphate)
- Other excipients: buffer solution containing sodium chloride, disodium dihydrate phosphate, and water for injections.

Read the package insert before use.
Keep out of the reach and sight of children.
Shake before use.
Store in a refrigerator (2°C - 8°C). Do not freeze.
This vaccine is indicated in the prevention of tetanus.



VI	22/01/2013 - CT
Code article : 966970	Sanofi Pasteur F/A/E
Etiquette : ■ seringue □ flacon □ ampoule	
Dimension : 19 x 38 mm	
2 REF. PANTONE :	Black C Green C (Aplat) Tracé

CÔNG TY SANOFI PASTEUR S.A
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



℞ **Thuốc này chỉ dùng theo đơn của bác sĩ**

TETAVAX

VẮC-XIN UỐN VÁN HẤP PHỤ

Hãy đọc toàn bộ thông tin trong tờ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng vắc-xin này. Tờ hướng dẫn sử dụng chứa những thông tin quan trọng liên quan đến việc điều trị.

- Nếu có thắc mắc hay câu hỏi, hãy hỏi bác sĩ hay dược sĩ.
- Hãy giữ lại tờ hướng dẫn sử dụng này. Có thể cần đọc lại tờ hướng dẫn sử dụng này.
- Nếu cần thêm thông tin hay lời khuyên, hãy hỏi bác sĩ hay dược sĩ.
- Nếu triệu chứng trở nên nặng hơn hay không khỏi bệnh thì phải đi khám bác sĩ ngay.
- Nếu bất kỳ một tác dụng không mong muốn nào trở nên nặng hơn hay gặp tác dụng không mong muốn chưa được đề cập đến trong tờ hướng dẫn sử dụng này thì phải báo với bác sĩ hay dược sĩ.

THÀNH PHẦN

Hoạt chất:

1 liều (0,5 ml) chứa:

Giải độc tố uốn ván ..... ≥ 40 I.U.

Hấp phụ trên hydroxyt nhôm hydrat hóa ..... 0,6 mg Al

Các thành phần khác:

Dung dịch đệm chứa sodium chloride, disodium dihydrate phosphate, monopotassium phosphate và nước pha tiêm.

DẠNG DƯỢC PHẨM:

Hỗn dịch tiêm.

ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌc

Vắc-xin này được điều chế từ độc tố uốn ván được khử độc bằng formaldehyt và tinh chế.

Đáp ứng miễn dịch được hoạt hóa từ liều thứ hai; được tăng cường sau liều thứ ba và tồn tại trong 5 đến 10 năm sau liều thứ tư.

ĐẶC TÍNH DƯỢC ĐỘNG HỌC

Không áp dụng.

CHỈ ĐỊNH

Vắc-xin này để phòng ngừa bệnh uốn ván, cụ thể trong các trường hợp sau:

- Tiêm phòng uốn ván sau phơi nhiễm: đối với các vết thương mới bị có nguy cơ nhiễm bào tử uốn ván ở những người trước đây chưa tiêm các liều cơ bản của đợt sơ chủng hay đã tiêm nhưng tiêm không đầy đủ theo lịch tiêm sơ chủng hay không biết chắc chắn lịch tiêm chủng của mình,
- Phòng ngừa uốn ván sơ sinh: phụ nữ trong tuổi sinh đẻ hay đang mang thai nhưng chưa được chủng ngừa uốn ván tại các nước có tỷ lệ uốn ván sơ sinh cao,
- Các liều cơ bản của đợt sơ chủng,
- Tiêm nhắc lại.

LIỀU DÙNG, CÁCH DÙNG VÀ ĐƯỜNG DÙNG TETAVAX

Liều dùng:

Tiêm vắc-xin phòng bệnh uốn ván sau phơi nhiễm.

Nên tuân theo phác đồ được khuyến cáo sau đây:

LOẠI VẾT THƯƠNG	NGƯỜI CHƯA CHỦNG NGỪA HAY CHỦNG NGỪA KHÔNG ĐẦY ĐỦ	NGƯỜI CHỦNG NGỪA ĐẦY ĐỦ Thời gian tính từ mũi tiêm nhắc lần cuối cùng	
		5 đến 10 năm	> 10 năm
Vết thương nhỏ - sạch	Bắt đầu hay hoàn tất việc chủng ngừa: Giải độc tố uốn ván, 1 liều 0,5 ml	Không xử trí gì thêm	Giải độc tố uốn ván: 1 liều 0,5 ml
Vết thương lớn - sạch hay có nguy cơ bị nhiễm uốn ván	Một tay: Globulin miễn dịch kháng uốn ván có nguồn gốc từ người, 250 IU* Tay còn lại: Giải độc tố uốn ván**: 1 liều 0,5 ml	Giải độc tố uốn ván: 1 liều 0,5 ml	Một tay: Globulin miễn dịch kháng uốn ván có nguồn gốc từ người, 250 IU* Tay còn lại: Giải độc tố uốn ván**: 1 liều 0,5 ml
Nguy cơ bị nhiễm uốn ván Đến trễ, cắt lọc chưa hết mô hoại tử	Một tay: Globulin miễn dịch kháng uốn ván có nguồn gốc từ người, 500 IU* Tay còn lại: Giải độc tố uốn ván**: 1 liều 0,5 ml Điều trị kháng sinh	Giải độc tố uốn ván: 1 liều 0.5 ml Điều trị kháng sinh	Một tay: Globulin miễn dịch kháng uốn ván có nguồn gốc từ người, 500 IU * Tay còn lại: Giải độc tố uốn ván**: 1 liều 0,5 ml Điều trị kháng sinh

* Dùng kim và bơm tiêm khác và tiêm ở vị trí khác

** Hoàn tất việc chủng ngừa theo phác đồ

Phòng ngừa uốn ván sơ sinh:

Phụ nữ trong tuổi sinh đẻ và phụ nữ có thai nhưng trước đây chưa chủng ngừa uốn ván thì phải tiêm 2 liều liên tiếp, cách nhau ít nhất 4 tuần; Đối với phụ nữ có thai, liều đầu tiên phải tiêm trước ngày dự sinh ít nhất là 90 ngày.

***Các liều cơ bản của đợt sơ chủng*:**

Người lớn khi cần tiêm ngừa uốn ván thì tiêm 2 liều liên tiếp, cách nhau từ 1 hay 2 tháng và liều nhắc lại sau liều thứ hai 6 đến 12 tháng.

Tiêm nhắc:

10 năm sau khi hoàn tất đợt sơ chủng các liều cơ bản phải tiêm nhắc 1 liều; sau đó tiêm nhắc lại mỗi 10 năm.

Cách dùng

Lắc trước khi tiêm, cho đến khi đạt được một hỗn dịch đồng nhất.

Đường dùng

Tốt nhất, nên tiêm bắp để hạn chế các phản ứng tại nơi tiêm. Có thể tiêm dưới da sâu. Không được tiêm trong da.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không dùng TETAVAX trong những trường hợp sau:

- Nếu bị dị ứng với bất kỳ thành phần nào của vắc-xin,

- Nếu trước đây từng bị phản ứng dị ứng hay rối loạn thần kinh sau khi tiêm vắc-xin.
- Nếu đang bị sốt, nhiễm trùng cấp tính hay đợt tiến triển của bệnh mạn tính (trường hợp này nên hoãn việc chủng ngừa).

NẾU CÒN ĐIỀU GÌ CHƯA RÕ, HÃY HỎI BÁC SĨ HAY DƯỢC SĨ ĐỂ ĐƯỢC HƯỚNG DẪN THÊM.

THẬN TRỌNG KHI DÙNG

Lưu ý đặc biệt khi dùng TETAVAX:

- Cũng như khi tiêm các vắc-xin khác, luôn phải theo dõi tình hình sức khỏe sau khi tiêm vắc-xin và chuẩn bị sẵn các phương tiện điều trị nội khoa để xử trí ngay khi người được tiêm bị sốc phản vệ sau khi tiêm vắc-xin.
- Không được tiêm bắp cho người bị rối loạn chảy máu như hemophili hoặc giảm tiểu cầu.
- Phải báo cho bác sĩ biết nếu thuộc các trường hợp sau đây:
  - Đang bị suy giảm miễn dịch hay đang điều trị với thuốc ức chế miễn dịch,
  - Bị dị ứng, hay đã từng bị phản ứng bất thường sau khi tiêm vắc-xin,
  - Đã tiêm vắc-xin uốn ván trong vòng 5 năm trở lại đây.
  - Nếu sau khi tiêm vắc-xin có chứa giải độc tố uốn ván (vắc-xin phòng uốn ván) từng bị hội chứng Guillain-Barré (nhạy cảm bất thường, liệt) hay viêm dây thần kinh cánh tay (liệt, đau lan cánh tay và vai), bác sĩ sẽ xem xét một cách cẩn thận và quyết định tiêm hay không tiêm liều vắc-xin có chứa giải độc tố uốn ván tiếp theo.

Sử dụng cùng với các dược phẩm khác

Nếu phác đồ điều trị yêu cầu phải tiêm vắc-xin uốn ván (giải độc tố uốn ván) và huyết thanh kháng uốn ván cùng một lúc, phải dùng bơm kim tiêm riêng và tiêm ở các vị trí khác nhau.
Phải báo với bác sĩ hoặc dược sĩ nếu đang dùng hay gần đây có dùng bất kỳ một thuốc gì, kể cả những thuốc mua không cần đơn của bác sĩ.

Phụ nữ có thai - đang cho con bú sữa mẹ:
Phụ nữ có thai
Nếu cần thiết, có thể tiêm vắc-xin này khi đang mang thai.
Phải hỏi ý kiến bác sĩ hay dược sĩ trước khi sử dụng bất kỳ thuốc gì.

Phụ nữ đang cho con bú sữa mẹ
Phải hỏi ý kiến bác sĩ hay dược sĩ trước khi sử dụng bất kỳ thuốc gì.

Người nhiễm virus gây suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV):
Theo khuyến cáo của Tổ chức y tế thế giới (WHO), người nhiễm HIV có triệu chứng hay không có triệu chứng nên được tiêm vắc-xin TETAVAX theo phác đồ thường quy.

Lái xe và vận hành máy móc
Hiện không có tài liệu.

Tá dược có thể gây tác dụng không mong muốn
Potassium.

Quá liều
Không có tài liệu.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Cũng như các thuốc khác khi dùng TETAVAX có thể bị một số tác dụng không mong muốn, mặc dù không phải ai cũng bị tác dụng không mong muốn khi dùng thuốc.

Các tác dụng không mong muốn được báo cáo:

- Sưng hạch bạch huyết.
- Phản ứng dị ứng hay quá mẫn cảm: mày đay, phù.
- Phản ứng da: ngứa, ban đỏ.
- Đau đầu, khó chịu.
- Hạ huyết áp.
- Đau cơ, đau khớp.
- Phản ứng tại nơi tiêm: như đau, phát ban (quầng đỏ), nốt cứng hay sưng nề tại nơi tiêm xuất hiện trong vòng 48 giờ sau khi tiêm vắc-xin và tồn tại trong một hay hai ngày. Đôi khi kèm theo các phản ứng này là nốt cứng dưới da, và trong trường hợp ngoại lệ có thể bị áp-xe vô khuẩn.
- Sốt, khó chịu thoáng qua.

Các tác dụng không mong muốn có thể gặp (nghĩa là không được báo cáo trực tiếp do tiêm vắc-xin TETAVAX nhưng được báo cáo khi dùng các vắc-xin khác hay các chất có thành phần tương tự như TETAVAX) gồm:

- Hội chứng Guillain-Barré (nhạy cảm bất thường, liệt) hay viêm dây thần kinh cánh tay (liệt, đau lan cánh tay và vai) sau khi dùng vắc-xin có chứa giải độc tố uốn ván.

2-3 ngày sau khi chủng ngừa, những bé sinh quá non tháng (tuổi thai 28 tuần hay trước 28 tuần) có thể bị cơn ngưng thở tạm thời.

Nếu bất kỳ tác dụng không mong muốn nào trở nên nặng hơn hay gặp bất kỳ tác dụng không mong muốn nào chưa được nêu trong tờ hướng dẫn sử dụng này, hãy thông báo cho bác sĩ hay dược sĩ.

BẢO QUẢN TETAVAX

Để xa tầm tay và tầm mắt của trẻ em.
Không sử dụng TETAVAX khi đã quá thời hạn sử dụng (xem ngày hết hạn dùng "EXP.") ghi trên nhãn, trên hộp.
Bảo quản ở nhiệt độ +2°C đến +8°C (trong tủ lạnh). Không được để đông băng.
Không được vứt bỏ thuốc vào cống hay thùng rác gia đình. Phải hỏi dược sĩ cách hủy các thuốc không còn sử dụng nữa. Những biện pháp này giúp bảo vệ môi trường.

TUỔI THỌ: 36 tháng.

HẠN DÙNG: Xem ngày hết hạn dùng "EXP." trên bao bì.
Không sử dụng sau hạn dùng được ghi trên bao bì.

TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT: Tiêu chuẩn nhà sản xuất.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

- Hộp 1 bơm tiêm nạp sẵn 1 liều (0,5 ml)

NHÀ SẢN XUẤT

Tetavax

SANOFI PASTEUR S.A.
Trụ sở chính: 2 avenue Pont Pasteur, 69007 Lyon – Pháp.
Sản xuất bởi SANOFI PASTEUR S.A. tại Campus Mérieux, 1541 avenue Marcel Mérieux, 69280 Marcy l'Etoile – Pháp (địa điểm 1) / Parc Industriel d'Incarville, 27100 Val de Reuil – Pháp (địa điểm 2).

Phiên bản: 12/2010

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

TUQ CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Thu Thủy

SANOFI PASTEUR