ĐH 82

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
Lần đầu: 27/3/2017

(BS1)

SHANVAC®-B, hộp 1 lọ 1 liều 0,5 ml

Nội dung nhãn phụ

℞ Thuốc bán theo đơn
SHANVAC®-B (Vắc-xin Viêm gan B (tái tổ hợp, rDNA))
Hỗn dịch tiêm.
Hộp 1 lọ 1 liều 0,5 ml.
Hoạt chất: kháng nguyên bề mặt virus Viêm gan b tinh khiết, tái tổ hợp 10 mcg.
Tiêm bắp.
Chỉ định, chống chỉ định, cách dùng và các thông tin khác: xem trong tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Lắc kỹ trước khi sử dụng.
Để xa tầm tay và tầm mắt trẻ em. Bảo quản ở nhiệt độ +2 đến +8°C. KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ ĐÔNG BĂNG. Phải hủy bỏ nếu vắc-xin bị đông băng. Tránh để ánh sáng chiếu vào lọ vắc xin.
Tiêu chuẩn SX: TCCS. Số lô SX, ngày SX, HD: xem B. No., MFD., EXP. trên bao bì. Ngày hết hạn là ngày 01 của tháng hạn dùng (EXP.) trên bao bì.
SX tại Shantha Biotechnics Limited, Survey No.274, Athvelli Village, Medchal Mandal-501 401, Ranga Reddy District, Andhra Pradesh, Ấn Độ.
DNNK: SĐK:

SANOFI PASTEUR VN
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nhãn phụ kích thước: 20 x 43 mm

℞ Thuốc bán theo đơn **SHANVAC®-B** (Vắc-xin Viêm gan B (tái tổ hợp, rDNA)) Hỗn dịch tiêm. Hộp 1 lọ 1 liều 0,5 ml. Hoạt chất: kháng nguyên bề mặt virus Viêm gan B tinh khiết, tái tổ hợp 10 mcg. Tiêm bắp. Chỉ định, chống chỉ định, cách dùng và các thông tin khác: xem trong tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo. **Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Lắc kỹ trước khi sử dụng. Để xa tầm tay và tầm mắt trẻ em. Bảo quản ở nhiệt độ +2 đến +8°C. KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ ĐÔNG BĂNG. Phải hủy bỏ nếu vắc-xin bị đông băng. Tránh để ánh sáng chiếu vào lọ vắc xin.** Tiêu chuẩn SX: TCCS. Số lô SX, ngày SX, HD: xem B. No., MFD., EXP. trên bao bì. Ngày hết hạn là ngày 01 của tháng hạn dùng (EXP.) trên bao bì. SX tại Shantha Biotechnics Limited, Survey No.274, Athvelli Village, Medchal Mandal-501 401, Ranga Reddy District, Andhra Pradesh, Ấn Độ. DNNK: SĐK:



Inner Carton

SBL/0.5/HB-Eng/BP/IC-2.3 03.2013



Inner Carton

SBL/0.5/HB-Eng/BP/IC-2.3 03.2013

SHANVAC®-B, hộp 10 hộp nhỏ, mỗi hộp nhỏ chứa 1 lọ 1 liều 0,5 ml


Nội dung nhãn phụ

℞ Thuốc bán theo đơn
SHANVAC®-B (Vắc-xin Viêm gan B (tái tổ hợp, rDNA))
Hỗn dịch tiêm.
Hộp 10 hộp nhỏ, mỗi hộp nhỏ chứa 1 lọ 1 liều 0,5 ml (0,5 ml x 10 lọ).
Hoạt chất: kháng nguyên bề mặt virus Viêm gan B tinh khiết, tái tổ hợp 10 mcg.
Tiêm bắp.
Chỉ định, chống chỉ định, cách dùng và các thông tin khác: xem trong tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Lắc kỹ trước khi sử dụng.
Để xa tầm tay và tầm mắt trẻ em. Bảo quản ở nhiệt độ +2 đến +8°C. KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ ĐÔNG BĂNG. Phải hủy bỏ nếu vắc-xin bị đông băng. Tránh để ánh sáng chiếu vào lọ vắc xin.
Tiêu chuẩn SX: TCCS. Số lô SX, ngày SX, HD: xem B. No., MFD., EXP. trên bao bì. Ngày hết hạn là ngày 01 của tháng hạn dùng (EXP.) trên bao bì.
SX tại Shantha Biotechnics Limited, Survey No.274, Athvelli Village, Medchal Mandal-501 401, Ranga Reddy District, Andhra Pradesh, Ấn Độ.
DNNK: SĐK:

CÔNG TY SANOFI PASTEUR S.A. VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


Nhãn phụ kích thước 41 x 110 mm

℞ Thuốc bán theo đơn
SHANVAC®-B (Vắc-xin Viêm gan B (tái tổ hợp, rDNA))
Hỗn dịch tiêm.
Hộp 10 hộp nhỏ, mỗi hộp nhỏ chứa 1 lọ 1 liều 0,5 ml (0,5 ml x 10 lọ).
Hoạt chất: kháng nguyên bề mặt virus Viêm gan B tinh khiết, tái tổ hợp 10 mcg.
Tiêm bắp. Chỉ định, chống chỉ định, cách dùng và các thông tin khác: xem trong tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Lắc kỹ trước khi sử dụng. Để xa tầm tay và tầm mắt trẻ em. Bảo quản ở nhiệt độ +2 đến +8°C. KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ ĐÔNG BĂNG. Phải hủy bỏ nếu vắc-xin bị đông băng. Tránh để ánh sáng chiếu vào lọ vắc xin.
Tiêu chuẩn SX: TCCS. Số lô SX, ngày SX, HD: xem B. No., MFD., EXP. trên bao bì. Ngày hết hạn là ngày 01 của tháng hạn dùng (EXP.) trên bao bì. SX tại Shantha Biotechnics Limited, Survey No.274, Athvelli Village, Medchal Mandal-501 401, Ranga Reddy District, Andhra Pradesh, Ấn Độ.
DNNK: SĐK:




Vial Label Dimensions : 50 x 15 mm


Common vial label for BG or IC/OC or if required with VVM



Zoom 200%

SBL/0.5/HB-Eng/BP/VL-2.3 12.2012





Outer Ca

SBL/0.5/HB-Eng/BP/OC-2

Hepatitis B Vaccine (rDNA) B.P.

Shanvac®-B

SUSPENSION FOR INTRAMUSCULAR INJECTION

Genetically Engineered
Recombinant Vaccine

STORE AT +2°C TO +8°C
DO NOT FREEZE

Manufactured & Marketed by:
SHANTHA BIOTECHNICS LIMITED
Survey No. 274, Athvelli Village, Medchal Mandal - 501 401,
Ranga Reddy District, Andhra Pradesh, INDIA.

SHANTHA
A SANOFI COMPANY

M.L. : 01/RR/AP/97/V/R

B. No. :

MFD. :

EXP. :


® Registered trademark

10 X 0.5 mL **10 Paediatric Doses** **10 X 0.5 mL**

SBL/0.5/HB-Eng/BP/OC-2.3 03.2013

rton

2.3 03.2013



Outer Ca

SBL/0.5/HB-Eng/BP/OC-2

Hepatitis B Vaccine (rDNA) B.P.

Shanvac®-B

SUSPENSION FOR INTRAMUSCULAR INJECTION

Genetically Engineered
Recombinant Vaccine

STORE AT +2°C TO +8°C
DO NOT FREEZE

M.L. : 01/RR/AP/97/V/R

B. No. :

MFD. :

EXP. :

® Registered trademark

Manufactured & Marketed by:
SHANTHA BIOTECHNICS LIMITED
Survey No. 274, Athvelli Village, Medchal Mandal - 501 401,
Ranga Reddy District, Andhra Pradesh, INDIA.

SHANTHA
A SANOFI COMPANY

10 X 0.5 mL **10 Paediatric Doses** **10 X 0.5 mL**

SBL/0.5/HB-Eng/BP/OC-2.3 03.2013

rton

.3 03.2013

SHANVAC®-B, hộp 35 lọ, lọ 1 liều 0,5 ml

Nội dung nhãn phụ

℞ Thuốc bán theo đơn
SHANVAC®-B
Vắc-xin Viêm gan B (tái tổ hợp, rDNA)
Hỗn dịch tiêm.
Hộp 35 lọ, lọ 1 liều 0,5 ml.
Tiêm bắp.
Chỉ định, chống chỉ định, cách dùng và các thông tin khác: xem trong tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Lắc kỹ trước khi sử dụng.
Để xa tầm tay và tầm mắt trẻ em. Bảo quản ở nhiệt độ +2 đến +8°C. KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ ĐÔNG BĂNG. Phải hủy bỏ nếu vắc-xin bị đông băng. Tránh để ánh sáng chiếu vào lọ vắc xin.
Tiêu chuẩn SX: TCCS. Số lô SX, ngày SX, HD: xem B. No., MFD., EXP. trên bao bì. Ngày hết hạn là ngày 01 của tháng hạn dùng (EXP.) trên bao bì.
SX tại Shantha Biotechnics Limited, Survey No.274, Athvelli Village, Medchal Mandal-501 401, Ranga Reddy District, Andhra Pradesh, Ấn Độ.
DNNK: SĐK:

Nhãn phụ kích thước 32 x 138 mm

℞ Thuốc bán theo đơn
SHANVAC®-B (Vắc-xin Viêm gan B (tái tổ hợp, rDNA))
Hỗn dịch tiêm. Hộp 35 lọ, lọ 1 liều 0,5 ml.
Hoạt chất: kháng nguyên bề mặt virus Viêm gan B tinh khiết, tái tổ hợp 10 mcg.
Tiêm bắp. Chỉ định, chống chỉ định, cách dùng và các thông tin khác: xem trong tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Lắc kỹ trước khi sử dụng. Để xa tầm tay và tầm mắt trẻ em. Bảo quản ở nhiệt độ +2 đến +8°C. KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ ĐÔNG BĂNG. Phải hủy bỏ nếu vắc-xin bị đông băng. Tránh để ánh sáng chiếu vào lọ vắc xin.
Tiêu chuẩn SX: TCCS. Số lô SX, ngày SX, HD: xem B. No., MFD., EXP. trên bao bì. Ngày hết hạn là ngày 01 của tháng hạn dùng (EXP.) trên bao bì. SX tại Shantha Biotechnics Limited, Survey No.274, Athvelli Village, Medchal Mandal-501 401, Ranga Reddy District, Andhra Pradesh, Ấn Độ.
DNNK: SĐK:

SANOFI PASTEUR CÔNG TY VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

35 X 0.5 mL | 35 Paediatric Doses

Keep out of reach of children

A SANOFI COMPANY
SHANTHA

Hepatitis B
Vaccine (rDNA) B.P.

Shanvac®-B

SUSPENSION FOR INTRAMUSCULAR INJECTION

STORE AT +2°C TO +8°C
DO NOT FREEZE

Surface antigen produced in recombinant yeast *Pichia pastoris*.

Unvarnished area to print Barcode

Size : 140 x 105 x 40 mm

℞ Thuốc bán theo đơn

SHANVAC®-B (Vắc-xin Viêm gan B (tái tổ hợp, rDNA))

Hỗn dịch tiêm. Hộp 35 lọ, lọ 1 liều 0,5 ml.

Hoạt chất: kháng nguyên bề mặt virus Viêm gan B tinh khiết, tái tổ hợp 10 mcg.

Tiêm bắp. Chỉ định, chống chỉ định, cách dùng và các thông tin khác: xem trong tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Lắc kỹ trước khi sử dụng. Để xa tầm tay và tầm mắt trẻ em. Bảo quản ở nhiệt độ +2 đến +8°C. KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ ĐÔNG BĂNG. Phải hủy bỏ nếu vắc-xin bị đông băng. Tránh để ánh sáng chiếu vào lọ vắc xin.

Tiêu chuẩn SX: TCCS. Số lô SX, ngày SX, HD: xem B. No., MFD., EXP. trên bao bì. Ngày hết hạn là ngày 01 của tháng hạn dùng (EXP.) trên bao bì. SX tại Shantha Biotechnics Limited, Survey No.274, Athvelli Village, Medchal Mandal-501 401, Ranga Reddy District, Andhra Pradesh, Ấn Độ.

DNNK: SĐK:

COMPOSITION
Ingredients:

r-DNA Hepatitis-B S
Aluminium Hydroxid
Thiomersal B.P.
as preservative

35 X 0.5 mL | 35 Paediatric Doses | 35 X 0.5

SANOFI PASTEUR VACCINES PTE LTD
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Each Paediatric dose of
0.5 mL contains :

urface Antigen Purified	10 mcg
e Gel equivalent to Al***	0.25 mg
	0.025 mg

Surface antigen produced
in recombinant yeast *Pichia pastoris*

SHAKE WELL BEFORE USE
DISCARD VACCINE IF FROZEN
Refer leaflet before use

Hepatitis B Vaccine (rDNA) B.P.

Shanvac®-B

SUSPENSION FOR INTRAMUSCULAR INJECTION

Manufactured & Marketed by:
SHANTHA BIOTECHNICS LIMITED
Survey No. 274, Athvelli Village, Medchal Mandal - 501 401,
Ranga Reddy District, Andhra Pradesh, INDIA.

mL 35 Paediatric Doses

35 X 0.5 mL 35 P

SBL/0.5/HB-Eng/BP/BG-2.3

Box of 35 vials (Burger Carton)

SBL/0.5/HB-Eng/BP/BG-2.3 12.2012

Genetically Engineered
Recombinant Vaccine

STORE AT +2°C TO +8°C
DO NOT FREEZE

M. L. : 01/RR/AP/97/V/R

B. No. :

MFD :

EXP :

® Registered trademark

SHANTHA
A SANOFI COMPANY

Paediatric Doses | 35 X 0.5 mL | 35 Paediatric Doses

12.2012

Size : 140 x 105 x 40 mm

Hepatitis B Vaccine (rDNA) B.P.

Shanvac®-B

SUSPENSION FOR INTRAMUSCULAR INJECTION

Manufactured & Marketed by:
SHANTHA BIOTECHNICS LIMITED
Survey No. 274, Athvelli Village, Medchal Mandal - 501 401,
Ranga Reddy District, Andhra Pradesh, INDIA.

Genetically Engineered
Recombinant Vaccine

STORE AT +2°C TO +8°C
DO NOT FREEZE

COMPOSITION
Ingredients:

r-DNA Hepatitis-B S
Aluminium Hydroxid
Thiomersal B.P.
as preservative

35 X 0.5 mL | 35 Paediatric Doses | 35 X 0.5

SANOFI PASTEUR
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hepatitis B Vaccine (rDNA) B.P.
Shanvac®-B
SUSPENSION FOR INTRAMUSCULAR INJECTION

Unvarnished area
to print Barcode

STORE AT +2°C TO +8°C
DO NOT FREEZE

Surface antigen produced in
recombinant yeast *Pichia pastoris*.

SHANTHA
A SANOFI COMPANY

Keep out of reach of children

35 X 0.5 mL | 35 Paediatric Doses

Each Paediatric dose of
0.5 mL contains :

urface Antigen Purified	10 mcg
e Gel equivalent to Al***	0.25 mg
	0.025 mg

Surface antigen produced in recombinant yeast *Pichia pastoris*

SHAKE WELL BEFORE USE

DISCARD VACCINE IF FROZEN

Refer leaflet before use

mL 35 Paediatric Doses

Hepatitis B Vaccine (rDNA) B.P.

Shanvac®-B

SUSPENSION FOR INTRAMUSCULAR INJECTION

Manufactured & Marketed by:
SHANTHA BIOTECHNICS LIMITED
Survey No. 274, Athvelli Village, Medchal Mandal - 501 401,
Ranga Reddy District, Andhra Pradesh, INDIA.

35 X 0.5 mL 35

SBL/0.5/HB-Eng/BP/BG-2.3

Box of 35 vials (Burger Carton)

SBL/0.5/HB-Eng/BP/BG-2.3 12.2012

Genetically Engineered
Recombinant Vaccine

STORE AT +2°C TO +8°C
DO NOT FREEZE

M. L. : 01/RR/AP/97/V/R

B. No. :

MFD :

EXP :

® Registered trademark

SHANTHA
A SANOFI COMPANY

Paediatric Doses | 35 X 0.5 mL | 35 Paediatric Doses

12.2012

Rx **Thuốc này chỉ dùng theo đơn của bác sĩ**

Shanvac®-B

Vắc-xin Viêm gan B (tái tổ hợp, rDNA)

THÀNH PHẦN ĐỊNH TÍNH VÀ ĐỊNH LƯỢNG:

Shanvac®-B, (vắc-xin Viêm gan B) là hỗn dịch vô trùng với thành phần chủ yếu là kháng nguyên bề mặt của virus Viêm gan B được sản xuất bằng kỹ thuật tái tổ hợp DNA. Kháng nguyên được sản xuất bằng cách nuôi cấy tế bào biến đổi mã di truyền của loài *Pichia pastoris*, nấm men methylotrophic, loài này mang gen mã hóa kháng nguyên bề mặt chủ yếu của virus Viêm gan B. Kháng nguyên bề mặt chiết từ tế bào *Pichia pastoris* được tinh chế bằng nhiều công đoạn lý hóa và tổng hợp thành hỗn dịch chứa kháng nguyên, hỗn dịch này được hấp phụ trên gel hydroxyt nhôm. Vắc-xin không chứa bất kỳ nguyên vật liệu có nguồn gốc từ người hay từ động vật.

Thành phần

	Hàm lượng trong 1 liều trẻ em 0,5 ml
Kháng nguyên bề mặt Viêm gan B r-DNA tinh chế	10 mcg
Gel hydroxyt nhôm, tương đương với lượng Al^{+++}	0,25 mg
Thiomersal B.P. như chất bảo quản	0,025 mg

DẠNG DƯỢC PHẨM:

Shanvac®-B là hỗn dịch tiêm vô trùng sử dụng ngay để tiêm bắp.

CHỈ ĐỊNH:

Vắc-xin Viêm gan B được chỉ định để tạo miễn dịch phòng các bệnh do nhiễm virus Viêm gan B.

Tiêm chủng thường quy

- Tất cả trẻ sơ sinh, trẻ em và thanh thiếu niên.

Nhóm người có nguy cơ nhiễm bệnh cao

- Nhân viên y tế có tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân (bác sĩ, phẫu thuật viên, nha sĩ, điều dưỡng, nhân viên sơ - cấp cứu, nhân viên cứu hộ và nhân viên làm vệ sinh, v.v…)
- Sinh viên y khoa, nha khoa và sinh viên trường đào tạo điều dưỡng có tiếp xúc với bệnh nhân.
- Người làm những việc có tiếp xúc với máu và chế phẩm từ máu.
- Người bị bệnh thalassemie, bệnh ưa chảy máu (hemophilie), hay những bệnh nhân phải truyền máu.

- Bệnh nhân phải thẩm phân máu hay cấy ghép tạng.
- Quân nhân đang tại ngũ.
- Tù nhân, bảo vệ trại giam và nhân viên làm việc trong tại giam.
- Người sống trong cơ sở bảo trợ xã hội, nhà cộng đồng và nhân viên tại các nơi này.
- Người nhà hay bạn tình của người bị nhiễm virus Viêm gan B.
- Trẻ sơ sinh có mẹ bị nhiễm virus Viêm gan B.
- Những người có nguy cơ nhiễm virus Viêm gan B cao do thói quen sinh hoạt tình dục: người có quan hệ tình dục bừa bãi, quan hệ đồng tính nam, người làm nghề mại dâm, người nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục.
- Người nghiện ma túy qua đường tiêm.
- Khách du lịch đến và trở về từ các nước hay vùng có dịch tễ Viêm gan B cao.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

Liều dùng:

- Sơ sinh, trẻ nhỏ: liều **Shanvac®-B** nên dùng là 10 mcg protein kháng nguyên trong 0,5 ml hỗn dịch.
- Thanh thiếu niên đến 19 tuổi: có thể dùng **Shanvac®-B** liều 10 mcg protein kháng nguyên trong 0,5 ml hỗn dịch.

Cách dùng:

Shanvac®-B là hỗn dịch tiêm vô trùng sử dụng ngay.

Trước khi dùng, phải lắc kỹ đến khi đạt được hỗn dịch đồng chất màu trắng đục.

Trước khi dùng, phải quan sát kỹ bằng mắt xem vắc-xin có hạt lợn cợn hay bị đổi màu không.

Phải rút vắc-xin từ lọ bằng bơm kim tiêm vô trùng.

Phải tuân thủ kỹ thuật vô trùng khi thao tác.

Phải quan sát xem nút lọ và băng niêm phong còn nguyên vẹn không.

Đường dùng:

Shanvac®-B phải dùng bằng đường tiêm bắp.

- Trẻ sơ sinh và nhũ nhi: tiêm **Shanvac®-B** ở trước-bên đùi. Trẻ lớn và thanh thiếu niên tiêm ở vùng cơ delta. Người hay bị chảy máu nặng (ví dụ như bệnh ưa chảy máu (hemophilie)) có thể tiêm **Shanvac®-B** bằng đường dưới da.

KHÔNG ĐƯỢC TIÊM SHANVAC®-B BẰNG ĐƯỜNG TĨNH MẠCH.

Không được tiêm **Shanvac®-B** ở vùng mông vì có thể gây đáp ứng miễn dịch kém.

Phác đồ tiêm chủng:

Nồng độ kháng thể đủ khả năng bảo vệ ở mức 10 mIU/ml. Đợt tiêm chủng cơ bản gồm 3 liều vắc-xin Viêm gan B, tiêm bắp theo phác đồ A hoặc phác đồ B.

Phác đồ A nên được áp dụng cho những người thuộc nhóm có nguy cơ cao.

Phác đồ B nên áp dụng đối với tiêm chủng thường quy.

Phác đồ A

Liều 1	Vào ngày lựa chọn
Liều 2	1 tháng sau ngày tiêm liều đầu tiên
Liều 3	2 tháng sau ngày tiêm liều đầu tiên
Một liều nhắc lại 12 tháng sau khi tiêm liều đầu tiên.	
8 năm sau có thể phải tiêm liều nhắc lại thứ hai nếu nồng độ kháng thể bảo vệ giảm dưới 10 mIU/ml.	

Phác đồ B

Liều 1	Vào ngày lựa chọn
Liều 2	1 tháng sau ngày tiêm liều đầu tiên
Liều 3	6 tháng sau ngày tiêm liều đầu tiên
8 – 10 năm sau có thể phải tiêm một liều nhắc lại nếu nồng độ kháng thể bảo vệ giảm dưới 10 mIU/ml.	

Tiêm chủng trong những trường hợp đặc biệt:

- **Trẻ sơ sinh có mẹ mang mầm bệnh virus Viêm gan B**
  Liều vắc-xin Viêm gan B đầu tiên có thể tiêm cùng lúc với globulin miễn dịch viêm gan B, nhưng phải tiêm tại 2 nơi khác nhau. Việc tiêm chủng nên bắt đầu ngay sau khi sinh và nên áp dụng phác đồ 0, 1 và 2 tháng.
- **Chắc chắn / nghi ngờ bị phơi nhiễm virus Viêm gan B**
  Liều vắc-xin Viêm gan B đầu tiên có thể tiêm cùng lúc với globulin miễn dịch viêm gan B, nhưng phải tiêm tại 2 nơi khác nhau.
- **Bệnh nhân thẩm phân máu mạn tính**
  Liều vắc-xin Viêm gan B nên dùng là 40 mcg (2 ml) theo phác đồ 0, 1, 2, 6 tháng. Theo dõi nồng độ kháng thể kháng kháng nguyên bề mặt virus Viêm gan B (anti-HBs) mỗi 3 – 6 tháng để đảm bảo nồng độ anti-HBs đạt mức bảo vệ ở 10 mIU/ml.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không được tiêm **Shanvac®-B** cho:

- Người bị quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của vắc-xin hay người từng bị triệu chứng quá mẫn sau khi tiêm **Shanvac®-B**.
- Người bị sốt nhiễm trùng nặng.

THẬN TRỌNG

- Như khi dùng các vắc-xin đường tiêm khác, phải luôn chuẩn bị sẵn epinephrine để cấp cứu trong trường hợp bị sốc phản vệ.
- Lắc kỹ vắc-xin trước khi dùng.

- Khi bị bệnh nhiễm khuẩn nhẹ, chỉ dùng **Shanvac®-B** khi thật cần thiết và cân nhắc thấy lợi ích rõ ràng hơn so với nguy cơ có thể gặp khi dùng.

CẢNH BÁO

- Đáp ứng miễn dịch thường kém ở người trên 40 tuổi, người béo phì, người bị suy giảm miễn dịch hay người điều trị ức chế miễn dịch. Vì vậy, sau khi tiêm đủ liều của liệu trình tiêm chủng cơ bản nồng độ anti-HBs có thể không đạt. Ở những trường hợp này có thể phải tiêm thêm các liều bổ sung.
- Vắc-xin này không phòng ngừa bệnh do nhiễm virus Viêm gan A, viêm gan C, Viêm gan D, Viêm gan E hay các tác nhân khác gây nhiễm ở gan.
- Người đang mang virus Viêm gan B có hay không có triệu chứng thì có thể không có đáp ứng với vắc-xin Viêm gan B. Tuy nhiên, không thấy vắc-xin gây ảnh hưởng có hại.

Trường hợp có thai và cho con bú sữa mẹ

Có thai: không có đầy đủ dữ liệu đầy đủ về việc dùng vắc-xin Viêm gan B trên người và trên động vật mang thai. Không nên dùng vắc-xin Viêm gan B trong thai kỳ, chỉ dùng cho phụ nữ mang thai khi thật cần thiết và cân nhắc thấy lợi ích rõ ràng hơn so với nguy cơ có thể gặp trên phôi thai khi dùng.

Cho con bú sữa mẹ: không có đầy đủ dữ liệu đầy đủ về việc dùng vắc-xin Viêm gan B trên người và trên động vật khi đang cho con bú. Cần thận trọng khi dùng vắc-xin Viêm gan B ở phụ nữ đang cho con bú sữa mẹ.

Tương tác với các thuốc khác và các dạng tương tác khác

- Vắc-xin Viêm gan B có thể dùng cùng lúc với vắc-xin bạch hầu – uốn ván – ho gà, vắc-xin bạch hầu – uốn ván và/hoặc vắc-xin bại liệt dạng uống.
- Vắc-xin Viêm gan B có thể dùng cùng lúc với vắc-xin Sởi – Quai bị – Rubella, vắc-xin *Haemophilus influenzae* týp b, vắc-xin Viêm gan A, vắc-xin Lao (BCG) và vắc-xin Sốt vàng.

Lưu ý: Các mũi tiêm khác nhau phải được tiêm ở vị trí khác nhau và dùng bơm kim tiêm riêng.

Tác dụng đối với khả năng lái xe và vận hành máy móc

Không áp dụng.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Thường gặp:
Tại nơi tiêm: đau nhẹ, cứng, quầng đỏ.

Hiếm gặp
Toàn thân: mệt mỏi, sốt nhẹ và tình trạng khó chịu.
Da và phần phụ thuộc: phát ban, ngứa, mày đay.
Hệ cơ-xương khớp: đau khớp, đau cơ.
Hệ tiêu hóa: buồn nôn, nôn, tiêu chảy, và đau bụng.
Hệ gan-mật: xét nghiệm chức năng gan bất thường.
Hệ thần kinh: chóng mặt, dị cảm.

Cực kỳ hiếm gặp
Toàn thân: quá mẫn, phản ứng phản vệ, phản ứng dị ứng và hồng ban đa dạng.
Hệ cơ-xương khớp: viêm khớp.
Hệ tim-mạch: ngất, hạ huyết áp.
Hệ thần kinh: bệnh thần kinh, viêm thần kinh (kể cả hội chứng Guillain-Barré, viêm thần kinh thị), viêm não, viêm màng não.
Hệ hô hấp: triệu chứng giống co thắt phế quản.
Hệ bạch huyết: bệnh hạch bạch huyết.

QUÁ LIỀU

Không áp dụng.

CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LÝ:

Đặc tính dược lực học

Shanvac®-B tạo miễn dịch bảo vệ đặc hiệu kháng HBsAg. Để bảo vệ khỏi sự xâm nhiễm virus Viêm gan B nồng độ anti-HBsAg (kháng thể kháng HBs) phải trên 10 mIU/ml.

Tính sinh miễn dịch và an toàn của Shanvac®-B.

1. Nhũ nhi và trẻ nhỏ:

Trong sáu nghiên cứu đối chứng áp dụng phác đồ tiêm chủng 0, 1, 2 tháng và 0, 1, 6 tháng ở nhũ nhi và trẻ nhỏ, Shanvac®-B cho thấy 100% đạt mức huyết thanh bảo vệ sau liều thứ 3 với GMT dao động lần lượt là 643 mIU/ml đến 2643 mIU/ml và 17.611 mIU/ml đến 19.183 mIU/ml.

2. Người lớn khỏe mạnh

Trong 8 nghiên cứu đối chứng, sau khi tiêm 3 liều vắc-xin 96,4% người tiêm Shanvac-B đạt tỷ lệ chuyển đổi huyết thanh với GMT dao động từ 2,2 mIU/ml đến 10.446 mIU/ml.

3. Nghiên cứu ở nhóm có nguy cơ nhiễm bệnh cao

Nghiên cứu ở nhóm bệnh nhân suy thận mạn tính, sau khi tiêm 3 liều theo phác đồ 0, 1, 2 tháng 80% người tiêm Shanvac®-B đạt tỷ lệ huyết thanh bảo vệ với GMT 218 mIU/ml.

Nghiên cứu ở nhóm bệnh nhân ưa chảy máu (hemophilie), sau khi tiêm 3 liều theo phác đồ 0, 1, 6 tháng 100% người tiêm Shanvac®-B đạt tỷ lệ huyết thanh bảo vệ với GMT 2.767 mIU/ml.

4. Hiệu quả lâu dài:

4 năm sau khi tiêm vắc-xin Shanvac®-B, 100% người tiêm đều có huyết thanh bảo vệ. 4 năm sau khi tiêm liều cuối của phác đồ 0, 1, 6 tháng và 0, 1, 2, 12 tháng, GMT của 2 nhóm lần lượt là 306 mIU/ml và 832 mIU/ml.

TUỔI THỌ

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

CẢNH BÁO ĐẶC BIỆT VỀ BẢO QUẢN

Bảo quản và vận chuyển ở nhiệt độ từ +2°C đến +8°C. KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ ĐÔNG BĂNG. Nếu đã bị đông băng thì phải hủy lọ vắc-xin. Tránh để ánh sáng chiếu vào lọ vắc xin.

Để xa tầm tay trẻ em.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

Lọ 1 liều 0,5 ml.

- Hộp gồm 10 hộp nhỏ, mỗi hộp nhỏ chứa 1 lọ 1 liều 0,5 ml, (0,5 ml x 10 lọ)
- Hộp 35 lọ, mỗi lọ chứa 1 liều 0,5 ml (0,5 ml x 35 lọ)

TÊN VÀ ĐỊA CHỈ NHÀ SẢN XUẤT:

SHANTHA BIOTECHNICS LIMITED
Survey No.274, Athvelli Village, Medchal Mandal-501 401,
Ranga Reddy District, Andhra Pradesh, Ấn Độ.
Tel.: +91-40-23234104, 23234105, 23234135, 23234136
Fax: +91-40-23234103, 23234133
Website: www.shanthabiotech.com

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.

Cần thông báo cho bác sĩ biết những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Phiên bản 12/2012

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

TUQ CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Thu Thủy

SHANTHA
A SANOFI COMPANY