01 / VX 2 năm
(STT 1 / QĐ 465)

MẪU HỘP VẮC XIN

(Hộp 10 lọ x 2 ml x 20 liều)

(nếu sản phẩm được cung cấp cho Chương trình TCMR sẽ bổ sung dòng chữ "Dùng cho TCMR, không được bán" ở phần Tiếng Việt và "Only for EPI, not for sale" ở phần Tiếng Anh)

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
Lần đầu: 24/10/2017

Số đăng ký (Reg):
Số lô SX (Lot):
NSX (Prod):
HSD (Exp):

POLYVAC

Rx Prescription Drug

POLYVAC

BIVALENT ORAL POLIOMYELITIS VACCINE
LIVE VIRUS - BIVALENT

For oral, not for injection

Box 10 vials x 2ml x 20 doses
Store at -20±5°C: 24 months, 2°C to 8°C: 6 months
Spec: Manufacturer's

CENTER FOR RESEARCH AND PRODUCTION OF VACCINES AND BIOLOGICALS
135 LO DUC STREET, HANOI

VẮC XIN BẠI LIỆT UỐNG NHỊ LIÊN

Mỗi liều 2 giọt (0,1ml) dung dịch vắc xin chứa virus bại liệt sống, giảm độc lực chủng Sabin:

Typ 1: ≥ $10^{6,0}$ $CCID_{50}$
Typ 3: ≥ $10^{5,5}$ $CCID_{50}$
Chất chỉ thị màu: đỏ Phenol
Chất ổn định: Magnesi Cloride
Kháng sinh: Kanamycin, Erythomycin
Chỉ định: Phòng bệnh bại liệt
Chống chỉ định, cách dùng và các thông tin khác: xem trong tờ HDSD kèm theo

Đọc kỹ HDSD trước khi dùng
Để xa tầm tay trẻ em

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ

Rx Thuốc bán theo đơn

POLYVAC

VẮC XIN BẠI LIỆT UỐNG NHỊ LIÊN
VIRUS SỐNG - HAI TYP

Dung dịch uống, không được tiêm

Hộp - 10 lọ 2ml - 20 liều
Bảo quản ở -20±5°C: 24 tháng, từ 2°C đến 8°C: 6 tháng
Sản xuất theo tiêu chuẩn: Nhà sản xuất

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, SẢN XUẤT VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
135 Lò Đúc, Hà Nội

BIVALENT ORAL POLIOMYELITIS VACCINE

Each dose 2 drops (0,1ml) contains Sabin live attenuated poliovirus:

Type 1: ≥ $10^{6,0}$ $CCID_{50}$
Type 3: ≥ $10^{5,5}$ $CCID_{50}$
Colour indicator: Phenol Red
Stabilizer: Magnesium Chloride
Kanamycin, Erythomycin
Indication: active immunization against poliomyelitis
Contraindications, usage and others: see the attached leaflet

Read the leaflet carefully before using
Keep out of reach of children

MẪU HỘP VẮC XIN

(Hộp 10 lọ x 1mL x 10 liều)

(Nếu sản phẩm được cung cấp cho Chương trình Tiêm chủng mở rộng sẽ bổ sung thêm dòng chữ "Dùng cho TCMR, không được bán" ở phần Tiếng Việt và "Only for EPI, not for sale" ở phần Tiếng Anh)

Rx Prescription Drug

POLYVAC

BIVALENT ORAL POLIOMYELITIS VACCINE

LIVE VIRUS - BIVALENT

For oral, not for injection

Box 10 vials x 1 ml x 10 doses

Store at - 20±5°C: 24 months, 2°C to 8°C: 6 months

Spec: Manufacturer's

CENTER FOR RESEARCH AND PRODUCTION OF VACCINES AND BIOLOGICALS
135 LO DUC STREET, HANOI

VẮC XIN BẠI LIỆT UỐNG NHỊ LIÊN

Mỗi liều 2 giọt (0,1ml) dung dịch vắc xin chứa virus bại liệt sống, giảm độc lực chủng Sabin:

Typ 1: $\geq 10^{6,0}$ $CCID_{50}$

Typ 3: $\geq 10^{5,5}$ $CCID_{50}$

Chất chỉ thị màu: đỏ Phenol
Chất ổn định: Magnesi Cloride
Kháng sinh: Kanamycin, Erythromycin
Chỉ định: Phòng bệnh bại liệt
Chống chỉ định, cách dùng và các thông tin khác: xem trong tờ HDSD kèm theo

Đọc kỹ HDSD trước khi dùng
Để xa tầm tay trẻ em

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ

Rx Thuốc bán theo đơn

POLYVAC

VẮC XIN BẠI LIỆT UỐNG NHỊ LIÊN

VIRUS SỐNG - HAI TYP

Dung dịch uống, không được tiêm

Hộp 10 lọ x 1 ml x 10 liều

Bảo quản ở - 20±5°C: 24 tháng, từ 2°C đến 8°C: 6 tháng

Sản xuất theo tiêu chuẩn: NSX

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, SẢN XUẤT VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
135 Lò Đúc, Hà Nội

BIVALENT ORAL POLIOMYELITIS VACCINE

Each dose 2 drops (0,1ml) contains Sabin live attenuated poliovirus:

Typ 1: $\geq 10^{6,0}$ $CCID_{50}$

Typ 3: $\geq 10^{5,5}$ $CCID_{50}$

Colour indicator: Phenol Red
Stabilizer: magnesium chloride
Kanamycin, Erythromycin
Indication: active immunization against poliomyelitis
Contraindications, usage and others: see the attached leaflet

Read the leaflet carefully before using
Keep out of reach of children

POLYVAC

Số đăng ký (Reg) :

Số lô SX (Lot) :

NSX (Prod) :

HSD (Exp) :

MẪU NHÃN DÁN LỌ VẮC XIN

(Nếu sản phẩm được cung cấp cho Chương trình Tiêm chủng mở rộng sẽ bổ sung dòng chữ "Dùng cho TCMR, không được bán")

Lọ 1ml x 10 liều:





Lọ 2ml x 20 liều:





HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VẮC XIN BẠI LIỆT UỐNG NHỊ LIÊN

Vắc xin bại liệt uống nhị liên (bOPV) gồm 2 typ virus 1 và 3 giảm độc lực (chủng Sabin) sản xuất trên tế bào thận khỉ Macaca mulatta và được ổn định bằng Magnesi Cloride. Vắc xin phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam và phù hợp với tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới.

Thành phần

Mỗi liều (2 giọt tương đương với 0,1ml) chứa:

- Virus vắc xin bại liệt sống, giảm độc lực chủng Sabin:

  Typ 1: ≥ $10^{6,0}$ $CCID_{50}$

  Typ 3: ≥ $10^{5,5}$ $CCID_{50}$
- Chỉ thị màu: Đỏ Phenol
- Chất ổn định: Magnesi Cloride
- Kháng sinh: Kanamycin, Erythromycin

Dạng bào chế:
Dung dịch uống, trong suốt, màu hồng

Chỉ định

Uống phòng bệnh bại liệt

Liều lượng và cách dùng
Đường uống: Vắc xin chỉ dùng để uống (không được tiêm)

Liều uống: 0,1ml/liều (tương đương 2 giọt)

Lịch uống: Theo lịch của chương trình TCMR dùng cho trẻ từ 2 tháng tuổi trở lên. Trẻ phải uống ít nhất 3 liều vắc xin bại liệt, mỗi liều cách nhau ít nhất 4 tuần

Cách uống: Để tan băng vắc xin, dùng ống nhỏ giọt hút vắc xin và nhỏ trực tiếp hai giọt vắc xin vào miệng trẻ.

Chống chỉ định
Không dùng cho trẻ bị bệnh bạch cầu, u lympho và các bệnh ác tính khác; các bệnh suy giảm hoặc không có miễn dịch tế bào (giảm hoặc không có gamaglobulin huyết); đang dùng các loại thuốc ức chế miễn dịch; nôn; tiêu chảy; có tiền sử dị ứng với vắc xin.
Đối với các bệnh cấp sốt cao, bệnh mạn tính nặng, nhiễm khuẩn cấp kèm sốt nên hoãn dùng vắc xin.

Thận trọng khi dùng
Khi cho trẻ uống không để nước bọt của trẻ dính vào ống nhỏ giọt. Trẻ tiêu chảy có thể dùng vắc xin này nhưng phải được uống lại vào tháng sau khi ngừng tiêu chảy.

Có thể dùng cùng lúc với vắc xin khác trong chương trình TCMR.

Tác dụng không mong muốn
Đa số các trường hợp không có tác dụng phụ. Chưa phát hiện trường hợp bị bại liệt do uống vắc xin trong thời gian lưu hành. Không thấy tác dụng phụ đối với trẻ bị ốm khi uống vắc xin.

Thông báo cho bác sĩ các tác dụng không mong muốn khi sử dụng vắc xin.

Quá liều: Không có số liệu

Dược lâm sàng
Cơ chế tác dụng
Vắc xin bại liệt uống kích thích hệ miễn dịch của cơ thể tạo kháng thể kháng virus bại liệt typ 1, 3. Virus vắc xin tiếp tục tồn tại trong đường tiêu hóa người từ 4-6 tuần, kích thích quá trình tạo kháng thể trung hòa và miễn dịch thể dịch.

Dược động học
Quá trình kích thích tạo kháng thể xảy ra sau khi uống OPV 7 - 10 ngày và đạt cao nhất sau 3 tuần. Hầu hết trẻ em đều được bảo vệ sau khi uống liều 1 và phần lớn trẻ em được bảo vệ sau khi uống 2 liều vắc xin. Một số nghiên cứu ở trẻ em cho thấy 95% trẻ uống vắc xin có kháng thể bảo vệ đối với cả 2 typ virus trong 5 năm sau khi chủng ngừa.

Bảo quản và hạn dùng
Vắc xin giữ được hiệu giá khi được bảo quản ở nhiệt độ -20 ± 5°C cho tới khi hết hạn sử dụng ghi trên lọ. Vắc xin chỉ được dùng 6 tháng ở nhiệt độ +2°C đến +8°C.
Lọ vắc xin đã mở nắp chỉ được sử dụng ngay trong ngày khi được bảo quản ở +2°C đến +8°C.
Ngày hết hạn phụ thuộc vào các điều kiện bảo quản sau:

Bảo quản ở nhiệt độ -20 ± 5 °C: 24 tháng
Bảo quản ở nhiệt độ +2°C đến +8°C: 6 tháng

Đóng gói
01 lọ chứa 1 ml dung dịch vắc xin (tương đương với 10 liều) hoặc chứa 2 ml dung dịch vắc xin (tương đương với 20 liều).
Một hộp nhỏ chứa 10 lọ vắc xin kèm tờ hướng dẫn sử dụng.

Ngày cập nhật: .....

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SỸ

POLYVAC
BỘ Y TẾ
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
135 Lò Đúc - Hà Nội

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ

TUQ CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Thu Thủy