

Bài tập Giải tích hàm

(cập nhật Ngày 20 tháng 10 năm 2020)

1 Không gian metric

Bài tập 1.1. Chứng minh rằng các mệnh đề sau là tương đương.

- i) $\forall r > 0, \exists$ ít nhất một $y \in S^*(x, r) \cap A$.
- ii) $\forall r > 0, \exists$ vô số $y \in S^*(x, r) \cap A$,
- iii) $\exists \{x_n\} \subset A, x_n \neq x, x_n \rightarrow x$.

Bài tập 1.2. Chứng minh rằng nếu tập A trong không gian metric (X, d) bị chặn thì bao đóng của nó \bar{A} cũng bị chặn.

Bài tập 1.3. Chứng minh rằng nếu F là tập đóng thì có một dãy các tập mở G_n sao cho $F = \bigcap_{n=1}^{\infty} G_n$.

Bài tập 1.4. Chứng minh rằng nếu G là tập mở thì có một dãy các tập đóng F_n sao cho $G = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$.

Bài tập 1.5. Chứng minh rằng $\forall x \in \mathbb{R}, \forall r > 0, S(x, r)$ chứa vô số các điểm hữu tỉ và vô tỉ.
Hệ quả: $\partial\mathbb{Q} = \mathbb{R}, \overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$.

Bài tập 1.6. Chứng minh rằng tập các đa thức trên $[0, 1]$ không đóng và không mở trong $C[0, 1]$.

Bài tập 1.7. Trên tập nền các số tự nhiên \mathbb{N} ta xây dựng metric sau:

$$d(m, n) = \begin{cases} 0, & \text{nếu } m = n, \\ 1 + \frac{1}{m+n}, & \text{nếu } m \neq n. \end{cases}$$

Chứng minh rằng (\mathbb{N}, d) là một không gian metric đủ.

Bài tập 1.8. Chứng minh nguyên lý Cantor: Trong một không gian metric đủ, mọi dãy hình cầu đóng thất dần

$$S_1 \supset S_2 \supset \cdots \supset S_n \supset \cdots, \quad r_n \rightarrow 0$$

đều có một điểm chung duy nhất.

Bài tập 1.9. Dùng nguyên lý ánh xạ co chứng minh dãy số $x_n = \frac{1}{2 + \frac{1}{2 + \cdots + \frac{1}{2}}}$ (n phép chia) hội tụ và tìm giới hạn của nó.

Bài tập 1.10. Trên tập nền $X = C[0, a]$ các hàm số liên tục trên $[0, a]$ xét các metric

$$d_0(x, y) = \max_{[0, a]} |x(t) - y(t)|, \quad d(x, y) = \max_{[0, a]} e^{-Lt} |x(t) - y(t)|.$$

Chứng minh rằng (X, d_0) và (X, d) là các không gian metric đủ.

Bài tập 1.11. Chứng minh rằng ánh xạ $A(x) := x_0 + \int_0^t f(s, x(s))ds$ là co trong (X, d) của bài tập 1.10, từ đó suy ra bài toán Cauchy

$$\begin{cases} \dot{x} = f(t, x), \\ x(0) = x_0, \end{cases} \quad (CP)$$

ở đó $f(t, x)$ là hàm liên tục theo $t \in [0, a]$ và liên tục Lipschitz theo x

$$|f(t, x) - f(t, y)| \leq L|x - y|, \quad \forall t \in [0, a], \forall x, y \in \mathbb{R}, \quad (L > 0).$$

có nghiệm (duy nhất) trên đoạn $[0, a]$ bất kỳ.

Bài tập 1.12. Chứng minh rằng nếu tập con $F \subset C[0, 1]$ là liên tục đồng bậc thì bao đóng \overline{F} của nó cũng liên tục đồng bậc.

Bài tập 1.13. Những tập nào dưới đây là compact tương đối trong $C[0, 1]$?

a) $x_n(t) = t^n, n \in \mathbb{N},$

e) $x_n(t) = \sin \alpha t, \alpha \in [1, 2],$

b) $x_n(t) = \sin nt, n \in \mathbb{N},$

f) $x_n(t) = \arctan \alpha t, \alpha \in \mathbb{R},$

c) $x_n(t) = \sin(t + n), n \in \mathbb{N},$

d) $x_\alpha(t) = \sin \alpha t, \alpha \in \mathbb{R},$

g) $x_n(t) = e^{t-\alpha}, \alpha \in \mathbb{R}, \alpha \geq 0.$

Bài tập 1.14. Chứng minh rằng hợp hữu hạn của các tập compact là compact.

Bài tập 1.15. Chứng minh mọi ánh xạ đẳng cự đưa tập compact vào trong nó là toàn ánh.

Bài tập 1.16 (Định lý Dini). Một dãy tăng dần các hàm số liên tục $f_1(x) \leq f_2(x) \leq \dots$ mà hội tụ trên một tập compact M tới một hàm số liên tục $f(x)$ thì nó phải hội tụ đều trên M .

2 Không gian tuyến tính định chuẩn

Bài tập 2.1. Chứng minh rằng trong $X = C[a, b]$, các chuẩn $\|x\|_0 = \max_{a \leq t \leq b} |x(t)|$ và $\|x\|_1 = \int_a^b |x(t)|dt$ là không tương đương.

Bài tập 2.2. Cho $A_n : C[0, 1] \rightarrow C[0, 1], (A_n x)(t) = x\left(t^{1+\frac{1}{n}}\right)$. Chứng minh rằng:

a) A_n là toán tử tuyến tính liên tục,

b) A_n hội tụ điểm đến toán tử đơn vị I ,

c) A_n không hội tụ đều đến I .

Bài tập 2.3. Cho $L = \{x = (x_1, \dots, x_n, \dots) \in l_2 : \sum_{n=1}^{\infty} x_n = 0\}$. Chứng minh

a) L là không gian con của l_2 ,

b) L không đóng trong l_2 .

Bài tập 2.4. Chứng minh rằng không gian $L(X, Y)$ là đủ khi và chỉ khi Y là đủ.

Bài tập 2.5. Chứng minh rằng $l_p(1 \leq p \leq \infty)$ là các không gian định chuẩn đủ (Banach).

Bài tập 2.6. Chứng minh rằng $l_p(1 \leq p < \infty)$ là các không gian khả ly, l_∞ không khả ly.

Bài tập 2.7. Chứng minh rằng các không gian $c = \{x_n\}_1^\infty$ hội tụ và c_0 là đầy đủ và khả ly.

Bài tập 2.8. Chứng minh rằng toán tử đạo hàm $\frac{d}{dt} : C^1[0, 1] \rightarrow C[0, 1]$ là compact nếu $C^1[0, 1]$ với chuẩn $\|x\| = \max_{0 \leq t \leq 1} |x(t)| + \max_{0 \leq t \leq 1} |x'(t)|$.

Bài tập 2.9. Cho toán tử compact $A : X \rightarrow Y$, ở đó X, Y là các không gian Banach và $\text{Im } A = Y$. Chứng minh $\dim Y < +\infty$.

3 Độ đo và tích phân Lebesgue

3.1 Độ đo Lebesgue

Bài tập 3.1 (Characterisation of Jordan measurability). Các mệnh đề sau là tương đương.

- i) E là đo được Jordan,
- ii) $\forall \epsilon > 0, \exists$ các tập sơ cấp $A \subset E \subset B$ sao cho $m(B \setminus A) < \epsilon$,
- iii) $\forall \epsilon > 0, \exists$ tập sơ cấp A sao cho $m^{*,J}(A \Delta E) < \epsilon$.

Bài tập 3.2. Cho $E \subset \mathbb{R}^d$ là một tập bị chặn. Chứng minh rằng

- a) $\mu^{*,J}(E) = \mu^{*,J}(\overline{E})$,
- b) $\mu_{*,J}(E) = \mu_{*,J}(E^\circ)$,
- c) E là đo được Jordan $\Leftrightarrow \mu^{*,J}(\partial E) = 0$,
- d) $[0, 1] \cap \mathbb{Q}$ và $[0, 1] \setminus \mathbb{Q}$ không đo được Jordan.

Bài tập 3.3 (Criteria for measurability). Cho $E \subset \mathbb{R}^d$. Các mệnh đề sau là tương đương.

- 1) E là đo được Lebesgue,
- 2) $\forall \epsilon > 0, \exists$ tập mở $U \supset E$ sao cho $m^{*,L}(U \setminus E) \leq \epsilon$,
- 3) $\forall \epsilon > 0, \exists$ tập mở U sao cho $m^{*,L}(U \Delta E) \leq \epsilon$,
- 4) $\forall \epsilon > 0, \exists$ tập đóng $F \subset E$ sao cho $m^{*,L}(E \setminus F) \leq \epsilon$,
- 5) $\forall \epsilon > 0, \exists$ tập đóng F sao cho $m^{*,L}(E \Delta F) \leq \epsilon$,
- 6) $\forall \epsilon > 0, \exists$ tập đo được Lebesgue E_ϵ sao cho $m^{*,L}(E \Delta E_\epsilon) \leq \epsilon$.

Bài tập 3.4. Chứng minh rằng

a) E đo được Jordan \Rightarrow đo được Lebesgue, $m^J(E) = m^L(E)$.

b) tập Cantor là một tập hợp compact, không đếm được, và có độ đo Lebesgue bằng không.

Bài tập 3.5 (Carathéodory criterion). Cho $E \subset \mathbb{R}^d$. Các mệnh đề sau là tương đương

i) E là đo được Lebesgue,

ii) Với mọi tập sơ cấp A , $m(A) = m^{*,L}(A \cap E) + m^{*,L}(A \setminus E)$,

iii) Với mọi hình hộp B , $m(B) = m^{*,L}(B \cap E) + m^{*,L}(B \setminus E)$.

Bài tập 3.6 (Inner measure). Cho $E \subset \mathbb{R}^d$ là một tập bị chặn và $E \subset A$, ở đó A là một tập sơ cấp.

$$m_{*,L}(E) := m(A) - m^{*,L}(A \setminus E).$$

Khi đó,

i) $m_{*,L}(E)$ không phụ thuộc vào cách chọn tập sơ cấp A (well-defined),

ii) $m_{*,L}(E) \leq m^{*,L}(E)$ và dấu bằng xảy ra $\Leftrightarrow E$ là đo được Lebesgue.

Bài tập 3.7 (Inner regularity). Cho $E \subset \mathbb{R}^d$ là tập đo được Lebesgue. Chứng minh rằng

$$m^L(E) = \sup_{K \subset E, K \text{ compact}} m^L(K).$$

3.2 Hàm số đo được

Bài tập 3.8. Chứng minh rằng

1) Nếu $f(x)$ đo được thì $\forall \alpha > 0, |f(x)|^\alpha$ đo được.

2) Nếu $f(x)$ và $g(x)$ đo được và hữu hạn thì

$$f \pm g, fg, \max\{f, g\}, \min\{f, g\}$$

đo được, và nếu $g(x) \neq 0 \forall x$ thì $\frac{1}{g}$ cũng đo được.

3) Nếu $\{f_n(x)\}$ đo được thì

$$\sup_n f_n(x), \inf_n f_n(x), \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} f_n(x), \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$$

đo được. Nói riêng, $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$, nếu tồn tại, cũng đo được.

Bài tập 3.9. Hàm số Dirichlet $f(x) = \begin{cases} 0, & \text{nếu } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}, \\ 1, & \text{nếu } x \in \mathbb{Q}. \end{cases}$ có đo được hay không?

3.3 Tích phân Lebesgue

Bài tập 3.10. Chứng minh rằng nếu

$$f(x) = \sum_{i=1}^n \alpha_i 1_{A_i}(x) = \sum_{j=1}^s \beta_j 1_{B_j}(x),$$

ở đó A_i là các tập đôi một rời nhau, B_j là các tập đôi một rời nhau thì $\sum_{i=1}^n \alpha_i \mu(A_i) = \sum_{j=1}^s \beta_j \mu(B_j)$.

Bài tập 3.11. Chứng minh các tính chất sau của tích phân Lebesgue

1) $\int_A c d\mu = c\mu(A), \forall c \in \mathbb{R}.$

2) $\int_A \alpha 1_B(x) d\mu = \alpha \mu(B \cap A).$

3) $\int_A \sum_{i=1}^n \alpha_i 1_{B_i}(x) d\mu = \sum_{i=1}^n \alpha_i \mu(B_i \cap A).$

4) $\mu(A) = 0$ và f đo được thì $\int_A f d\mu = 0.$

5) $\mu(A) < +\infty$, f đo được và bị chặn trên A thì f khả tích trên A .

6) **Cộng tính:** Nếu $A \cap B = \emptyset$ thì $\int_{A \cup B} f d\mu = \int_A f d\mu + \int_B f d\mu.$

7) **Bảo toàn thứ tự:** i) $f \sim g \Rightarrow \int_A f d\mu = \int_A g d\mu,$ ii) $f \leq g$ (h.k.n) $\Rightarrow \int_A f d\mu \leq \int_A g d\mu.$

8) **Tuyến tính:** $\int_A (\alpha f + \beta g) d\mu = \alpha \int_A f d\mu + \beta \int_A g d\mu.$

Bài tập 3.12. Chứng minh rằng

1) f khả tích $\Leftrightarrow |f|$ khả tích, và $|\int_A f| \leq \int_A |f|.$

2) $\begin{cases} |f| \leq g \text{ h.k.n trên } A, \\ g \text{ khả tích} \end{cases} \Rightarrow f \text{ khả tích.}$

3) f, g khả tích $\Rightarrow f \pm g$ khả tích.

4) f khả tích và g bị chặn $\Rightarrow fg$ khả tích.

Bài tập 3.13. Chứng minh rằng nếu $\{f_n\}$ và $\{g_n\}$ là hai dãy đơn điệu tăng các hàm đơn giản không âm

và $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n = \lim_{n \rightarrow \infty} g_n$ thì

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_A f_n d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_A g_n d\mu.$$

Bài tập 3.14. Cho f là một hàm đo được không âm. Chứng minh rằng $\int_A f d\mu = 0 \Leftrightarrow f = 0$ (h.k.n).

Bài tập 3.15. Chứng minh rằng hàm số f khả tích Riemann trên $[a, b]$ thì cũng khả tích Lebesgue trên

đó, và

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{[a,b]} f dm^L.$$

4 Không gian Hilbert

4.1 Bài tập ĐSTT (nhắc lại)

Bài tập 4.1. Cho V là không gian tiền Hilbert. Chứng minh:

a) $\|u+v\|^2 + \|u-v\|^2 = 2(\|u\|^2 + \|v\|^2).$

b) $u \perp v \Leftrightarrow \|u+v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2, \forall u, v \in V.$

Bài tập 4.2. Giả sử V là KGVN n chiều với cơ sở $B = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$. Với u, v là các véc tơ của V ta có phân tích duy nhất

$$u = a_1 e_1 + a_2 e_2 + \dots + a_n e_n, \quad v = b_1 e_1 + b_2 e_2 + \dots + b_n e_n.$$

Đặt $\langle u, v \rangle = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n$

a) Chứng minh $\langle u, v \rangle$ là một tích vô hướng trên V .

b) Áp dụng cho trường hợp $V = \mathbb{R}^3$, với $e_1 = (1, 0, 1), e_2 = (1, 1, -1), e_3 = (0, 1, 1), u = (2, -1, -2), v = (2, 0, 5)$. Tính $\langle u, v \rangle$.

c) Áp dụng cho trường hợp $V = P_2[x]$, với $B = \{1, x, x^2\}, u = 2 + 3x^2, v = 6 - 3x - 3x^2$. Tính $\langle u, v \rangle$.

d) Áp dụng cho trường hợp $V = P_2[x]$, với $B = \{1 + x, 2x, x - x^2\}, u = 2 + 3x^2, v = 6 - 3x - 3x^2$. Tính $\langle u, v \rangle$.

Bài tập 4.3. Xét không gian $P_3[x]$. Kiểm tra các dạng $\langle p, q \rangle$ sau có phải là tích vô hướng hay không?

a) $\langle p, q \rangle = p(0)q(0) + p(1)q(1) + p(2)q(2)$

b) $\langle p, q \rangle = p(0)q(0) + p(1)q(1) + p(2)q(2) + p(3)q(3)$

c) $\langle p, q \rangle = \int_{-1}^1 p(x)q(x)dx$ Trong trường hợp là tích vô hướng tính $\langle p, q \rangle$ với $p = 2 - 3x + 5x^2 - x^3, q = 4 + x - 3x^2 + 2x^3$

Bài tập 4.4. Dùng phương pháp trực chuẩn hóa Gram - Schmidt xây dựng hệ trực chuẩn từ hệ véc tơ $\{u_1, u_2, u_3, u_4\}$ với $u_1 = (1, 1, 1, 1), u_2 = (0, 1, 1, 1), u_3 = (0, 0, 1, 1), u_4 = (0, 0, 0, 1)$ trong \mathbb{R}^4 với tích vô hướng chính tắc

Bài tập 4.5. Trong $P_2[x]$ định nghĩa tích vô hướng $\langle p, q \rangle = \int_{-1}^1 p(x)q(x)dx$ với $p, q \in P_2[x]$.

a) Trực chuẩn hoá Gram - Schmidt cơ sở $\mathbb{B} = \{1, x, x^2\}$ để nhận được cơ sở trực chuẩn \mathcal{A} .

b) Xác định ma trận chuyển cơ sở từ \mathbb{B} sang \mathcal{A}

c) Tìm $[r]_{\mathcal{A}}$ biết $r = 2 - 3x + 3x^2$

Bài tập 4.6. Cho không gian tiền Hilbert V hữu hạn chiều, W là không gian con của V và u là một véc tơ của V . Chứng minh:

a) Tồn tại véc tơ u' của W sao cho $(u - u') \perp W$

b) Khi đó $\|u - u'\| \leq \|u - w\|, \forall w \in W$

Bài tập 4.7. Tìm hình chiếu của véc tơ này lên véc tơ kia

a) $u = (1, 3, -2, 4), v = (2, -2, 4, 5)$

b) $u = (4, 1, 2, 3, -3), v = (-1, -2, 5, 1, 4)$

Bài tập 4.8. Cho V là không gian tiền Hilbert n chiều, chứng minh điều kiện cần và đủ để ánh xạ $f : V \rightarrow \mathbb{R}$ tuyến tính là tồn tại véc tơ a cố định của V để $f(x) = \langle a, x \rangle, \forall x \in V$

Bài tập 4.9. Trong \mathbb{R}^5 với tích vô hướng chính tắc cho các véc tơ $v_1 = (1, 1, 0, 0, 0), v_2 = (0, 1, -1, 2, 1), v_3 = (2, 3, -1, 2, 1)$. Gọi $V = \{x \in \mathbb{R}^5 \mid x \perp v_i, i = 1, 2, 3\}$

a) Chứng minh V là không gian véc tơ con của \mathbb{R}^5 .

b) Tìm $\dim V$.

4.2 Không gian Hilbert

Bài tập 4.10. Cho L là không gian con đóng của không gian Hilbert H . Chứng minh rằng

$$x \in L^\perp \Leftrightarrow \forall y \in L, \|x\| \leq \|x - y\|.$$

Bài tập 4.11. Cho $f : H \rightarrow \mathbb{R}$ là một toán tử tuyến tính không bị chặn, ở đó H là một không gian Hilbert. Chứng minh rằng $\overline{\ker f} = H$.

Bài tập 4.12. Cho L là một không gian con đóng của không gian Hilbert H . Chứng minh rằng

$$\forall x \in H, \min_{u \in L} \|x - u\| = \max_{v \in L^\perp, \|v\|=1} |(x, v)|.$$

Bài tập 4.13. Tìm toán tử liên hợp của

a) $R : l_2 \rightarrow l_2, (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots) \mapsto (0, x_1, x_2, \dots, x_n, \dots),$

b) $L : l_2 \rightarrow l_2, (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots) \mapsto (x_2, x_3, \dots, x_n, \dots).$

Bài tập 4.14. Cho H là không gian tiền Hilbert sao cho mọi không gian con đóng $L \subset H$ có tính chất $(L^\perp)^\perp = L$. Chứng minh rằng H là một không gian Hilbert.

Bài tập 4.15. Cho $(X, \|\cdot\|)$ là một không gian tuyến tính định chuẩn thỏa mãn đẳng thức hình bình hành $\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2)$. Chứng minh rằng X là một không gian có tích vô hướng.

4.3 Lý thuyết phổ của toán tử

Bài tập 4.16. Cho các toán tử $l_2 \rightarrow l_2$

$$R : (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots) \mapsto (0, x_1, x_2, \dots, x_n, \dots),$$

$$L : (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots) \mapsto (x_2, x_3, \dots, x_n, \dots).$$

Chứng minh rằng

$$a) \sigma_p(L) = \{\lambda \in \mathbb{C}, |\lambda| < 1\}, \quad \sigma_c(L) = \{\lambda \in \mathbb{C}, |\lambda| = 1\}, \quad \sigma_r(L) = \emptyset.$$

$$b) \sigma_p(R) = \emptyset, \quad \sigma_c(R) = \{\lambda \in \mathbb{C}, |\lambda| \leq 1, \lambda \neq 0\}, \quad \sigma_r(R) = \{0\}.$$

Bài tập 4.17. Cho $X = C[a, b]$, $\phi \in X$ và $A_\phi : X \rightarrow X$, $A_\phi(f) = \phi f$ (toán tử nhân). Chứng minh rằng

a) Nếu ϕ là đơn điệu thì A_ϕ không có trị riêng.

$$b) \sigma(A_\phi) = \phi([a, b]).$$

Bài tập 4.18. Chứng minh rằng nếu $A : H \rightarrow H$ là một toán tử tuyến tính liên tục, tự liên hợp trên không gian Hilbert H thì

a) $\sigma(A) \subset \mathbb{R}$. Nói riêng, các trị riêng của toán tử tuyến tính tự liên hợp đều là các số thực.

$$b) \|A\| = \sup_{\|x\|=1} |(Ax, x)|,$$

$$c) r(A) = \|A\|,$$

$$d) \sigma_r(A) = \emptyset.$$

Bài tập 4.19. Chứng minh rằng nếu $A : H \rightarrow H$ là một toán tử tuyến tính liên tục trên không gian Hilbert H thì $\sigma(A) \neq \emptyset$.

Bài tập 4.20. Chứng minh rằng nếu λ là phổ dư của toán tử tuyến tính liên tục A trên không gian Hilbert H thì $\bar{\lambda}$ là một trị riêng của A^* .

Bài tập 4.21. Cho A là một toán tử tuyến tính liên tục trên không gian Hilbert H và $\lambda, \mu \in \rho(A)$. Chứng minh rằng các toán tử dải R_λ, R_μ thỏa mãn

$$R_\lambda R_\mu = R_\mu R_\lambda \text{ và } R_\lambda - R_\mu = (\mu - \lambda)R_\lambda R_\mu.$$