Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Escuela de Ciencias Economicas y Administrativas

Taller de Econometría

Autocorrelación: Diagnóstico y Corrección

Estudiante: Emanuel Quintana Silva

Curso: Econometría

Datos: Precio interno del cobre, EE.UU., 1951–1980

Fuente: Gujarati & Porter (2010), Tabla 12.7

Fecha: 14 de abril de 2026

Modelo log-log estimado por Mínimos Cuadrados Ordinarios:

$$\ln C_t = \beta_1 + \beta_2 \ln I_t + \beta_3 \ln L_t + \beta_4 \ln A_t + u_t$$

Índice

1. Estimación OLS del modelo log-log e interpretación **2**
1.1. Definición de variables . . . 2
1.2. Resultados de la estimación . . . 2
1.3. Ecuación estimada . . . 2
1.4. Interpretación económica de los coeficientes . . . 2
1.5. Bondad del ajuste . . . 3

2. Residuos y diagnóstico visual de autocorrelación **3**
2.1. Obtención de residuos . . . 3
2.2. Gráficas de diagnóstico . . . 4
2.3. Interpretación . . . 4

3. Estadístico de Durbin-Watson **5**
3.1. Hipótesis y estadístico . . . 5
3.2. Resultado de Stata . . . 5
3.3. Región de decisión . . . 5
3.4. Estimación de ρ . . . 5
3.5. Limitaciones del estadístico DW . . . 5

4. Prueba de Rachas (Wald-Wolfowitz) **6**
4.1. Fundamento . . . 6
4.2. Hipótesis . . . 6
4.3. Estadístico . . . 6
4.4. Resultado de Stata . . . 6
4.5. Decisión . . . 6
4.6. Comparación con Durbin-Watson (punto C) . . . 7

5. Prueba del Multiplicador de Lagrange (Breusch-Godfrey) **7**
5.1. Fundamento . . . 7
5.2. Hipótesis . . . 7
5.3. Procedimiento . . . 7
5.4. Resultados . . . 7
5.5. Interpretación . . . 8
5.6. ¿Describe mejor un proceso AR(1)? . . . 8

6. Estimación con errores estándar de Newey-West (HAC) **8**
6.1. Motivación . . . 8
6.2. El estimador Newey-West . . . 8
6.3. Resultados comparativos . . . 9
6.4. Interpretación de los resultados . . . 9
6.5. Comando Stata . . . 10

Diagnósticos adicionales **10**

Conclusiones generales **11**

(A) Estimación OLS del modelo log-log e interpretación

Definición de variables. El modelo analiza los determinantes del precio interno del cobre en los Estados Unidos durante el período 1951–1980 mediante una especificación doble-logarítmica:

$$\ln C_t = \beta_1 + \beta_2 \ln I_t + \beta_3 \ln L_t + \beta_4 \ln A_t + u_t \tag{1}$$

donde:

- C_t: precio promedio (doce meses) del cobre en EE.UU. (centavos/libra)
- I_t: índice promedio (doce meses) de la producción industrial
- L_t: precio promedio (doce meses) del cobre en la bolsa de metales de Londres (libras esterlinas)
- A_t: precio promedio (doce meses) del aluminio (centavos de dólar/libra)

Resultados de la estimación. La Tabla 1 presenta los resultados de la regresión por MCO estimada con Stata.

Cuadro 1: Estimación MCO — Modelo log-log (Variable dependiente: $\ln C_t$)

Variable	Coeficiente	Error est.	t	$P > \lvert t \rvert$	IC 95 % inf.	IC 95 % sup.
$\ln I_t$	0.4671	0.1614	2.89	0.008	0.1354	0.7988
$\ln L_t$	0.2807	0.1151	2.44	0.022	0.0442	0.5173
$\ln A_t$	0.4389	0.1049	4.18	0.000	0.2233	0.6545
Constante	−1.5344	0.2765	−5.55	0.000	−2.1028	−0.9660
$n = 30$	$R^2 = 0{,}9345$	$\bar{R}^2 = 0{,}9269$	$F(3, 26) = 123{,}61$	$(p < 0{,}0001)$	RCME = 0,1209	

Ecuación estimada.

$$\widehat{\ln C_t} = -1{,}5344 + 0{,}4671 \ln I_t + 0{,}2807 \ln L_t + 0{,}4389 \ln A_t \tag{2}$$

Interpretación económica de los coeficientes. En un modelo log-log cada coeficiente es directamente una **elasticidad**:

1. $\hat{\beta}_2 = 0{,}4671$ **(elasticidad respecto a I_t):** Un aumento de 1 % en el índice de producción industrial eleva el precio interno del cobre en aproximadamente **0,47 %**, *ceteris paribus*. Esto refleja el efecto demanda: mayor actividad industrial presiona al alza el precio del cobre. El coeficiente es positivo y estadísticamente significativo ($p = 0{,}008$).
2. $\hat{\beta}_3 = 0{,}2807$ **(elasticidad respecto a L_t):** Un incremento de 1 % en el precio del cobre en Londres se asocia con un aumento de **0,28 %** en el precio doméstico. Esto es coherente con la integración de los mercados internacionales del cobre; la

relación no es uno a uno porque existen fricciones (aranceles, costos de transporte, diferencias de calidad). Significativo al 5 % ($p = 0{,}022$).

3. $\hat{\beta}_4 = 0{,}4389$ **(elasticidad respecto a A_t):** Un aumento de 1 % en el precio del aluminio eleva el precio del cobre en **0,44 %**. El aluminio es un sustituto industrial del cobre: cuando el aluminio se encarece, la demanda se desplaza hacia el cobre, elevando su precio. Es el coeficiente más preciso ($p < 0{,}001$).
4. **Constante** $\hat{\beta}_1 = -1{,}5344$**:** Logaritmo del factor de escala del modelo; no tiene interpretación económica directa, aunque su significancia confirma que el modelo no debería estimarse sin término independiente.

Bondad del ajuste. El modelo explica el 93,45 % de la variación en $\ln C_t$ ($R^2 = 0{,}9345$), y el ajustado ($\bar{R}^2 = 0{,}9269$) es prácticamente igual, lo que indica que los tres regresores son conjuntamente relevantes. El estadístico F ($= 123{,}61$, $p < 0{,}0001$) rechaza la hipótesis nula de que todos los coeficientes son simultáneamente cero.

(B) Residuos y diagnóstico visual de autocorrelación

Obtención de residuos. Los residuos MCO se definen como

$$\hat{u}_t = \ln C_t - \widehat{\ln C_t}, \qquad t = 1951, \ldots, 1980.$$



(a) Residuos MCO a lo largo del tiempo (1951–1980).



(b) Diagrama de dispersión $\hat{u}_t$ vs. $\hat{u}_{t-1}$.

Figura 1: Diagnóstico gráfico de autocorrelación en los residuos MCO.

Gráficas de diagnóstico.

Interpretación. Figura 1a (residuos vs. tiempo): Los residuos no oscilan aleatoriamente alrededor de cero. Se observan *clusters* de residuos positivos (p.ej., 1956–1957 y 1973–1974) y clusters de residuos negativos (1951–1955, 1958–1963), lo que es un patrón característico de **autocorrelación positiva**: valores grandes van seguidos de valores grandes del mismo signo.

Figura 1b ($\hat{u}_t$ vs. $\hat{u}_{t-1}$): La nube de puntos se agrupa claramente en el primer y tercer

cuadrante, mostrando una relación positiva entre $\hat{u}_t$ y $\hat{u}_{t-1}$. Esto es evidencia visual de autocorrelación de primer orden AR(1).

Conclusión preliminar: Las gráficas sugieren la presencia de autocorrelación positiva en los errores, lo que viola el supuesto clásico de errores no correlacionados. MCO sigue siendo insesgado pero ya no es eficiente (BLUE falla), y los errores estándar están subestimados, lo que infla los estadísticos t.

(C) Estadístico de Durbin-Watson

Hipótesis y estadístico. La prueba de Durbin-Watson contrasta:

$H_0 : \rho = 0$ (no hay autocorrelación de primer orden) vs. $H_1 : \rho > 0$ (autocorrelación posit

El estadístico se define como:

$$d = \frac{\sum_{t=2}^{n} (\hat{u}_t - \hat{u}_{t-1})^2}{\sum_{t=1}^{n} \hat{u}_t^2} \approx 2(1 - \hat{\rho}) \tag{3}$$

Resultado de Stata.

$$\boxed{d = 0{,}9428}$$

Región de decisión. Con $n = 30$ observaciones, $k' = 3$ regresores y $\alpha = 5\,\%$, los valores críticos de la tabla Durbin-Watson son:

$$d_L = 1{,}21 \qquad d_U = 1{,}65$$

0	$d_L = 1{,}21$	$d_U = 1{,}65$	$4 - d_U = 2{,}35$	$4 - d_L = 2{,}79$
Autocorr. positiva	Zona ind.	No rechaza H_0	Zona ind.	Autocorr. negativa

Como $d = 0{,}9428 < d_L = 1{,}21$, la estadística cae en la región de **rechazo de** H_0: existe evidencia de **autocorrelación positiva de primer orden**.

Estimación de ρ. A partir de la aproximación $d \approx 2(1 - \hat{\rho})$:

$$\hat{\rho} \approx 1 - \frac{d}{2} = 1 - \frac{0{,}9428}{2} \approx 0{,}529$$

Esto indica una correlación serial moderada-alta y positiva entre errores consecutivos.

Limitaciones del estadístico DW.

- Solo detecta autocorrelación de *primer* orden.
- La zona de indecisión puede ser amplia para muestras pequeñas.
- No es válido cuando la regresión incluye variables dependientes rezagadas como regresores.
- Con modelos de series de tiempo largas pueden preferirse las pruebas de Breusch-Godfrey (ver sección 5).

(D) Prueba de Rachas (Wald-Wolfowitz)

Fundamento. La prueba de rachas (runs test) es una prueba no paramétrica que evalúa la aleatoriedad de la secuencia de signos de los residuos, sin asumir ninguna distribución específica para los errores.

Una *racha* es una sucesión de observaciones del mismo signo; si los residuos son verdaderamente aleatorios, el número de rachas R se distribuye aproximadamente de forma normal para muestras grandes.

Hipótesis.

H_0 : los residuos son aleatorios (no hay autocorrelación) vs. H_1 : no son aleatorios (hay auto

Estadístico. Sea n_1 el número de residuos positivos y n_2 el número de residuos negativos. El estadístico es:

$$z = \frac{R - \bar{R}}{\sigma_R}, \qquad \bar{R} = \frac{2n_1n_2}{n_1 + n_2} + 1, \qquad \sigma_R^2 = \frac{2n_1n_2(2n_1n_2 - n_1 - n_2)}{(n_1 + n_2)^2(n_1 + n_2 - 1)}$$

Resultado de Stata.

Residuos ≤ 0	$n_2 = 13$
Residuos > 0	$n_1 = 17$
Total	$n = 30$
Número de rachas	$R = 9$
Estadístico z	$-2{,}55$
p-valor (bilateral)	0,0108

El número esperado de rachas bajo aleatoriedad es:

$$\bar{R} = \frac{2(17)(13)}{30} + 1 = \frac{442}{30} + 1 \approx 15{,}73$$

Solo se observaron 9 rachas, muy por debajo del valor esperado de $\approx 15{,}7$.

Decisión. Con $|z| = 2{,}55 > 1{,}96$ y $p = 0{,}011 < 0{,}05$, se rechaza H_0 al nivel del 5 %. Los residuos **no son aleatorios**.

Comparación con Durbin-Watson (punto C). Ambas pruebas coinciden en su conclusión: los residuos exhiben **autocorrelación positiva**. Sin embargo, la prueba de rachas aporta información adicional:

- **DW** asume normalidad de los errores y está diseñada específicamente para AR(1). Dio $d = 0{,}9428 < d_L$, evidenciando autocorrelación positiva.
- **Rachas** es no paramétrica: no exige ninguna distribución para u_t, y detecta cualquier patrón de no aleatoriedad (no solo AR(1)). Con $R = 9 \ll \bar{R} \approx 15{,}7$ y $z = -2{,}55$, apunta a la misma dirección.
- La consistencia entre ambas pruebas refuerza la evidencia: la violación del supuesto de no autocorrelación parece robusta y no dependiente de los supuestos distribucionales.

(E) Prueba del Multiplicador de Lagrange (Breusch-Godfrey)

Fundamento. La prueba LM de Breusch-Godfrey (BG) es más general que DW porque:

1. Permite detectar autocorrelación de orden arbitrario p.
2. Es válida en presencia de variables dependientes rezagadas.
3. No tiene zona de indecisión.

Hipótesis.

$$H_0 : \rho_1 = \rho_2 = \cdots = \rho_p = 0 \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : \exists\, \rho_j \neq 0, \quad j = 1, \ldots, p$$

Procedimiento.

1. Estimar el modelo original (1) por MCO y obtener $\hat{u}_t$.
2. Regresar $\hat{u}_t$ sobre los regresores originales y los rezagos $\hat{u}_{t-1}, \ldots, \hat{u}_{t-p}$.
3. El estadístico es $LM = nR^2_{\text{aux}} \sim \chi^2(p)$ bajo H_0.

Cuadro 2: Prueba de Breusch-Godfrey (Stata: `bgodfrey`)

Orden p	χ^2 calculado	g.l.	p-valor	Decisión
1	8,838	1	0,0030	Rechaza H_0
2	12,643	2	0,0018	Rechaza H_0

Resultados.

Interpretación. Orden 1 (AR(1)): Con $\chi^2(1) = 8{,}838$ y $p = 0{,}003$, se rechaza H_0 al 1 %. Existe autocorrelación de primer orden estadísticamente significativa.

Orden 2 (AR(2)): Con $\chi^2(2) = 12{,}643$ y $p = 0{,}002$, también se rechaza H_0. La autocorrelación persiste incluso al controlar dos rezagos.

¿Describe mejor un proceso AR(1)?. Sí, los resultados apuntan a que un proceso **AR(1)** es la especificación principal por las siguientes razones:

- El estadístico de orden 1 ya es muy significativo ($\chi^2 = 8{,}84$, $p = 0{,}003$), lo que sugiere que la autocorrelación se concentra en el primer rezago.
- Al pasar de $p = 1$ a $p = 2$, el χ^2 aumenta en $12{,}643 - 8{,}838 = 3{,}805$ con un grado de libertad adicional; esto indica que el segundo rezago aporta algo de evidencia, pero el grueso de la autocorrelación ya se captura en el primero.
- La estimación $\hat{\rho} \approx 0{,}53$ obtenida del DW es consistente con un AR(1) de intensidad moderada.
- La prueba BG es superior a DW porque: (i) no tiene zona de indecisión, (ii) es asintóticamente válida para cualquier n, y (iii) puede extenderse a órdenes mayores. En este caso ambas coinciden en señalar autocorrelación positiva de primer orden.

Conclusión: La autocorrelación en este modelo es coherente con un proceso AR(1), con coeficiente $\rho \approx 0{,}53$. Para corregir este problema pueden emplearse los estimadores de Cochrane-Orcutt, Prais-Winsten, o MCG factibles.

(F) Estimación con errores estándar de Newey-West (HAC)

Motivación. Los apartados anteriores confirmaron la presencia de **autocorrelación positiva de primer orden** en los residuos MCO. Cuando existe autocorrelación, los estimadores MCO siguen siendo insesgados y consistentes, pero los errores estándar convencionales están *subestimados*, lo que infla los estadísticos t y puede llevar a rechazar H_0 con demasiada frecuencia.

Una solución directa —sin necesidad de transformar las variables ni conocer la estructura exacta de la autocorrelación— es el estimador de la matriz de covarianzas **HAC** (Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent) propuesto por Newey y West (1987). Este estimador corrige simultáneamente heterocedasticidad y autocorrelación de orden arbitrario.

El estimador Newey-West. La matriz de covarianzas HAC con kernel de Bartlett y m rezagos es:

$$\hat{V}_{\text{NW}} = \frac{n}{n-k}(X'X)^{-1}\hat{S}(X'X)^{-1} \tag{4}$$

donde el estimador de la varianza espectral en la frecuencia cero es:

$$\hat{S} = \hat{\Gamma}_0 + \sum_{j=1}^{m} w_j \left(\hat{\Gamma}_j + \hat{\Gamma}_j'\right), \qquad w_j = 1 - \frac{j}{m+1} \quad \text{(pesos de Bartlett)} \tag{5}$$

con $\hat{\Gamma}_j = \sum_{t=j+1}^{n} \hat{u}_t \hat{u}_{t-j} x_t x_{t-j}'$ la matriz de autocovarianzas muestrales de orden j.

La elección del ancho de banda m sigue la regla práctica de Newey-West: $m = \lfloor 4(n/100)^{2/9} \rfloor$, que para $n = 30$ da $m \approx 2$. En Stata el comando es `newey lnC lnI lnL lnA, lag(m)`.

Propiedad clave: los coeficientes estimados son *idénticos* a MCO; solo cambian los errores estándar (y por tanto los estadísticos t y los intervalos de confianza).

Resultados comparativos. La Tabla 3 presenta los errores estándar MCO y Newey-West para los distintos anchos de banda.

Cuadro 3: Comparación de errores estándar: MCO vs. Newey-West

	MCO clásico		NW ($m = 1$)		NW ($m = 2$)		NW ($m = 3$)	
Variable	EE	t	EE	t	EE	t	EE	t
$\ln I_t$	0,1614	2,89	0,2038	2,29	0,1951	2,39	0,1773	2,63
$\ln L_t$	0,1151	2,44	0,1233	2,28	0,1135	2,47	0,1060	2,65
$\ln A_t$	0,1049	4,18	0,1152	3,81	0,1233	3,56	0,1286	3,41
Constante	0,2765	−5,55	0,3084	−4,98	0,3015	−5,09	0,2753	−5,57

Coeficientes idénticos en todos los casos: $\hat{\beta}_2 = 0{,}4671$, $\hat{\beta}_3 = 0{,}2807$, $\hat{\beta}_4 = 0{,}4389$, $\hat{\beta}_1 = -1{,}5344$.

Interpretación de los resultados.

1. **Errores estándar corregidos:** Con Newey-West los errores estándar son en general *mayores* que los MCO convencionales, lo que refleja el costo de la autocorrelación.
2. **Significancia individual:** A pesar de la corrección, los tres regresores permanecen significativos al 5 % para todos los anchos de banda considerados.
3. **Sensibilidad al ancho de banda:** Los resultados son estables a través de $m = 1, 2, 3$. La regla $m = 2$ es la más apropiada para $n = 30$.
4. **Limitación:** Newey-West no recupera la eficiencia perdida por la autocorrelación; únicamente hace válida la inferencia estadística.

(G) Corrección por MCG factibles: Cochrane-Orcutt y Prais-Winsten

Motivación. Las secciones anteriores confirmaron autocorrelación positiva de primer orden ($\hat{\rho} \approx 0{,}53$). El estimador de Newey-West corrige la inferencia pero *no recupera eficiencia*. Para obtener estimadores BLUE en presencia de AR(1) se requiere

transformar el modelo mediante **Mínimos Cuadrados Generalizados (MCG) factibles**, cuya forma práctica más común son los procedimientos iterativos de **Cochrane-Orcutt** y **Prais-Winsten**.

El modelo AR(1) y la transformación quasi-diferencia. Bajo el proceso $u_t = \rho u_{t-1} + \varepsilon_t$ con $|\rho| < 1$ y $\varepsilon_t \sim \text{iid}(0, \sigma_\varepsilon^2)$, la transformación quasi-diferencia del modelo (1) es:

$$(y_t - \rho y_{t-1}) = \beta_1(1-\rho) + \beta_2(x_{2t} - \rho x_{2,t-1}) + \cdots + \beta_k(x_{kt} - \rho x_{k,t-1}) + \varepsilon_t \tag{6}$$

Dado que ρ es desconocido, se estima iterativamente a partir de los residuos MCO. La diferencia entre los dos procedimientos radica en el tratamiento de la primera observación:

- **Cochrane-Orcutt:** descarta la primera observación (n efectivo $= 29$).
- **Prais-Winsten:** transforma la primera observación como $\sqrt{1-\hat{\rho}^2}\, y_1$, conservando $n = 30$ y ganando eficiencia.

Resultados de Stata. Los dos procedimientos convergen en 7 iteraciones con $\hat{\rho} \approx 0{,}556$. La Tabla **??** presenta los resultados junto con los MCO originales.

Cuadro 4: Comparación MCO vs. Cochrane-Orcutt vs. Prais-Winsten

	MCO		Cochrane-Orcutt		Prais-Winsten	
Variable	$\hat{\beta}$	EE	$\hat{\beta}$	EE	$\hat{\beta}$	EE
$\ln I_t$	0,4671	0,1614	0,3456	0,2256	0,3341	0,1958
$\ln L_t$	0,2807	0,1151	0,3498	0,1149	0,3527	0,1097
$\ln A_t$	0,4389	0,1049	0,4810	0,1480	0,4816	0,1455
Constante	−1,5344	0,2765	−1,5504	0,5595	−1,5172	0,4491
$\hat{\rho}$	—		0,5556		0,5578	
n	30		29		30	
R^2	0,9345		0,8224		0,8804	
$\bar{R}^2$	0,9269		0,8011		0,8665	
DW transformado	0,9428		1,4961		1,5301	

Interpretación de los resultados.

Estimación de ρ

Ambos procedimientos estiman $\hat{\rho} \approx 0{,}556$, muy próximo a la aproximación vía DW ($\hat{\rho}_{\text{DW}} \approx 0{,}529$). Esto confirma la presencia de una autocorrelación positiva moderada-alta y la robustez del diagnóstico previo.

Cambios en los coeficientes

1. $\ln I_t$ **(índice de producción industrial):** El coeficiente cae de 0,4671 (MCO) a $\approx$ 0,34–0,35 (MCG) y resulta *no significativo* al 5 % ($p = 0{,}138$ en CO; $p = 0{,}100$ en PW). Esto sugiere que parte de la correlación aparente entre $\ln I_t$ y $\ln C_t$ era espuria, producto de tendencias comunes en el tiempo.
2. $\ln L_t$ **(precio Londres):** El coeficiente aumenta ligeramente de 0,2807 a $\approx$ 0,350 y se mantiene altamente significativo ($p = 0{,}005$ en CO; $p = 0{,}003$ en PW). La integración del mercado internacional del cobre es un efecto robusto a la corrección por autocorrelación.
3. $\ln A_t$ **(precio aluminio):** El coeficiente sube de 0,4389 a $\approx$ 0,481, permaneciendo significativo al 1 % ($p = 0{,}003$ en ambos). El efecto sustitución aluminio-cobre es el más estable y robusto del modelo.
4. **Constante:** Prácticamente sin cambios ($\approx -1{,}52$), aunque con errores estándar mayores en MCG, lo cual es esperable.

DW transformado

El estadístico DW sobre los residuos transformados sube de 0,9428 a 1,4961 (CO) y 1,5301 (PW). Aunque ambos quedan en la zona de indecisión ($d_L = 1{,}21 < d < d_U = 1{,}65$), la mejoría respecto al DW original es clara: la mayor parte de la autocorrelación ha sido eliminada por la transformación.

R^2 y ajuste

El R^2 cae de 0,93 (MCO) a 0,82–0,88 (MCG). Esta caída es normal y esperada: el R^2 en el modelo transformado mide el ajuste sobre las quasi-diferencias $y_t - \hat{\rho} y_{t-1}$, no sobre los niveles originales. No indica que el modelo sea peor; refleja que parte del R^2 MCO era espurio.

Cochrane-Orcutt vs. Prais-Winsten

Los coeficientes son prácticamente idénticos en ambos métodos. Prais-Winsten es **preferible** porque conserva la primera observación ($n = 30$ vs. $n = 29$), lo que es especialmente relevante con muestras pequeñas como esta, y produce errores estándar ligeramente menores.

Conclusión de la sección. La corrección por MCG factibles confirma y matiza los resultados MCO:

- $\ln A_t$ **y** $\ln L_t$ son efectos reales, robustos y significativos: el precio del aluminio y del cobre londinense determinan genuinamente el precio interno del cobre en EE.UU.

- $\ln I_t$ pierde significancia estadística tras la corrección, lo que sugiere que su efecto en MCO estaba parcialmente contaminado por la autocorrelación compartida con la variable dependiente.
- La autocorrelación residual ha sido reducida sustancialmente, aunque no eliminada por completo (DW transformado en zona de indecisión).
- Para análisis futuros podría considerarse incluir una tendencia temporal explícita o explorar especificaciones con rezagos de $\ln I_t$.

Diagnósticos adicionales

Cuadro 5: Factores de inflación de la varianza

Variable	VIF	1/VIF
$\ln I_t$	7,17	0,1396
$\ln L_t$	6,64	0,1506
$\ln A_t$	2,46	0,4071
VIF medio	5,42	

Multicolinealidad (VIF). Los VIF de $\ln I_t$ y $\ln L_t$ superan 5 (umbral común de alerta), lo que indica **multicolinealidad moderada-alta** entre el índice de producción industrial y el precio londinense.

Heterocedasticidad (Breusch-Pagan).

$$\chi^2(1) = 0{,}01, \qquad p = 0{,}9335$$

No se rechaza H_0 de varianza constante. **No hay evidencia de heterocedasticidad**, lo que confirma que el principal problema del modelo es la autocorrelación.

Normalidad de residuos (Skewness-Kurtosis).

$$\chi^2_{\text{ajust.}}(2) = 0{,}61, \qquad p = 0{,}7371$$

No se rechaza H_0 de normalidad. Los residuos MCO son compatibles con una distribución normal.

Conclusiones generales

1. El modelo log-log tiene un ajuste excelente ($R^2 = 0{,}93$) y todos los coeficientes son significativos con signos económicamente coherentes.

2. La **autocorrelación positiva de primer orden** ($\hat{\rho} \approx 0{,}53$) es el problema estadístico central: confirmada por DW ($d = 0{,}94 < d_L$), prueba de rachas ($z = -2{,}55$, $p = 0{,}011$) y Breusch-Godfrey ($\chi^2(1) = 8{,}84$, $p = 0{,}003$).
3. No hay evidencia de heterocedasticidad ni de no normalidad.
4. La estimación **Newey-West** ($m = 2$) confirma que los tres regresores mantienen su significancia con errores estándar HAC.
5. Tras la corrección por **Cochrane-Orcutt** / **Prais-Winsten**, $\ln A_t$ y $\ln L_t$ mantienen su significancia, pero $\ln I_t$ la pierde, revelando que parte de su efecto en MCO era espurio. Prais-Winsten es el método preferido por conservar las 30 observaciones.