FARMACI


Come regola generale, ripetere le prescrizioni solo dei farmaci che su Millewin sono biffati come continuativi (quelli col pallino colorato a sinistra e con la scritta in verde); al momento è in fase di risoluzione un *bug* del programma per cui alcuni farmaci, anche se vengono biffati dal medico come continuativi, alla fine risultano sempre senza il pallino: in questo caso usare il buonsenso, ovvero se il farmaco richiesto è già stato prescritto più e più volte negli ultimi tempi allora considerarlo come continuativo.

I farmaci prescrivibili in Italia si suddividono in due grandi categorie:


- Farmaci in fascia A, ovvero a carico del SSN (ad es. antipertensivi, antidiabetici, antibiotici…)
- Farmaci in fascia C, ovvero interamente a carico del paziente (ad es. Paracetamolo, benzodiazepine…); in questi casi la ricetta viene emessa di default da Millewin come ripetibile, ha durata di 6 mesi per 10 confezioni totali di farmaco, oppure nel caso di composti come benzodiazepine (Valium, Tavor, Xanax…), composti zeta (Zolpidem, Esnoxiben…) o contenenti codeina (Tachidol in bustine…), durata di 1 mese per 3 confezioni totali
- Farmaci mutuabili ma prescrivibili solo su ricettario a ricalco in triplice copia (praticamente solo Medikinet per ADHD, questo lo deve prescrivere il medico a mano)

Alcuni farmaci hanno dei confezionamenti o delle formulazioni prescrivibili in fascia A, altre prescrivibili unicamente in fascia C (ad es. Tachidol in compresse vs Tachidol in bustine); anche i farmaci abitualmente prescrivibili in fascia A lo sono davvero soltanto per le indicazioni riportate in scheda tecnica, per altri utilizzi fa forzata la prescrizione in fascia C (ad es. corticosteroidi nelle infezioni delle alte e basse vie aeree).

Alcuni farmaci sono prescrivibili in fascia A solo se è presente un piano terapeutico specialistico che avalla la loro prescrizione (ad es. eritropoietina, anticoagulanti orali in caso di TVP/embolia polmonare, PDE-5 inibitori in caso di intervento per carcinoma prostatico…); in questo caso, se il piano terapeutico è scaduto, Millewin chiederà di aggiornare la scadenza con quella del nuovo piano che il paziente dovrà farsi redigere periodicamente dallo specialista (vedi immagine a fianco). Può capitare che il paziente porti spontaneamente il piano terapeutico di un nuovo farmaco: per registrarlo (vedi tre immagini sottostanti) cliccare su “Scadenze”, “Inserisci”, “Nuova per Farmaci” e



inserire il farmaco con la scadenza del piano (fare bene attenzione a selezionare il dosaggio giusto e anche il giusto numero di compresse nella confezione).




Che fare se un paziente chiede la ripetizione di un farmaco il cui piano terapeutico è scaduto?
Agire con buonsenso: prescrivere una sola confezione (aggiornando la data di scadenza del piano alla data odierna), ma segnalare al paziente che sarà l'ultima e che dovrà provvedere a farsi rinnovare il piano, e soprattutto SEGNALARE LA COSA AL DOTTORE.



Altri farmaci sono prescrivibili in fascia A soltanto per le indicazioni riportate nelle rispettive note AIFA. QUANDO SI RIPETE LA PRESCRIZIONE DI UN FARMACO E MILLEWIN CHIEDE SE APPLICARE O MENO LA NOTA, UNIFORMARSI ALLE PRESCRIZIONI FATTE IN PRECEDENZA.
Esempi di note AIFA:

- Nota 89 (antistaminici): "pazienti affetti da patologie su base allergica di grado medio e grave (rinocongiuntivite allergica stagionale, orticaria persistente non vasculitica) per trattamenti prolungati (superiori ai 60 giorni)"
- Nota 66 (FANS): fase algica di artriti infiammatorie (gotta, artrite reumatoide, spondiloartriti…) → in pratica, fare sempre finta di niente e provare a segnarli sempre in fascia C, la gente ormai ha capito che questi farmaci sono a pagamento
- Nota N01 (inibitori di pompa protonica, tipo pantoprazolo etc…): diventata molto complessa dopo l'ultima revisione, se già prescritti in precedenza uniformarsi alle precedenti prescrizioni, se richiesti per la prima volta SEMPRE IN FASCIA C
- Nota 97: anticoagulanti orali, ovvero dabigatran (Pradaxa), rivaroxaban (Xarelto, Mirebax), apixaban (Eliquis), edoxaban (Lixiana), warfarin (Coumadin) **per la fibrillazione atriale non valvolare**
- Nota 99: farmaci inalatori contenenti broncodilatatori (ad es. Foster, Rolufta, Revinty, Anoro, Trelegy…) **per la BPCO**
- Nota 13 (statine e altri farmaci modificanti i lipidi tipo ezetimibe, nilemdo/nustendi, omega3): pressoché sempre in fascia A, comunque uniformarsi alle precedenti prescrizioni

- Nota 31 (Levotuss, Paracodina): la nota non si applica pressoché mai
- Nota 85 (donepezil, rivastigmina, memantina, galantamina): farmaci per la malattia di Alzheimer, sempre in fascia A **ma ci deve essere il piano terapeutico specialistico in corso di validità**
- Nota 96 (vitamina D nelle sue varie forme)



Alcuni farmaci possono essere prescritti in fascia A con o senza nota: in particolare, quando si tenta di effettuare una di queste prescrizioni compare la seguente videata (vedi immagine a fianco):


- Anticoagulanti orali (vedi sopra per i nomi commerciali): la nota 97 si applica solo se il farmaco è stato prescritto per fibrillazione atriale, e in questo caso si clicca su "Nota SSN N°97", se prescritto per trombosi venosa profonda o embolia polmonare bisogna cliccare su "Nota SSN N°", in quest'ultimo caso **ci deve essere il piano terapeutico specialistico in corso di validità**
- Farmaci inalatori (vedi sopra): la nota 99 si applica solo se il farmaco è prescritto per BPCO, e in questo caso si clicca su "Nota SSN N°99", se prescritto per asma bisogna cliccare su "Nota SSN N°": in entrambi i casi la prescrizione è libera senza piano terapeutico.
- Farmaci antidiabetici orali di nuova generazione (GLP-1RA o GLP/GIP, DPPIV, gliflozine), quindi nota 100: se il farmaco è prescritto per diabete cliccare su "Nota SSN N°100", se prescritto per scompenso cardiaco o malattia renale cronica, in assenza di diabete, cliccare su "Nota SSN N°": in entrambi i casi la prescrizione è libera senza piano terapeutico.




N.B.: millewin sta tardando ad aggiornare il software con la eliminazione, decisa dall'AIFA, dei piani terapeutici per la nota 97 e per la nota 99; se dovesse chiedere di inserire una nuova scadenza (vedi immagine a fianco) inserirne una fittizia.

Quando si prescrive un farmaco è possibile indicare il numero di confezioni da prescrivere: di norma questo valore viene lasciato su 1 per le ricette ripetibili, mentre viene indicato 2 per i farmaci concessi dal SSN; in ogni caso, come sempre, attenersi a quanto fatto in precedenza, e soprattutto PRESTARE ATTENZIONE A QUANDO I FARMACI SONO STATI RICHIESTI L'ULTIMA VOLTA! Se eccessivamente vicini alla richiesta precedente coinvolgere il medico. Se la moglie o il marito prendono il medesimo farmaco vale la stessa cosa, ognuno deve avere la propria ricetta.

E’ possibile anche cambiare manualmente la classe di prescrivibilità di un determinato farmaco (da fare SOLO se richiesto espressamente dal medico, MAI su richiesta del paziente):





Cliccare sulla casella indicata nel cerchio: si aprirà la finestra a fianco. I farmaci concedibili sono caratterizzati da due lettere di cui la prima è una “C” (solitamente è impostato “CD” come predefinito), i non concedibili stessa cosa ma con la iniziale “N”: per questi solitamente è impostato “NX”, con ricetta che quindi risulta ripetibile, se si vuole impostare la prescrizione di una sola confezione o due indicare “N1” o “N2”. Gli antibiotici iniettabili (ceftriaxone, ceftazidima, piperacillina+tazobactam…) sono prescrivibili in numero di 6 sulla stessa ricetta (che normalmente può accogliere fino a 2 farmaci, ossia due confezioni dello stesso o una ciascuno di due farmaci diversi).

Di molti farmaci sono presenti delle versioni “generiche” e delle versioni “di marca”: su queste ultime può esserci la necessità da parte del paziente di pagare un ticket, oppure no se il farmaco di marca ha un prezzo allineato al generico. Esempio: principio attivo “atorvastatina”:

- ATORVASTATINA DOC: generico, prezzo X
- TORVAST: di marca, prezzo X + ticket
- TORASTIN, di marca, allineato al generico, prezzo X

È facoltà del paziente, in farmacia, farsi dare il farmaco di marca (pagando quindi il sovrapprezzo) o un generico. IMPORTANTE: può capitare che, a parità di principio attivo e di dosaggio, il paziente chieda un farmaco con un nome diverso (ad esempio, appunto, Torvast anziché Atorvastatina DOC): questo può non essere un problema, ma lo diventa SE IL FARMACO RICHIESTO DAL PAZIENTE HA MENO COMPRESSE NELLA CONFEZIONE RISPETTO A QUELLO SEGNATO IN CARTELLA, e come è logico avrà un costo maggiore per il SSN. In questo caso, se tra i farmaci continuativi non si trova quello espressamente chiesto dal paziente, verificare se ve ne fosse uno con lo stesso principio attivo e lo stesso dosaggio.

ESENZIONI



REGOLA AUREA: Millewin sa automaticamente quando applicare o meno un’esenzione, non forzare mai la sua applicazione su alcuna prestazione

L’esenzione è ciò che consente a un paziente di non pagare il ticket su una determinata prestazione (farmaci, esami o altro). Sulla scheda del paziente le esenzioni si trovano sotto questa etichetta; cliccando sulla riga grigia vuota è possibile inserirne altre (ad esempio, il paziente può anche presentarsi in segreteria per consegnare una nuova esenzione, o il rinnovo di una già esistente sottoposta a scadenza).


AL MOMENTO SE IL PAZIENTE NON COMUNICA ATTIVAMENTE AL MEDICO DI AVERE UN’ESENZIONE, QUESTA NON ARRIVA AUTOMATICAMENTE NELLA CARTELLA: FA ECCEZIONE QUELLA PER ETA’ E REDDITO (E01).

Le esenzioni si dividono in due grandi categorie:

- esenzioni per patologia: queste devono essere redatte dallo specialista di riferimento per quella determinata patologia, fanno eccezione le esenzioni per diabete (013) e per ipertensione senza danno d'organo (0A31): per queste il medico di famiglia può stampare al paziente un certificato in cui viene scritto che è affetto da tale patologia, con esso il paziente si reca all'ufficio esenzioni del S. Donato (CUP ospedaliero) e si fa redigere l'esenzione, che poi deve essere RIPORTATA O INVIATA dal paziente. **Le esenzioni per patologia coprono solamente le prestazioni e i farmaci inerenti a quella determinata patologia, compresa quella per neoplasie maligne**
- esenzioni per altre condizioni
  - E01: esenzione per età > 65 anni e reddito, questa solitamente viene già attribuita automaticamente al paziente una volta compiuti 65 anni se risulta un ISEE inferiore a un tot, altrimenti il paziente può autocertificare queste condizioni e farsela redigere all'ufficio esenzioni; solitamente si rinnova automaticamente il 31 marzo di ogni anno, e il rinnovo arriva automaticamente nelle nostre cartelle, a volte questo non avviene, quindi nel caso in cui l'esenzione sia scaduta NON APPLICARLA FORZATAMENTE, sarà poi a cura del paziente il rinnovo; questa copre il ticket per TUTTE LE PRESTAZIONI E I FARMACI
  - Esenzioni per invalidità, come C01 (100%), C02 (100% con accompagnamento), C03 (tra 67% e 99%) e altre (https://www.salute.gov.it/new/it/tema/esenzioni-dal-ticket/esenzioni-invalidita/, https://www.aslroma6.it/come-fare-per/ticket-esenzioni-e-rimborsi/esenzione-ticket-per-invalidita). Ricordare che la C01 e la C02 danno totale esenzione sul ticket, la C03 solo sugli esami e visite (non sui farmaci)
  - Altri tipi di esenzioni (invalidi di guerra, per causa di servizio etc, vedi il link soprastante)

Prescrizione	Esenzione applicata		Esenzione proposta	
CREATININA [S/P]	(non esente)	Cambia	Neoplasie maligne Esentabile solo se su patologia correlata.	Applica
CALPROTECTINA FECALE	(non esente)	Cambia	Neoplasie maligne Esentabile solo se su patologia correlata.	Applica
ASPARTATO AMINOTRANSFERASI [AST] [GOT] [S/P]	Colite ulcerosa - M. di Crohn	Cambia		
ALANINA AMINOTRANSFERASI [ALT] [GPT] [S/P]	Colite ulcerosa - M. di Crohn	Cambia		
PROTEINE ELETTROFORESI [S]	Colite ulcerosa - M. di Crohn	Cambia		
PROTEINA C REATTIVA [QUANTIT.] [S/P]	Colite ulcerosa - M. di Crohn	Cambia		
POTASSIO [S/P]	Colite ulcerosa - M. di Crohn	Cambia		

Nell'immagine soprastante è riportata la videata che appare qualora si tenti di prescrivere degli esami per una persona che ha sia una colite ulcerosa sia una neoplasia della mammella, e le rispettive esenzioni: i cinque ultimi esami rientrano nell'esenzione per la colite ulcerosa, perciò Millewin applica automaticamente l'esenzione (SE L'ESENZIONE E' AUTOMATICAMENTE APPLICATA DA MILLEWIN VUOL DIRE CHE L'ESAME VI RIENTRA, QUINDI NON BISOGNA CAMBIARE NIENTE); i primi due non rientrano in quella per la colite ulcerosa, ma NON E' DETTO che rientrino in quella per neoplasie maligne (dipende se l'esame venga usato ai fini del follow-up della patologia o per monitorare eventuali danni derivati dal trattamento), perciò Millewin chiede se gli esami siano esenti o meno → CHIEDERE AL DOTTORE!!!



Nell'immagine soprastante si sta tentando di stampare degli esami che non rientrano in alcuna esenzione posseduta dalla paziente; se si tenta di forzare la cosa premendo il tasto "Cambia" vengono elencate le esenzioni presenti seguite dalla dicitura NON applicabile, quindi l'esenzione non può essere applicata.

Caso particolare: LA GRAVIDANZA! Esiste un decreto ministeriale con tutti gli esami che per le gestanti (ma anche a scopo pre-concezionale, tra cui alcune prestazioni coinvolgono anche il maschio), che si trova sul Drive dello Studio sotto "Risorse informative" → "Prestazioni esenti in gravidanza", da stampare al bisogno per pazienti che fanno polemica. Solitamente per questi esami

non c'è bisogno di fare alcuna impegnativa, dato che le ricette si trovano sul Sito HappyMamma e sono fruibili dalle pazienti stesse una volta "sbloccate" dal ginecologo o dal medico di famiglia. Può capitare che un ginecologo richieda altre prestazioni (tipici esempi il TSH o la sierologia per il Cytomegalovirus) che esulano da quelle presenti nel decreto ministeriale, queste possono essere prescritte a carico del SSN ma MAI con l'esenzione!!! Fanno eccezione la "Visita anestesiologica" (inserire nel quesito clinico "per parto-analgesia", priorità D), il tempo di protrombina e il tempo di tromboplastina parziale che serviranno all'anestesista durante la visita pre-parto: in questo caso inserire manualmente nella cartella della paziente l'esenzione M99 eapplicare quella.
Per gli esami pre-concezionali (di nuovo, solo quelli contenuti nell'allegato) è possibile invece applicare l'esenzione M00 (anch'essa da inserire manualmente in cartella).

CERTIFICATI

- Certificati di malattia: a norma di legge un certificato di malattia si può redigere solamente dopo aver visitato il paziente, sia che si tratti del primo sia che si tratti di eventuali continuazioni; nella pratica, ogni medico fa secondo scienza e coscienza. E' plausibile che, quando un certificato viene inviato per email, al paziente possa arrivare o solo l'email col pdf del certificato (che è criptato) o solo l'email con la password per aprirlo, anziché entrambe: se un

VACCINI

- Vaccinazione antinfluenzale: saranno a disposizione tre tipi di vaccini, di seguito le indicazioni ministeriali:
  - Vaccino split trivalente ad alte dosi (EFLUELDA) → età >= 80 anni
  - Vaccino inattivato trivalente adiuvato (FLUAD) → età 60-79 anni
  - Vaccino trivalente inattivato subunità/split (VAXIGRIP) → età 7-59 anni

Laddove possibile seguire queste indicazioni, tenendo presente che alla bisogna, da scheda tecnica:

- Efluelda può essere somministrato da età >= 60 anni
- Fluad può essere somministrato da età >= 50 anni
- Vaxigrip può essere somministrato da età >= 6 mesi

Il vaccino può essere somministrato a tutte le persone dai 60 anni in su; per età inferiori bisogna attenersi alle indicazioni del ministero, elencate nella pagina successiva; tenere conto che TUTTE le vaccinazioni possono essere cosomministrate a quella anti-influenzale, quindi sfruttare l'occasione!!

Persone ad alto rischio di complicanze o ricoveri correlati all'influenza:

- Persone di età pari o superiore a 60 anni[13]
- Donne che all'inizio della stagione epidemica si trovano in qualsiasi trimestre della gravidanza e nel periodo "postpartum"
- Persone di tutte le età affette da patologie che aumentano il rischio di complicanze da influenza:
  - *a) malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio (inclusa l'asma grave, la displasia broncopolmonare, la fibrosi cistica e la broncopatia cronico ostruttiva-BPCO);*
  - *b) malattie dell'apparato cardio-circolatorio, comprese le cardiopatie congenite e acquisite;*
  - *c) diabete mellito e altre malattie metaboliche (inclusi gli obesi con indice di massa corporea BMI >30);*
  - *d) insufficienza renale/surrenale cronica;*
  - *e) malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie;*
  - *f) malattie oncologiche, anche in corso di trattamento chemioterapico o immunoterapico o in follow-up;*
  - *g) malattie congenite o acquisite che comportino carente produzione di anticorpi, immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV;*
  - *h) malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali;*
  - *i) patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici;*
  - *j) patologie associate a un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (ad es. malattie neuromuscolari);*
  - *k) epatopatie croniche;*
  - *l) persone candidate a trattamento immunomodulante o immunosoppressivo o in corso di trattamento.*
- Bambini nella fascia di età 6 mesi - 6 anni compresi
- Bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico, a rischio di Sindrome di Reye in caso di infezione influenzale
- Persone di qualunque età ricoverate presso strutture per lungodegenti
- Familiari e contatti (adulti e bambini) di persone ad alto rischio di complicanze (indipendentemente dal fatto che la persona a rischio sia stata o meno vaccinata)

Persone addette a servizi pubblici di primario interesse collettivo e categorie di lavoratori:

- Medici e personale sanitario/sociosanitario (inclusi studenti che svolgono attività di tirocinio) di assistenza in strutture che, attraverso le loro attività, sono in grado di trasmettere l'influenza a chi è ad alto rischio di complicanze influenzali
- Forze di polizia
- Vigili del fuoco
- Altre categorie socialmente utili che potrebbero avvantaggiarsi della vaccinazione, per motivi vincolati allo svolgimento della loro attività lavorativa; a tale riguardo, la vaccinazione è raccomandata ed è facoltà delle Regioni/PP.AA. definire i principi e le modalità dell'offerta a tali categorie
- Infine, è pratica internazionalmente diffusa l'offerta attiva e gratuita della vaccinazione antinfluenzale da parte dei datori di lavoro ai lavoratori particolarmente esposti per attività svolta e al fine di contenere ricadute negative sulla produttività

Personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani:

- Allevatori
- Addetti all'attività di allevamento
- Addetti al trasporto di animali vivi
- Macellatori e vaccinatori
- Veterinari pubblici e libero-professionisti, inclusi studenti che svolgono attività di tirocinio

Altre categorie

- Donatori di sangue

- Tutte le altre vaccinazioni: le inazioni dei gruppi precisi a cui le vaccinazioni sono somministrabili si trovano qui: www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?

id=5510125&nomeFile=Decreto_n.7908_del_15-04-2026-Allegato-A le categorie a cui *tout court* è possibile somministrare i vaccini al di là dei singoli fattori di rischio:

- Vaccinazione anti-pneumococco (Prevenar 20): età >= 65 anni, dose singola
- Vaccinazione anti-Herpes Zoster (Shingrix): età >= 65 anni, una dose al tempo zero, un'altra a 2-6 mesi di distanza dalla prima
- Vaccinazione anti-tetano-pertosse-difterite (Triaxis): una dose ogni 10 anni; a ciò si aggiunge una dose in più a tutte le donne in gravidanza; il ciclo primario, per chi non è mai stato vaccinato, è composto da tre dosi, da effettuare al tempo zero, a 1-2 mesi e a 6-12 mesi; inoltre, tra i 12 e i 18 anni è prevista l'ultima dose del vaccino anti-tetano-pertosse difterite PIU' anti-polio (Tetravac, Triaxis Polio), a 10 anni dalla quale viene effettuato appunto il primo richiamo col solo Triaxis
- Vaccinazione anti-HPV (Gardasil): tutti i maschi entro i 19 anni, tutte le femmine fino ai 30 anni; fino ai 14 anni due dosi a tempo zero e 6 mesi, dai 14 anni compiuti in su tre dosi a tempo zero, 1 e 6 mesi;