

Act-3000 Théorie du risque

Processus de Poisson et modèles dynamiques

Étienne Marceau

École d'actuariat
Université Laval, Québec, Canada

A2019: Série no3



UNIVERSITÉ
LAVAL

Faculté des sciences et de génie
École d'actuariat

Table des matières I

- 1 Introduction
- 2 Notation
- 3 Modèles dynamiques en actuariat
- 4 Processus agrégé et motivations
- 5 Processus de Poisson homogène
 - Définitions + Propriétés
 - Algorithme de simulation no1
 - Algorithme de simulation no2
- 6 Processus de Poisson NH
 - Motivations
 - Définitions + Propriétés
 - Algorithme de simulation no1
 - Algorithme de simulation no2
- 7 Processus de Poisson mixte
- 8 Processus de renouvellement
- 9 Notes bibliographiques

10 Références

Introduction

Les processus de comptage sont essentiels pour la modélisation des risques en actuariat.

Définition 1

On dit que $\underline{N} = \{N(t), t \geq 0\}$ est un processus de comptage (dénombrement) si

- 1** $N(0) = 0$
- 2** $N(t) \geq 0$
- 3** Si $t > s$, on a $N(t) \geq N(s)$
- 4** Si $t > s$, on a $N(t) - N(s)$ correspond au nombre d'évènements (p. ex., sinistres) encourus durant l'intervalle $(s, t]$

On considère processus de comptage (dénombrement) suivants :

- processus de Poisson homogène ;
- processus de Poisson non-homogène (NH) ;
- processus de Poisson mixte ;
- processus de renouvellement.

En actuariat, les processus de comptage sont souvent utilisés pour modéliser le processus d'avènement des sinistres.

Un cours de processus aléatoires (stochastiques) est un pré-requis à la compréhension des notions apprises dans ce chapitre.

Introduction

Notation

Soit un processus de dénombrement $\underline{N} = \{N(t), t \geq 0\}$.

On fixe $0 \leq s < s + t < \infty$.

L'accroissement du processus \underline{N} sur l'intervalle de temps $(s, s + t]$ est noté par

$$N(s, s + t] = N(s + t) - N(s).$$

L'accroissement $N(s, s + t]$ est une v.a. discrète positive prenant valeur sur le support \mathbb{N} .

La fgp de $N(s, s + t]$ est

$$\mathcal{P}_{N(s, s + t]} = E[r^{N(s, s + t)}],$$

pour $r \in [0, 1]$.

Modèles dynamiques en actuariat

Modèles dynamiques en actuariat

Un processus est l'outil mathématique (et probabiliste) qui a été conçu pour modéliser l'évolution d'un phénomène dans le temps.

Il en résulte un modèle est dit *dynamique*.

Exemples de phénomènes (en classe) :

-
-
-

Modèles dynamiques en actuariat

En actuariat, les modèles dynamiques servent à décrire l'évolution des coûts dans le temps pour un portefeuille de risques d'une compagnie d'assurance ou d'une institution financière.

Un modèle dynamique de risque est défini à l'aide d'un processus aléatoire (stochastique) ou de plusieurs processus aléatoires.

Processus agrégé et motivations

Processus agrégé et motivations

Soit un processus de dénombrement $\underline{N} = \{N(t), t \geq 0\}$.

\underline{N} désigne le processus de nombre de sinistres

L'accroissement $N(s, s+t]$ est une v.a. représentant le nombre de sinistres sur l'intervalle de temps $(s, s+t]$.

Exemples (en classe) :

-
-
-

Processus agrégé et motivations

Soit $\underline{X} = \{X_k, k \in \mathbb{N}_+\}$ une suite de v.a. positives iid, continues ou discrètes.

La v.a. X_k désigne le montant (les coûts) du k ième sinistre, pour $k \in \mathbb{N}_+$.

Convention : $X_k \sim X$, pour $k \in \mathbb{N}_+$, dont la fonction de répartition est notée par F_X et la TLS est notée par \mathcal{L}_X .

Exemples :

-
-
-

Processus agrégé et motivations

On définit le processus agrégé par $\underline{S} = \{S(t), t \geq 0\}$ avec $S(0) = 0$ et

$$S(t) = \begin{cases} \sum_{k=1}^{N(t)} X_k & , N(t) > 0 \\ 0 & , N(t) = 0 \end{cases}$$

Selon ce modèle dynamique, on utilise un processus agrégé pour décrire l'évolution des coûts d'un portefeuille d'une compagnie d'assurance.

Processus agrégé et motivations

$S(t) = S(0, t]$, $t > 0$, est définie par une somme aléatoire.

Alors, on utilise les notions apprises pour identifier les caractéristiques d'une v.a. définie par une somme aléatoire pour déterminer les caractéristiques de $S(t) = S(0, t]$, $t > 0$.

Fonction de répartition :

$$F_{S(t)}(x) = \Pr(N(t) = 0) + \sum_{j=1}^{\infty} \Pr(N(t) = j) F_{X_1 + \dots + X_k}(x)$$

Transformation Laplace Stieltjes (TLS) :

$$\mathcal{L}_{S(t)}(u) = E[e^{-uS(t)}] = \mathcal{P}_{N(t)}(\mathcal{L}_X(u))$$

Espérance :

- Supposons que $E[N(t)] < \infty$ et $E[X] < \infty$.
- Alors

$$E[S(t)] = E[N(t)]E[X].$$

- Preuve : en exercice.

Variance :

- Supposons aussi que $E[N(t)^2] < \infty$ et $E[X^2] < \infty$.
- Alors

$$Var[S(t)] = E[N(t)]Var[X] + Var[N(t)]E[X]^2.$$

- Preuve : en exercice.

Processus agrégé et motivations

On peut aussi s'intéresser à l'accroissement de la somme sur $(s, s+t]$:

$$S(s, s+t] = \begin{cases} \sum_{k=1}^{N(s, s+t]} X_k & , N(s, s+t] > 0 \\ 0 & , N(s, s+t] = 0 \end{cases}$$

où k désigne le k -ième sinistre sur $(s, s+t]$.

Exercice : identifier les expressions de la fonction de répartition, de la TLS, de l'espérance et la variance de $S(s, s+t]$.

Processus agrégé et motivations

Selon le modèle classique de risque, \underline{N} est modélisé par un processus de Poisson homogène avec une intensité $\lambda > 0$.

On a aussi recours à des extensions tel que le processus de Poisson non-homogène, le processus de Poisson mixte ou le processus de renouvellement.

\underline{S} est appelé le processus des coûts agrégés.

On présente les différents processus pour \underline{N} et on revient aux autres propriétés de \underline{S} .

Processus de Poisson homogène

Définition 2

Le processus de comptage $\underline{N} = \{N(t), t \geq 0\}$ est un processus de Poisson si les conditions suivantes sont satisfaites :

- 1 $N(0) = 0$;
- 2 un accroissement sur un intervalle de temps de longueur t obéit à une loi Poisson de paramètre λt ($t > 0$) :
 - $N(t) \sim \text{Pois}(\lambda t)$;
 - $N(s, s+t] \sim \text{Pois}(\lambda t)$;
- 3 \underline{N} a des accroissements indépendants :
 - pour $0 \leq s_1 < s_2 \leq t_1 < t_2 < \infty$, $N(s_1, s_2]$ et $N(t_1, t_2]$ sont indépendants ;
 - c.-à-d., les accroissements sur deux intervalles disjoints de temps sont indépendants ;
- 4 \underline{N} a des accroissements stationnaires : $N(t) \sim N(s, s+t]$.

Processus de Poisson homogène

Définitions + Propriétés

Illustration de trajectoires (en classe) :

Processus de Poisson

Définitions + Propriétés

Le terme λ correspond au taux (intensité) du processus.

On définit l'intensité cumulée par

$$\Lambda(t) = \int_0^t \lambda ds = \lambda t, \text{ pour } t > 0.$$

De plus, on note

$$\Lambda(s, s+t] = \Lambda_s(t) = \Lambda(s+t) - \Lambda(s), \text{ pour } s \geq 0 \text{ et } t > 0,$$

avec la convention $\Lambda(0, t] = \Lambda_0(t) = \Lambda(t)$, $t > 0$.

Processus de Poisson

Définitions + Propriétés

Illustration en classe: trajectoire de \underline{N} sur $(0, t]$ vs $\Lambda(t)$

Processus de Poisson

Définitions + Propriétés

On sait que $N(s, s+t] = N(s+t) - N(s)$ obéit une distribution de Poisson avec moyenne λt

$$\begin{aligned}\Pr(N(s, s+t] = k) &= \Pr(N(s+t) - N(s) = k) \\ &= e^{-\Lambda(s, s+t]} \frac{\Lambda(s, s+t]^k}{k!} = e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^k}{k!},\end{aligned}$$

pour $k \in \mathbb{N}$, $t > 0$, $s \geq 0$.

Q : Quelle est l'expression de la fgp de $N(s, s+t]$?

Processus de Poisson

Définitions + Propriétés

Les évènements (p. ex., sinistres) se produisent aux durées représentées par les v.a. T_k , $k = 1, 2, \dots$ où

$$0 < T_1 < T_2 < \dots \quad (1)$$

Les temps écoulés entre chaque évènements sont définis par

$$W_1 = T_1$$

$$W_k = T_k - T_{k-1}$$

pour $k = 2, 3, \dots$

Illustration en classe :

Processus de Poisson

Définitions + Propriétés

On sait que $\underline{W} = \{W_k, k = 1, 2, \dots\}$ forme une suite de v.a. iid obéissant à une loi exponentielle avec moyenne $\frac{1}{\lambda}$.

Il en résulte que

$$T_k \sim \text{Erlang}(k; \lambda)$$

avec $k \in \mathbb{N}^+$.

Illustration en classe :

Processus de Poisson

Définitions + Propriétés

Une définition alternative pour $\underline{N} = \{N(t), t \geq 0\}$ est

$$N(t) = \sup \{k \in \mathbb{N}_+ : T_k \leq t\}, \quad t \geq 0$$

où $\sup \{\emptyset\} = 0$.

Exemple

- Pour la trajectoire $j = 1$ de \underline{N} , on observe $T_1^{(1)} = 3.76$, $T_2^{(1)} = 7.04$ et $T_3^{(1)} = 9.51$.
- Alors, $N^{(1)}(2) = 0$, $N^{(1)}(7.04) = 2$ et $N^{(1)}(9.5) = 2$.

Cette définition correspond à la définition d'un processus de renouvellement ordinaire (voir la section sur les processus de renouvellement).

Processus de Poisson

Définitions + Propriétés

Le processus de Poisson $\underline{N} = \{N(t), t \geq 0\}$ possède les propriétés suivantes:

- 1 $N(0) = 0$
- 2 $\{N(t), t \geq 0\}$ a des accroissements indépendants et stationnaires
- 3 $N(t) \sim \text{Pois}(\lambda t)$
- 4 $N(s, s+t] = N(s+t) - N(s) \sim \text{Pois}(\lambda t)$
- 5 $\Pr(N(t+h) - N(t) = 0) = 1 - \lambda h + o(h)$ avec $h \rightarrow 0$
- 6 $\Pr(N(t+h) - N(t) = 1) = \lambda h + o(h)$ avec $h \rightarrow 0$
- 7 $\Pr(N(t+h) - N(t) \geq 2) = o(h)$ avec $h \rightarrow 0$ où $o(h) \rightarrow 0$ avec $h \rightarrow 0$.

Processus de Poisson

Définitions + Propriétés

Le résultat suivant est très important en actuariat.

Proposition 1

Soit les processus de Poisson indépendants $\underline{N}_1 = \{N_1(t), t \geq 0\}$ et $\underline{N}_2 = \{N_2(t), t \geq 0\}$ avec des taux λ_1 et λ_2 . Alors, le processus défini par

$$\underline{M} = \{M(t), t \geq 0\}$$

où

$$M(t) = N_1(t) + N_2(t),$$

est aussi un processus de Poisson process avec un taux $\lambda_1 + \lambda_2$.

Preuve

À faire en exercice.

Processus de Poisson

Algorithme de simulation no1

L'algorithme 2 permet de simuler les n premières occurrences du parcours (trajectoire) j d'un processus \underline{N} de Poisson avec une intensité $\lambda > 0$

Algorithme 2

Algorithme PP1

- 1** On fixe $T_0^{(j)} = 0$.
- 2** Pour $i = 1, \dots, n$, on a
 - 1** On simule $W_i^{(j)}$;
 - 2** On calcule $T_i^{(j)} = T_{i-1}^{(j)} + W_i^{(j)}$.

Processus de Poisson

Algorithme de simulation no1

L'algorithme 2 est simple d'application.

Toutefois, il n'est pas toujours efficace si l'on souhaite produire des simulations du processus \underline{N} sur un intervalle fixe $(0, t]$.

On a recours à l'algorithme 3.

Algorithme 3

Algorithme PP2

- 1 On fixe $T_0^{(j)} = 0$.
- 2 On simule la réalisation $N(t)^{(j)}$ de $N(t)$.
- 3 Sachant $N(t) = N(t)^{(j)} > 0$,
 - 1 On simule le vecteur de réalisations $(U_1^{(j)}, \dots, U_{N(t)^{(j)}}^{(j)})$ de $(U_1, \dots, U_{N(t)^{(j)}})$, où les v.a. $U_i \sim U \sim \text{Unif}(0,1)$;
 - 2 On trie les réalisations en [1] et on obtient $(U_{[1]}^{(j)}, \dots, U_{[N(t)^{(j)}]}^{(j)})$ où $U_{[1]}^{(j)} < \dots < U_{[N(t)^{(j)}]}^{(j)}$.
 - 3 On calcule $T_i^{(j)} = t \times U_{[i]}^{(j)}$, pour $i = 1, \dots, N(t)^{(j)}$.

Processus de Poisson

Algorithme de simulation no2

L'algorithme 3 est basé sur la proposition suivante.

Proposition 4

Soit un processus de Poisson $\underline{N} = \{N(t), t \geq 0\}$ avec le taux λ . Soit le vecteur de v.a. continues iid (Y_1, \dots, Y_n) où $Y_i \sim Y \sim \text{Unif}(0, t)$ avec $f_Y(t) = \frac{1}{t}$, $t \in (0, t]$, pour $i = 1, 2, \dots, n$. On définit le vecteur de statistiques d'ordre $(Y_{[1]}, \dots, Y_{[n]})$ à partir de (Y_1, \dots, Y_n) .

Alors, on a

$$(T_1, T_2, \dots, T_n | N(t) = n) \sim (Y_{[1]}, Y_{[2]}, \dots, Y_{[n]}).$$

Preuve

À faire en classe.

Processus de Poisson

Algorithme de simulation no2

La preuve de la proposition 4 s'appuie sur le lemme suivant.

Lemme 1

Soit le vecteur de v.a. continues iid (Y_1, \dots, Y_n) où $Y_i \sim Y$ avec la fonction de densité $f_{Y_i} = f_Y$, pour $i = 1, 2, \dots, n$. On définit le vecteur de statistiques d'ordre $(Y_{[1]}, \dots, Y_{[n]})$ à partir de (Y_1, \dots, Y_n) . Alors, la fonction de densité de conjointe de $(Y_{[1]}, \dots, Y_{[n]})$ est donnée par

$$f_{Y_{[1]}, Y_{[2]}, \dots, Y_{[n]}}(y_1, y_2, \dots, y_n) = n! f_Y(y_1) \times f_Y(y_2) \times \dots \times f_Y(y_n), \quad y_1 < y_2 < \dots < y_n. \quad (2)$$

Preuve

Voir, p. ex., [Ross, 2014].

Processus de Poisson

Algorithme de simulation no2

Le développement de la preuve de la proposition 4 requiert plusieurs pages.

Processus de Poisson

Algorithme de simulation no2

Illustration en classe de l'algorithme 3 :

Processus de Poisson non-homogène

Algorithme de simulation no2

Exemple en classe de l'algorithme 3

Hypothèses :

- $\lambda = 2$
- horizon = 10

Trajectoires (voir l'illustration ?? à la prochaine diapo)

Processus de Poisson non-homogène

Algorithme de simulation no2

Exemple en classe de l'algorithme 3 (suite)




Illustration: Cinq trajectoires d'un processus de Poisson homogène.

Processus de Poisson NH

Processus de Poisson non-homogène

Motivations

On considère des données danoises de sinistres.

Il s'agit de 2167 incendies survenus au Danemark, du 1.1.1980 au 31.12.1990.

Ces données sont très utilisées pour la modélisation des risques en assurance IARD.

Source : package R QRM (voir `danish` ou `danish.df`).

Processus de Poisson non-homogène

Motivations

Q1 : est-ce que l'évolution du nombre de sinistres (selon ces données) peut être modéliser par un processus de Poisson homogène ?




Illustration: Processus de Poisson vs données réelles d'incendie.

Processus de Poisson non-homogène

Motivations

Il est clair que le parcours du processus d'avènement des incendies construits à partir des données n'est pas celui d'un processus de Poisson homogène.

Il faut essayer un autre processus de dénombrement.

Processus de Poisson non-homogène

Motivations

Q2 : Quel processus pourrait être approprié selon les graphiques de l'illustration 3 ?




Illustration: Processus de Poisson non-homogène vs données danoises d'incendie.

Processus de Poisson non-homogène

Définitions + Propriétés

Définition 3

Le processus de comptage $\underline{N} = \{N(t), t \geq 0\}$ est dit un processus de Poisson non-homogène de fonction d'intensité $\lambda(t) \geq 0$ pour $t \geq 0$ si

- 1** $N(0) = 0$
- 2** $\{N(t), t \geq 0\}$ possède des accroissements indépendants
- 3** $P(N(t+h) - N(t) = 1) = \lambda(t)h + o(h)$
- 4** $P(N(t+h) - N(t) \geq 2) = o(h)$

Processus de Poisson non-homogène

Définitions + Propriétés

La condition 3 implique que le processus \underline{N} ne possède pas des accroissements stationnaires, à moins que $\lambda(t) = \lambda > 0, \forall t$.

Alors, \underline{N} devient un processus de Poisson homogène de taux λ .

Processus de Poisson non-homogène

Définitions + Propriétés

Proposition 5

Soit $\underline{N} = \{N(t), t \geq 0\}$ un processus de Poisson non-homogène de fonction d'intensité $\lambda(t)$. Alors,

$$N(t+s) - N(t) \sim \text{Poisson}(\Lambda(t+s) - \Lambda(t)), \quad \forall t, s \geq 0$$

où

$$\Lambda(t) = \int_0^t \lambda(y) dy$$

est la fonction d'intensité cumulée du processus. Ainsi,

$$P(N(t+s) - N(t) = n) = \frac{[\Lambda(t+s) - \Lambda(t)]^n e^{-[\Lambda(t+s) - \Lambda(t)]}}{n!}.$$

Preuve

Voir, p. ex., [Ross, 2014].

Processus de Poisson non-homogène

Définitions + Propriétés

On suppose $\lambda(t)$ est une fonction absolument continue (sans saut).

Exemple

Exemples de fonction d'intensité :

- 1 *fonction linéaire* : $\lambda(t) = a + bt$, $a > 0$, $b \geq 0$;
- 2 *fonction puissance* : $\lambda(t) = (\beta t)^\tau$, $\beta > 0$, $\tau > 0$;
- 3 *fonction log-linéaire* : $\lambda(t) = \exp(\alpha + \beta t)$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$;
- 4 *fonction périodique (effet saisonnier)* : $\lambda(t) = a + b \cos(2\pi t)$,
 $a > 0$, $b \in [0, a]$;
- 5 *fonction périodique (effet saisonnier) bis* :
 $\lambda(t) = a + b \cos(2\pi(t + c))$, $a > 0$, $b \in [0, a]$, $c \in [0, 1)$.

Processus de Poisson non-homogène

Définitions + Propriétés

On définit

$$\Lambda(s, s+t] = \int_s^{s+t} \lambda(u) du, \text{ pour } s \geq 0, t > 0,$$

avec

$$\Lambda(0, t] = \Lambda(t) = \int_0^t \lambda(u) du, \text{ pour } t > 0.$$

Pour $s \geq 0$ fixé, l'inverse de la fonction $\Lambda(s, s+t] = \Lambda_s(t)$ (note : $\Lambda_0(t) = \Lambda(t)$) est définie par

$$\Lambda_s^{-1}(u) = \inf \{t > 0, \Lambda_s(t) \geq u\},$$

pour $u \geq 0$.

Processus de Poisson non-homogène

Définitions + Propriétés

Exemple

Soit $\lambda(t) = a + bt$, $t \geq 0$ ($a > 0$, $b \geq 0$). [Suite en classe]

Processus de Poisson non-homogène

Définitions + Propriétés

Question : Est-ce que $\underline{W} = \{W_k, k \in \mathbb{N}_+\}$ forme une suite de v.a. iid ?

Réponse : [La réponse sera discutée en classe]

La réponse mène à l'algorithme 6.

Processus de Poisson non-homogène

Algorithme de simulation no1

L'algorithme 6 permet de simuler les n premières occurrences du parcours (trajectoire) j d'un processus \underline{N} de Poisson non-homogène.

Algorithme 6

Algorithme PPNH1

- 1 On fixe $T_0^{(j)} = 0$.
- 2 Pour $i = 1, \dots, n$, on a
 - 1 On simule les réalisations $(Z_1^{(j)}, \dots, Z_n^{(j)})$ du vecteur de v.a. iid avec $Z_i \sim Z \sim \text{Exp}(1)$.
 - 2 On simule $W_i^{(j)} = \Lambda_{T_{i-1}^{(j)}}^{-1}(Z_i)$;
 - 3 On calcule $T_i^{(j)} = T_{i-1}^{(j)} + W_i^{(j)}$.

Processus de Poisson

Algorithme de simulation no1

L'algorithme 6 est simple d'application.

Toutefois, il n'est pas toujours efficace si l'on souhaite produire des simulations du processus \underline{N} sur un intervalle fixe $(0, t]$.

On a recours à l'algorithme 7.

Processus de Poisson non-homogène

Algorithme de simulation no1

Illustration en classe de l'algorithme 6 :

Processus de Poisson non-homogène

Algorithme de simulation no2

Algorithme 7

Algorithme PPNH2.

- 1 On fixe $T_0^{(j)} = 0$.
- 2 On simule la réalisation $N(t)^{(j)}$ de $N(t) \sim \text{Poisson}(\Lambda(t))$.
- 3 Sachant $N(t) = N(t)^{(j)} > 0$,
 - 1 On simule le vecteur de réalisations $(V_1^{(j)}, \dots, V_{N(t)^{(j)}}^{(j)})$ du vecteur de v.a. iid $(V_1, \dots, V_{N(t)^{(j)}})$, où $V_i \sim V$ avec $f_V(x) = \frac{\lambda(x)}{\Lambda(t)}$, $0 < x < t$ ($i = 1, 2, \dots, N(t)^{(j)}$);
 - 2 On trie les réalisations en [1] et on obtient $(V_{[1]}^{(j)}, \dots, V_{[N(t)^{(j)}]}^{(j)})$ où $V_{[1]}^{(j)} < \dots < V_{[N(t)^{(j)}]}^{(j)}$.
 - 3 On calcule $T_i^{(j)} = V_{[i]}^{(j)}$, pour $i = 1, \dots, N(t)^{(j)}$.

Processus de Poisson non-homogène

Algorithme de simulation no2

L'algorithme 7 est basé sur la proposition suivante.

Proposition 8

On a

$$\begin{aligned} f_{T_1, \dots, T_n | N(t)=n}(s_1, \dots, s_n) &= n! \frac{\lambda(s_1) \dots \lambda(s_n)}{(\Lambda(t))^n} \\ &= n! \frac{\lambda(s_1)}{\Lambda(t)} \times \dots \times \frac{\lambda(s_n)}{\Lambda(t)}, \end{aligned}$$

pour $0 < s_1 < \dots < s_n < t$.

Preuve

À faire en classe.

Processus de Poisson non-homogène

Algorithme de simulation no2

La preuve de la proposition 8 utilise le lemme 1.

Processus de Poisson non-homogène

Algorithme de simulation no2

Le développement de la preuve de la proposition 8 requiert plusieurs pages.

Processus de Poisson non-homogène

Algorithme de simulation no2

Exemple en classe de l'algorithme 7

Hypothèses :

- $\lambda(t) = a + bt, t > 0$
- $a = 1, b = 0.5$
- horizon = 10

Trajectoires (voir l'illustration 4 à la prochaine diapo)

Processus de Poisson non-homogène

Algorithme de simulation no2

Exemple en classe de l'algorithme 7 (suite)

Trajectoires d'un processus de Poisson non-homogène




Illustration: Cinq trajectoires d'un processus de Poisson non-homogène.

Processus de Poisson mixte

L'intensité d'un processus de Poisson mixte est une variable aléatoire.

Définition 4

Soit Θ une variable aléatoire positive (continue ou discrète). Si le processus de comptage $\underline{N} = \{N(t); t \geq 0\}$ étant donné que $\Theta = \theta$ est un processus de Poisson de taux θ alors $\underline{N} = \{N(t); t \geq 0\}$ est appelé un processus de Poisson mixte.

Le fait que l'intensité soit désormais une v.a. introduit de la surdispersion.

On examine les propriétés du processus de Poisson mixte.

Processus de Poisson mixte

On fait l'hypothèse additionnelle suivante : les paramètres de la loi de Θ sont fixés de telle sorte que

$$E[\Theta] = \lambda \in (0, \infty).$$

Espérance :

$$\begin{aligned} E[N(t)] &= E_{\Theta} [E[N(t) \mid \Theta]] \\ &= E[\Theta t] \text{ car } (N(t) \mid \Theta = \theta) \sim \text{Poisson}(\theta t) \\ &= tE[\Theta] \\ &= t\lambda \end{aligned}$$

Variance :

$$\begin{aligned} \text{Var}(N(t)) &= E[\text{Var}(N(t) | \Theta)] + \text{Var}(E[N(t) | \Theta]) \\ &= E[\Theta t] + \text{Var}(\Theta t) \\ &= tE[\Theta] + t^2\text{Var}(\Theta) \\ &= t\lambda + t^2\text{Var}(\Theta). \end{aligned}$$

Remarques (en classe) :



Illustration de trajectoires (en classe)

- Les deux illustrations suivantes reproduisent les trajectoires de 2 processus de dénombrement différents.
- L'un des processus est un processus de Poisson homogène avec une intensité λ .
- L'autre est un processus de Poisson mixte avec $E[\Theta] = \lambda$.
- Q : Lequel est le lequel ?

Processus de Poisson mixte




Illustration: Dix trajectoires du processus de dénombrement no1.

Processus de Poisson mixte




Illustration: Dix trajectoires du processus de dénombrement no2.

Processus de Poisson mixte

Remarques (en classe) :



Fgm de $N(t)$:

$$\begin{aligned}\mathcal{M}_{N(t)}(r) &= E\left[e^{N(t)r}\right] \\ &= E_{\Theta}\left[E\left[e^{N(t)r}|\Theta\right]\right] \\ &= E_{\Theta}\left[e^{\Theta t(e^r-1)}\right] \\ &= \mathcal{M}_{\Theta}(t(e^r-1)).\end{aligned}$$

Fgp de $N(t)$:

$$\mathcal{P}_{N(t)}(r) = \mathcal{M}_{\Theta}(t(r-1)),$$

pour $r \in [0,1]$.

Proposition 9

*Les accroissements du processus de Poisson mixte \underline{N} sont **stationnaires** et **dépendants**.*

Preuve

À faire en classe.

Processus de Poisson mixte

On définit les temps inter-sinistres associés à \underline{N} par la suite de v.a.
 $\underline{W} = \{W_j, j = 1, 2, \dots\}.$

On définit les temps d'occurrence des sinistres par la suite de v.a.
 $\underline{T} = \{T_j, j \in \mathbb{N}\},$ où $T_0 = 0$ et $T_j = \sum_{l=1}^j W_l, j = 1, 2, \dots$.

Proposition 10

Les temps inter-sinistres du processus de Poisson mixte \underline{N} sont échangeables. Ils ne sont pas indépendants.

Preuve

À faire en classe.

La simulation d'un parcours d'un processus de Poisson mixte \underline{N} est fort simple.

Étapes pour la simulation de la trajectoire j :

- Simuler une réalisation $\Theta^{(j)}$ de Θ .
- Simuler le j ième parcours de $(\underline{N}|\Theta = \Theta^{(j)})$ en utilisant l'algorithme 2 ou l'algorithme 3 pour un processus de Poisson homogène avec une intensité $\lambda = \Theta^{(j)}$.

Exemple

Soit $\Theta \sim \text{Gamma}(\alpha, \beta)$ avec $\beta = \frac{\alpha}{\lambda}$. À faire en classe.

Processus de renouvellement

Processus de renouvellement

Un processus de renouvellement $\underline{N} = \{N(t), t \geq 0\}$ est un exemple de processus de dénombrement (comptage).

Il est une généralisation du processus de Poisson.

La généralisation se fait via les v.a. temps inter-sinistres.

On définit les temps inter-sinistres associés à \underline{N} par la suite de v.a.
 $\underline{W} = \{W_j, j = 1, 2, \dots\}.$

On définit les temps d'occurrence des sinistres par la suite de v.a.
 $\underline{T} = \{T_j, j \in \mathbb{N}\},$ où $T_0 = 0$ et $T_j = \sum_{l=1}^j W_l, j = 1, 2, \dots$.

Processus de renouvellement

Exemples de lois pour W (en classe) :

■ ...

■ ...

■ ...

Pour $t > 0$, la valeur de $N(t) = N(0, t]$ est obtenue avec

$$\begin{aligned} N(t) &= \sum_{k=1}^{\infty} 1_{\{T_k \leq t\}} \\ &= \sup \{k \in \mathbb{N}, T_k \leq t\}, \text{ pour } t > 0. \end{aligned}$$

Relation fondamentale :

$$\{N(t) \geq k\} = \{T_k \leq t\}, \text{ pour } t > 0 \text{ et } k \in \mathbb{N}. \quad (3)$$

Avec (3), on déduit

$$\Pr(N(t) \geq k) = \Pr(T_k \leq t), \text{ pour } t > 0 \text{ et } k \in \mathbb{N}.$$

Fonction de masse de probabilité de $N(t)$:

$$\begin{aligned} \Pr(N(t) = k) &= \Pr(\# \text{ de sinistres sur } (0, t] \text{ soit égal à } k) \\ &= \Pr(N(t) \geq k) - \Pr(N(t) \geq k+1) \\ &= F_{T_k}(t) - F_{T_{k+1}}(t), \end{aligned}$$

pour $k \in \mathbb{N}$, avec $F_{T_0}(t) = 1$, pour tout $t > 0$.

Processus de renouvellement

Remarques (en classe) :

■ ...

■ ...

■ ...

L'algorithme 11 pour simuler une trajectoire de \underline{N} est adapté de l'algorithme 2 pour un processus de Poisson homogène.

Algorithme 11

Algorithme Processus de renouvellement

- 1 On fixe $T_0^{(j)} = 0$.
- 2 Pour $i = 1, \dots, n$, on a
 - 1 On simule $W_i^{(j)}$;
 - 2 On calcule $T_i^{(j)} = T_{i-1}^{(j)} + W_i^{(j)}$.

Espérance de $N(t)$:

$$m(t) = E[N(t)] = \sum_{k=1}^{\infty} E[1_{\{T_k \leq t\}}] = \sum_{k=1}^{\infty} F_{T_k}(t),$$

pour $t > 0$.

Remarques :

- $m(t) = E[N(t)]$ = nombre espéré de sinistres sur l'intervalle de temps $(0, t]$
- La fonction $m(t)$ est appelée la fonction de renouvellement.

Processus de renouvellement

Le processus de Poisson est un cas particulier de processus de renouvellement.

Quelle est la forme de $m(t)$ en fonction de t ?

Seul le processus de Poisson possède une fonction $m(t)$ linéaire en fonction de t , c.-à-d. $m(t) = \lambda t, t \geq 0$.

Exemple

Soit $W \sim \text{Gamma}(\alpha, \beta)$ avec $E[W] = \frac{\alpha}{\beta}$ et $F_W(x) = H(x; \alpha, \beta)$. À faire en classe.

Notes bibliographiques





Source principale : [Cossette and Marceau, 2019]

Ressources additionnelles (exploration personnelle) :

- Introduction aux processus de Poisson et ses variantes:
 - [Ross, 2014]
 - [Mikosch, 2009]
- Applications de ces processus en actuariat:
 - [Albrecher et al., 2017]

Références

Références I

-  Albrecher, H., Teugels, J. L., and Beirlant, J. (2017).
Reinsurance: Actuarial and Statistical Aspects.
John Wiley & Sons.
-  Cossette, H. and Marceau, E. (2019).
Mathématiques actuarielles du risque : modèles, mesures de risque et méthodes quantitatives.
Document de référence.
-  Mikosch, T. (2009).
Non-life Insurance Mathematics: an Introduction with the Poisson Process.
Springer Science & Business Media.
-  Ross, S. M. (2014).
Introduction to Probability Models.
Academic press.