ÉVALUATION QUANTITATIVE DES RISQUES SANITAIRES LIÉS AUX ADDITIFS DU CAOUTCHOUC DANS LES SALLES D'ESCALADE



1) SÉLECTION DES DANGERS PRIORITAIRES

- Caractériser la nature chimique et les principaux effets toxiques (aigus et chroniques, systémiques et génotoxiques) des additifs plastiques détectés dans les salles.
- Hiérarchiser ces substances en comparant quantitativement leur prévalence dans les différentes matrices environnementales des salles d'escalade (poussières, fractions d'aérosols, etc.) lors des périodes de forte fréquentation.

2) PROFILS ET SCÉNARIOS D'EXPOSITION

- Identifier et décrire les catégories de population les plus susceptibles d'être exposées, en caractérisant leurs profils de présence et d'activité dans les salles.
- Définir des scénarios d'exposition représentatifs des usages réels, paramétrés par des indicateurs quantitatifs (fréquence et durée de présence, débits ventilatoires, contacts avec les surfaces, comportements favorisant la remise en suspension).

3) NIVEAUX D'EXPOSITION

Estimer les doses journalières absorbées (DJA) propres à chaque scénario et substance, en combinant les données de mesure disponibles avec les paramètres et les voies d'exposition possibles au regard des dangers connus.

4) CARACTÉRISATION DES RISQUES SANITAIRES

Comparer, pour chaque substance et scénario, les DJA obtenues aux valeurs toxicologiques de référence (VTR) établies par les agences officielles ou dérivées à partir de données expérimentales (NOAEL/LOAEL), afin de calculer des indicateurs quantitatifs de risque (quotients de danger) et d'identifier les scénarios présentant un potentiel risque sanitaire.

5) FORMULATION DES RECOMMANDATIONS

Traduire les résultats de l'EQRS en recommandations hiérarchisées relatives à l'acquisition de données supplémentaires (surveillance et toxicologie), et, si applicable, à des mesures de prévention ou de gestion adaptées au niveau de risque et à la faisabilité de leur mise en oeuvre par les exploitants.