

## Домашнее задание на 24.04 (Алгебра)

Емельянов Владимир, ПМИ гр №247

№1 Элементы из  $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_{10} \times \mathbb{Z}_{25}$

1) порядка 2:

$$(1, 0, 0) \quad (1, 5, 0) \quad (0, 5, 0)$$

**всего: 3**

2) порядка 5:

все тройки порядка 5 имеют вид:

$$(0, 2m, 5n) \quad \forall m \in [0, 4], n \in [0, 4]$$

То есть всего элементов порядка 5:

$$5 \times 5 - 1 = 24$$

(вычитаем тройку  $(0, 0, 0)$ )

3) порядка 10:

все тройки порядка 10 имеют вид:

а) на первом месте 0:

$$(0, 1|3|7|9, 0|5|10|15|20) + (0, 5, 5|10|15|20) = 4 \cdot 5 + 4 = 24$$

б) на первом месте 1:

$$(1, 1|2|3|4|6|8|7|9, 0|5|10|15|20) + (1, 0|1|2|3|4|5|6|8|7|9, 5|10|15|20) -$$

$$-(1, 1|2|3|4|6|8|7|9, 5|10|15|20) = 8 \cdot 5 + 10 \cdot 4 - 8 \cdot 4 = 48$$

Всего элементов:

$$48 + 24 = 72$$

4) порядка 25:

все тройки порядка 25 имеют вид:

$$(0, 0|2|4|5|8, 1|2|3|4|6|\dots(\text{не кратные } 5)) = 5 \cdot 20 = 100$$

**Ответ:** 3, 24, 72, 100

**№2** Так как:

$$63 = 3^2 \cdot 7$$

То по классификации конечных абелевых групп  $A$  раскладывается:

$$A \simeq Z_{3^{k_1}} \times \dots \times Z_{3^{k_r}} \times Z_{7^{\ell_1}} \times \dots \times Z_{7^{\ell_s}},$$

где сумма всех 3-показателей  $k_i$  равна 2, а сумма всех 7-показателей  $\ell_j$  равна 1

Однако если бы в разложении встретился сомножитель  $Z_9 \times Z_7$ , то по теореме 3 (для  $n = 9 \cdot 7$ ,  $\gcd(9, 7) = 1$ ) мы получили бы циклическую группу  $Z_{63}$ . Поскольку  $A$  по условию — нециклическая, единственное возможное разложение:

$$A \simeq Z_3 \times Z_3 \times Z_7.$$

1) Любая подгруппа порядка 3 должна лежать в сомножителе  $Z_3 \times Z_3$ .

— В  $Z_3 \times Z_3$  всего  $3^2 = 9$  элементов, из них один нейтральный, а остальные 8 имеют порядок 3.

— Циклическая подгруппа порядка 3 содержит ровно 2 элемента порядка 3.

Поэтому число различных подгрупп порядка 3 равно

$$\frac{8}{2} = 4.$$

2) Подгруппа порядка 21 должна содержать одновременно элемент порядка 3 и элемент порядка 7.

— В  $Z_7$  существует ровно одна подгруппа порядка 7 (сама  $Z_7$ ).

— В  $Z_3 \times Z_3$  — 4 подгруппы порядка 3.

Пусть  $H_3$  — любая из 4 подгрупп порядка 3, а  $H_7 = Z_7$ . Тогда в абелевой группе  $A$  произведение  $H_3H_7$  есть подгруппа (т.к.  $H_3 \cap H_7 = \{e\}$ ) и по теореме Лагранжа её порядок  $|H_3H_7| = |H_3| \cdot |H_7| = 3 \cdot 7 = 21$ .

Разные  $H_3$  дают разные произведения  $H_3H_7$ , значит, всего подгрупп порядка 21 тоже 4.

**Ответ:** 4 и 4

**№3** Дана группа:

$$Z_{15} \times Z_{18} \times Z_{20}$$

Можем разложить её:

$$\begin{aligned} Z_{15} \times Z_{18} \times Z_{20} &= Z_3 \times Z_5 \times Z_2 \times Z_9 \times Z_4 \times Z_5 = \\ &= Z_3 \times Z_9 \times Z_2 \times Z_4 \times Z_5 \times Z_5 \end{aligned}$$

Так как  $Z_{mn} = Z_m \times Z_n$  только если  $(m, n) = 1$ , то собрать выражение с минимальным количеством множителей мы можем, беря только простые по модулю множители между собой, то есть:

$$\begin{aligned} Z_3 \times Z_9 \times Z_2 \times Z_4 \times Z_5 \times Z_5 &= Z_3 \times Z_2 \times Z_5 \times Z_9 \times Z_4 \times Z_5 = \\ &= Z_{30} \times Z_{180} \end{aligned}$$

Получили 2 множителя.

**Ответ:** 2

**№4** Согласно теореме классификации конечных абелевых групп,  $A$  изоморфна прямому произведению циклических групп простых порядков:

$$A \cong Z_{p_1}^{k_1} \times Z_{p_2}^{k_2} \times \dots \times Z_{p_n}^{k_n},$$

где  $p_i$  — простые числа, а  $k_i \in \mathbb{N}$ .

Наибольший порядок элемента  $k$  в  $A$  равен наибольшему общему кратному порядков циклических компонент:

$$k = \text{НОК}(p_1^{k_1}, p_2^{k_2}, \dots, p_n^{k_n}).$$

Рассмотрим произвольный элемент  $a \in A$ . Его порядок — это НОК порядков его компонент в разложении. Каждая компонента имеет порядок  $p_i^{m_i}$ , где  $m_i \leq k_i$ . Так как  $p_i^{m_i}$  делит  $p_i^{k_i}$ , то:

$$\text{НОК}(p_1^{m_1}, p_2^{m_2}, \dots, p_n^{m_n}) \mid \text{НОК}(p_1^{k_1}, p_2^{k_2}, \dots, p_n^{k_n}) = k.$$

Таким образом, порядок любого элемента  $a \in A$  делит  $k$ .