

Домашнее задание на 30.05 (Математический анализ)

Емельянов Владимир, ПМИ гр №247

№1 (а) Выберем:

$$f'(x) = \cos(Tx) \implies f(x) = \frac{\sin(Tx)}{T}$$
$$g(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{x^2+1}} \implies g'(x) = -\frac{2x}{3(x^2+1)^{4/3}}$$

Применяем формулу интегрирования по частям:

$$\int_0^{+\infty} \frac{\cos(Tx)}{\sqrt[3]{x^2+1}} dx = \left. \frac{\sin(Tx)}{T \cdot \sqrt[3]{x^2+1}} \right|_0^{+\infty} + \frac{2}{3T} \int_0^{+\infty} \frac{x \sin(Tx)}{(x^2+1)^{4/3}} dx$$

Первое слагаемое обращается в ноль, так как:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin(Tx)}{\sqrt[3]{x^2+1}} = 0 \quad (\text{числитель ограничен, знаменатель растёт})$$

Рассмотрим интеграл от модуля:

$$\int_0^{+\infty} \left| \frac{x \sin(Tx)}{(x^2+1)^{4/3}} \right| dx \leq \int_0^{+\infty} \frac{x}{(x^2+1)^{4/3}} dx$$

Для $x \geq 1$:

$$\frac{x}{(x^2+1)^{4/3}} \sim \frac{x}{x^{8/3}} = \frac{1}{x^{5/3}}$$

Интеграл $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^{5/3}} dx$ сходится, так как $5/3 > 1$.

Поскольку:

$$\frac{x}{(x^2+1)^{4/3}} \leq \frac{C}{x^{5/3}} \quad \text{для некоторой константы } C,$$

интеграл $\int_0^{+\infty} \frac{x}{(x^2+1)^{4/3}} dx$ сходится абсолютно. Следовательно, исходный интеграл также сходится абсолютно

Ответ: сходится