

## Домашнее задание на 15.12 (Математический анализ)

Емельянов Владимир, ПМИ гр №247

1. Для нахождения производной  $y'$  в точке  $x = 0$  для неявно заданной функции  $y = y(x)$ , мы воспользуемся методом неявного дифференцирования.

$$\begin{aligned}x^2 + y^2 - 6x + 5y - 14 &= 0. \\ \frac{d}{dx}(x^2) + \frac{d}{dx}(y^2) - \frac{d}{dx}(6x) + \frac{d}{dx}(5y) - \frac{d}{dx}(14) &= 0. \\ 2x + 2y \frac{dy}{dx} - 6 + 5 \frac{dy}{dx} &= 0.\end{aligned}$$

Перепишем уравнение, выделив  $\frac{dy}{dx}$ :

$$\begin{aligned}2y \frac{dy}{dx} + 5 \frac{dy}{dx} &= 6 - 2x. \\ (2y + 5) \frac{dy}{dx} &= 6 - 2x.\end{aligned}$$

Выразим  $\frac{dy}{dx}$ :

$$\frac{dy}{dx} = \frac{6 - 2x}{2y + 5}.$$

Теперь подставим  $x = 0$  в уравнение, чтобы найти  $y$ :

$$0^2 + y^2 - 6 \cdot 0 + 5y - 14 = 0 \implies y^2 + 5y - 14 = 0.$$

Решим квадратное уравнение:

$$y = \frac{-5 \pm \sqrt{5^2 + 4 \cdot 14}}{2} = \frac{-5 \pm \sqrt{25 + 56}}{2} = \frac{-5 \pm \sqrt{81}}{2} = \frac{-5 \pm 9}{2}.$$

$$y_1 = \frac{4}{2} = 2, \quad y_2 = \frac{-14}{2} = -7.$$

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} = \frac{6 - 2 \cdot 0}{2 \cdot 2 + 5} = \frac{6}{4 + 5} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}.$$

**Ответ:**  $\frac{2}{3}$

2. Для нахождения производной функции  $y$  по  $x$  для параметрически заданных функций  $x(t)$  и  $y(t)$ , мы используем формулу:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}.$$

Найдем производные  $\frac{dx}{dt}$  и  $\frac{dy}{dt}$ .

Для  $x(t) = e^{-t}$ :

$$\frac{dx}{dt} = -e^{-t}.$$

Для  $y(t) = t^3$ :

$$\frac{dy}{dt} = 3t^2.$$

Теперь подставим найденные производные в формулу для  $\frac{dy}{dx}$ :

$$\frac{dy}{dx} = \frac{3t^2}{-e^{-t}} = -\frac{3t^2}{e^{-t}}.$$

Упростим выражение:

$$\frac{dy}{dx} = -3t^2 e^t.$$

**Ответ:**  $-3t^2 e^t$ .

3. Для нахождения производной функции, обратной к  $y(x) = e^x + x$  в точке  $y_0 = 1$ , мы воспользуемся формулой для производной обратной функции:

$$\frac{dy^{-1}}{dy} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}} \Big|_{x=x_0},$$

где  $x_0$  — это значение  $x$ , соответствующее  $y_0$ . Найдем  $x_0$  такое, что  $y(x_0) = 1$ :

$$e^{x_0} + x_0 = 1.$$

$$e^0 + 0 = 1 + 0 = 1.$$

Таким образом,  $x_0 = 0$ , так как  $e^x + x$  строго монотонна.

Теперь найдем производную  $\frac{dy}{dx}$ :

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}(e^x + x) = e^x + 1.$$

Подставим  $x_0 = 0$  в производную:

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} = e^0 + 1 = 1 + 1 = 2.$$

Теперь найдем производную обратной функции:

$$\frac{dy^{-1}}{dy} = \frac{1}{\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0}} = \frac{1}{2}.$$

**Ответ:**  $\frac{1}{2}$

4. Для нахождения производной  $y'(x)$  функции, заданной в полярной системе координат  $r(\varphi) = e^\varphi$ , сначала преобразуем полярные координаты в декартовы. В декартовых координатах  $x$  и  $y$  выражаются как:

$$x = r(\varphi) \cos(\varphi), \quad y = r(\varphi) \sin(\varphi).$$

Подставим  $r(\varphi)$ :

$$x = e^\varphi \cos(\varphi), \quad y = e^\varphi \sin(\varphi).$$

Теперь найдем производные  $\frac{dx}{d\varphi}$  и  $\frac{dy}{d\varphi}$ :

Для  $x$ :

$$\frac{dx}{d\varphi} = \frac{d}{d\varphi}(e^\varphi \cos(\varphi)) = e^\varphi \cos(\varphi) - e^\varphi \sin(\varphi) = e^\varphi (\cos(\varphi) - \sin(\varphi)).$$

Для  $y$ :

$$\frac{dy}{d\varphi} = \frac{d}{d\varphi}(e^\varphi \sin(\varphi)) = e^\varphi \sin(\varphi) + e^\varphi \cos(\varphi) = e^\varphi (\sin(\varphi) + \cos(\varphi)).$$

Теперь найдем производную  $\frac{dy}{dx}$  с использованием формулы:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{d\varphi}}{\frac{dx}{d\varphi}}.$$

Подставим найденные производные:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{e^\varphi (\sin(\varphi) + \cos(\varphi))}{e^\varphi (\cos(\varphi) - \sin(\varphi))} = \frac{\sin(\varphi) + \cos(\varphi)}{\cos(\varphi) - \sin(\varphi)}.$$

Теперь найдем значение  $\varphi$ , при котором  $x = 1$ :

$$1 = e^\varphi \cos(\varphi).$$

Подставим  $\varphi = 0$ :

$$1 = e^0 \cos(0) = 1 \cdot 1 = 1.$$

Таким образом,  $\varphi = 0$ .

Теперь подставим  $\varphi = 0$  в выражение для  $\frac{dy}{dx}$ :

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{\varphi=0} = \frac{\sin(0) + \cos(0)}{\cos(0) - \sin(0)} = \frac{0 + 1}{1 - 0} = \frac{1}{1} = 1.$$

**Ответ:** 1

5. (а) Вычислим предел:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - \sqrt[3]{1 + 3x^2}}{\sin^4 x},$$

Разложим функцию  $e^{x^2}$  в ряд Маклорена:

$$e^{x^2} = 1 + x^2 + \frac{x^4}{2} + \bar{o}(x^4).$$

Разложим  $\sqrt[3]{1+3x^2}$

Используем формулу для разложения  $(1+u)^\alpha$  при  $u \rightarrow 0$ :

$$\sqrt[3]{1+3x^2} = (1+3x^2)^{1/3} = 1 + \frac{1}{3}(3x^2) - \frac{1}{9}(3x^2)^2 + \bar{o}(x^4) = 1 + x^2 - x^4 + \bar{o}(x^4).$$

Теперь найдем разность  $e^{x^2} - \sqrt[3]{1+3x^2}$ :

$$e^{x^2} - \sqrt[3]{1+3x^2} = \left(1 + x^2 + \frac{x^4}{2} + \bar{o}(x^4)\right) - (1 + x^2 - x^4 + \bar{o}(x^4)).$$

Упрощаем:

$$e^{x^2} - \sqrt[3]{1+3x^2} = (x^2 - x^2) + \left(\frac{x^4}{2} + x^4\right) + \bar{o}(x^4) - \bar{o}(x^4).$$

$$e^{x^2} - \sqrt[3]{1+3x^2} = \left(\frac{1}{2} + 1\right)x^4 + \bar{o}(x^4) = \frac{3}{2}x^4 + \bar{o}(x^4).$$

Теперь найдем разложение для  $\sin^4 x$ . Используем разложение для  $\sin x$ :

$$\sin x = x + \bar{o}(x) \implies \sin^4 x = x^4 + \bar{o}(x^4)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - \sqrt[3]{1+3x^2}}{\sin^4 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{3}{2}x^4 + \bar{o}(x^4)}{x^4 + \bar{o}(x^4)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{3}{2} + \bar{o}(1)}{1 + \bar{o}(1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{3}{2} + \bar{o}(1)}{1 + \bar{o}(1)} = \frac{3}{2}$$

**Ответ:**  $\frac{3}{2}$

(b) Для вычисления предела

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{\cos x} - \sqrt[4]{e^{-x^2}}}{x^4},$$

Мы разложим функции  $\sqrt{\cos x}$  и  $\sqrt[4]{e^{-x^2}}$  в ряд Маклорена.

Разложим  $\cos x$  в ряд Маклорена:

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \frac{x^6}{720} + \frac{x^8}{40320} + o(x^8)$$

$$\sqrt{\cos x} = \sqrt{1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \frac{x^6}{720} + \frac{x^8}{40320} + o(x^8)}.$$

Разложим  $e^{-x^2}$  в ряд Маклорена:

$$e^{-x^2} = 1 - x^2 + \frac{x^4}{2} - \frac{x^6}{6} + \frac{x^8}{24} - \frac{x^{10}}{120} + \frac{x^{12}}{720} - \frac{x^{14}}{5040} + \frac{x^{16}}{40320} + o(x^{16})$$

$$\sqrt[4]{e^{-x^2}} = \sqrt[4]{1 - x^2 + \frac{x^4}{2} - \frac{x^6}{6} + \frac{x^8}{24} - \frac{x^{10}}{120} + \frac{x^{12}}{720} - \frac{x^{14}}{5040} + \frac{x^{16}}{40320} + o(x^{16})}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{\cos x} - \sqrt[4]{e^{-x^2}}}{x^4} &= \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ \frac{\sqrt{1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \frac{x^6}{720} + \frac{x^8}{40320} + o(x^8)}}{x^4} \right. \\ &\quad \left. - \frac{\sqrt[4]{1 - x^2 + \frac{x^4}{2} - \frac{x^6}{6} + \frac{x^8}{24} - \frac{x^{10}}{120} + \frac{x^{12}}{720} - \frac{x^{14}}{5040} + \frac{x^{16}}{40320} + o(x^{16})}}{x^4} \right\} = \\ &= \sqrt{0 - 0 + 0 - 0 + \frac{1}{40320}} + 0 - \sqrt[4]{1 - 0 + 0 - 0 + \dots + 0 - 0 + \frac{1}{40320}} + 0 = \\ &= \frac{1}{\sqrt{40320}} - \frac{1}{\sqrt[4]{40320}} = \frac{1 - 40320^2}{\sqrt{40320}} \end{aligned}$$

**Ответ:**  $\frac{1-40320^2}{\sqrt{40320}}$

(с) Вычислим предел:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \ln(x + \sqrt{1+x^2})}{x^2 \sin x - x^3 \cos x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \ln(x + \sqrt{1+x^2})}{x^2(x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)) - x^3(1 - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2))} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \ln(x + \sqrt{1+x^2})}{x^3 - \frac{x^5}{6} + o(x^5) - (x^3 - \frac{1}{2}x^5 + o(x^5))} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^5) - (x - \frac{x^3}{6} + \frac{3x^5}{40} + o(x^5))}{-\frac{x^5}{6} + \frac{x^5}{2} + o(x^5)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{8x^5}{120} + o(x^5)}{\frac{x^5}{3} + o(x^5)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{8}{120} + o(1)}{\frac{1}{3} + o(1)} = -\frac{8 \cdot 3}{120} = -\frac{8}{40} = -\frac{1}{5} \end{aligned}$$

**Ответ:**  $-\frac{1}{5}$

6. (a) Мы имеем:

$$\lambda_1 = 1,$$

$$\lambda_2 = \sin(\lambda_1) = \sin(1) \approx 0.8415,$$

$$\lambda_3 = \sin(\lambda_2) = \sin(\sin(1)) \approx 0.7456.$$

Заметим, что  $\sin(x) < x$  для  $x > 0$ . Следовательно, для  $n \geq 2$ :

$$\lambda_n = \sin(\lambda_{n-1}) < \lambda_{n-1}.$$

Таким образом, последовательность  $\{\lambda_n\}$  является строго убывающей и положительной, что означает, что она стремится к некоторому пределу  $\lambda \geq 0$ .

Кандидаты:

$$\lambda = \sin \lambda \implies \lambda = 0$$

Следовательно, по теореме Вейерштрасса:

$$\lambda_n \rightarrow 0$$

(b) Нам нужно найти:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{1}{\sin^2 x} - \frac{1}{x^2} \right).$$

Приведем к общему знаменателю:

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - \sin^2 x}{x^2 \sin^2 x}$$

$$x^2 - \sin^2 x = x^2 - \left( x^2 - \frac{x^4}{3} + o(x^4) \right) = \frac{x^4}{3} - o(x^4).$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - \sin^2 x}{x^2 \sin^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^4}{3} - o(x^4)}{x^2 \left( x^2 - \frac{x^4}{3} + o(x^4) \right)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^4}{3}}{x^4} = \frac{1}{3}.$$

(с) Вычисление предела  $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+1} - a_n)$ , где  $a_n = \frac{1}{\lambda_n^2}$ . Мы имеем:

$$a_{n+1} - a_n = \frac{1}{\lambda_{n+1}^2} - \frac{1}{\lambda_n^2} = \frac{\lambda_n^2 - \lambda_{n+1}^2}{\lambda_{n+1}^2 \lambda_n^2}.$$

мы получаем:

$$\lambda_n^2 - \lambda_{n+1}^2 = (\lambda_n - \lambda_{n+1})(\lambda_n + \lambda_{n+1}) \approx \frac{\lambda_n^3}{6} \cdot (2\lambda_n) = \frac{\lambda_n^4}{3}.$$

Таким образом,

$$a_{n+1} - a_n \approx \frac{\frac{\lambda_n^4}{3}}{\lambda_{n+1}^2 \lambda_n^2}.$$

Поскольку  $\lambda_n \rightarrow 0$ ,  $\lambda_{n+1} \rightarrow 0$ , то  $\lambda_{n+1}^2 \approx \lambda_n^2$ , и мы можем записать:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+1} - a_n) \approx \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{\lambda_n^4}{3}}{\lambda_n^4} = \frac{1}{3}.$$

(d) Применение теоремы Штольца

По теореме Штольца:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{1} = \frac{1}{3}.$$

(е) Мы знаем, что:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = \frac{1}{3}$$

При этом:

$$\begin{aligned} a_n = \frac{1}{\lambda_n^2} &\implies \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n\lambda_n^2} = \frac{1}{3} \implies \\ &\implies n\lambda_n^2 \rightarrow 3 \implies \sqrt{n}\lambda_n \rightarrow \sqrt{3} \end{aligned}$$

**Ответ:**  $L = \sqrt{3}$