

Домашнее задание на 10.04 (Математический анализ)

Емельянов Владимир, ПМИ гр №247

№1 Первое равенство неверно, так как:

$$\int \frac{1}{x} dx - \int \frac{1}{x} dx = \ln(x) + C_1 - (\ln(x) + C_2) = C_1 - C_2$$

Второе равенство верно. Третье равенство неверно - аналогично первому.

№2 (a) Рассмотрим интеграл:

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx &= \arcsin x + C_1 = -\arccos x + C_2 \implies \\ \implies \arcsin x + \arccos x &= C_2 - C_1 = C \end{aligned}$$

Значит, в любой точке сумма константа:

$$\arcsin 1 + \arccos 1 = \frac{\pi}{2}$$

Ответ: $\frac{\pi}{2}$

(b) Рассмотрим интеграл:

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} dx &= \operatorname{arctg} x + C_1 = -\operatorname{arctg} \frac{1}{x} + C_2 \implies \\ \implies \operatorname{arctg} x + \operatorname{arctg} \frac{1}{x} &= C_2 - C_1 = C \end{aligned}$$

Значит, в любой точке сумма константа:

$$C_2(x) = \begin{cases} \frac{\pi}{2}, & x > 0, \\ -\frac{\pi}{2}, & x < 0. \end{cases}$$

№3 (а) Разложим:

$$\begin{aligned} \frac{1}{x^4 - 1} &= \frac{1}{(x^2 - 1)(x^2 + 1)} = \frac{A}{x - 1} + \frac{B}{x + 1} + \frac{C}{x^2 + 1} \\ &= \frac{(A + B)x^3 + (A - B + C)x^2 + (A + B)x + (A - B - C)}{(x - 1)(x + 1)(x^2 + 1)} \end{aligned}$$

Решим систему:

$$\begin{cases} A + B = 0 \\ A - B + C = 0 \\ A + B = 0 \\ A - B - C = 1 \end{cases} \implies A = \frac{1}{4}, \quad B = -\frac{1}{4}, \quad C = -\frac{1}{2}$$

Следовательно:

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{x^4 - 1} dx &= \int \left(\frac{\frac{1}{4}}{x - 1} + \frac{-\frac{1}{4}}{x + 1} + \frac{-\frac{1}{2}}{x^2 + 1} \right) dx = \\ &= \int \frac{1}{x^4 - 1} dx = \frac{1}{4} \ln |x - 1| - \frac{1}{4} \ln |x + 1| - \frac{1}{2} \operatorname{arctg} x + C \end{aligned}$$

Ответ: $\frac{1}{4} \ln |x - 1| - \frac{1}{4} \ln |x + 1| - \frac{1}{2} \operatorname{arctg} x + C$

(b) Найдём:

$$\int \frac{1}{\sqrt{-8 - 12x - 4x^2}} dx = \int \frac{1}{\sqrt{1 - t^2}} d\varphi(t) = \arcsin(2x + 3) + C$$

Ответ: $\arcsin(2x + 3) + C$

(с) Найдём:

$$\int \frac{1}{\sin x} \, dx$$