Questão 1

Existe uma prática que qualquer pessoa pode fazer, e calcular o valor aproximado do campo gravitacional local. Basta fixar a ponta de um barbante em barra e amarrar uma pequena massa na outra, formando um pêndulo. Em seguida, faz o sistema oscilar e, com um cronômetro, afere o período de oscilação.

Desenvolva uma expressão para, sabendo os valores das variáveis citadas, calcular o valor de "g".

Resposta 1

 $g = I/(t/2Pi)^2$

Questão 2

Um sistema massa-mola permite calcular a massa de um corpo sem precisar do valor do campo gravitacional e até mesmo em situações onde o campo gravitacional seria nulo.

Descreva esse procedimento.

Resposta 2

Coloque o corpo para oscilar em um sistema massa mola, o qual a constante seja conhecida e calcular e cronometrar o período de oscilação do corpo, a partir disto basta colocar na fórmula $T = 2*Pl\sqrt{m/k}$ e será possível calcular a massa.

Questão 3

Uma pessoa deseja construir um pêndulo simples cujo período de oscilação seja de 2 s.

Descreva, com o devido detalhamento, como ele deve proceder.

Resposta 3

 $2 = 2*3,14\sqrt{1/9},8$

 $(2/6,28)^2 = 1/9,8$

0,10*9,8=1

l = 1

Questão 4

Um geólogo usa um pêndulo simples de alta precisão para verificar variações do campo gravitacional local. Se passar de um ponto ao nível do mar para um local a 1200 m de altitude, o que vai acontecer com a frequência de oscilação do pêndulo?

Resposta 4

A frequência de oscilação diminuirá, pois ao passar dos 1200m o valor da gravidade diminuirá, logo a frequência também.

Questão 5

Considere um sistema massa-mola com uma mola de constante elástica "k", que é deformada de um valor "x", oscilando durante certo tempo, sem atrito relevante. Desenvolva uma expressão para o cálculo da energia potência elástica em função do período de oscilação.

Resposta 5

 $epe = ((m/(t/2Pi)^2)*x^2)/2$

Koala Educacional

Lista de Respostas Arquivo Emitido no dia: 22-08-2019